



Камчатский филиал ФГБУН
Тихоокеанского института географии ДВО РАН
ФГУП Камчатский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии
Камчатская краевая научная библиотека
имени С.П. Крашенинникова

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАМЧАТКИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ МОРЕЙ

Тезисы докладов
XIV международной научной конференции
14–15 ноября 2013 г.

**Conservation of biodiversity of Kamchatka
and coastal waters**

Abstracts of XIV international scientific conference
Petropavlovsk-Kamchatsky, November 14–15 2013

Издательство «Камчатпресс»
Петропавловск-Камчатский
2013

ББК 28.688
C54

C54 **Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей** : тезисы докладов XIV международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения известного дальневосточного учёного, д.б.н., профессора В.Я. Леванидова. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2013. – 426 с.

ISBN 978-5-9610-0217-1

Сборник включает тезисы докладов состоявшейся 14–15 ноября 2013 г. в Петропавловске-Камчатском XIV международной научной конференции по проблемам сохранения биоразнообразия Камчатки и прилегающих к ней морских акваторий. Рассматривается история изучения и современное биоразнообразие отдельных групп флоры и фауны полуострова и прикамчатских вод. Обсуждаются теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия в условиях возрастающего антропогенного воздействия.

ББК 28.688

Conservation of biodiversity of Kamchatka and coastal waters : Abstracts of the XIV international scientific conference, dedicated to the 100th anniversary of V.Ya. Levanidov's birthday. – Petropavlovsk-Kamchatsky : Kamchatpress, 2013. – 426 p.

The proceedings include the materials of the XIV scientific Conference on the problems of biodiversity conservation in Kamchatka and adjacent seas held on 14–15 November, 2013 in Petropavlovsk-Kamchatsky. The history of study and the present-day biodiversity of specific groups of Kamchatka flora and fauna are analyzed. Theoretical and methodological aspects of biodiversity conservation under increasing anthropogenic impact are discussed.

Редакционная коллегия:

В.Ф. Бугаев, д.б.н., Е.Г. Лобков, д.б.н., В.В. Максименков, д.б.н.,

А.М. Токранов, д.б.н. (отв. редактор), О.А. Чернягина

Перевод на английский к.б.н. Т.С. Шулежко

Издано по решению Ученого Совета КФ ТИГ ДВО РАН

ISBN 978-5-9610-0217-1

© Камчатский филиал ФГБУН
Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, 2013

© ФГУП Камчатский научно-
исследовательский институт
рыбного хозяйства и океано-
графии, 2013

ВЛИЯНИЕ АГРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ КАМЧАТКИ

E.A. Жарикова

ФГБУН Биологический и почвенный институт (БПИ) ДВО РАН, Владивосток

THE INFLUENCE OF AGROGENIC EFFECTS ON FERTILITY OF THE SOILS OF KAMCHATKA

E.A. Zharikova

Institute of Biology and Soil Science (IBSS) FEB RAS, Vladivostok

Полуостров Камчатка является уникальным регионом России, природные особенности которого обусловлены не только его географическим положением, но и активной вулканической деятельностью, как в прошлом, так и в настоящем. Хорошо исследованы естественные синлитогенные вулканические почвы региона, подробно рассмотрены вопросы их классификации и номенклатуры, дана генетическая характеристика и закономерности распространения, рассмотрены особенности водного режима, минералогического и физико-химического состава, отмечен исключительный теоретический и практический интерес изучения почв полуострова (Ливеровский, 1959; Зонн и др., 1963; Соколов, 1973; Карпачевский и др., 2009; Захарихина, Литвиненко, 2011).

Продолжительное агрогенное воздействие на почвы приводит к заметным, зачастую негативным последствиям, в частности к снижению их плодородия. Поэтому обязательной частью агрэкологической характеристики почв является выявление степени обеспеченности растений питательными элементами. Тем не менее, до настоящего времени практически единственным источником информации об агрогенной трансформации вулканических почв Камчатки является работа З.А. Прохоровой и И.А. Соколова (1971).

Объектами исследования явились наиболее широко используемые в сельском хозяйстве региона почвы и их естественные аналоги. В Центральной Камчатской депрессии (долине р. Камчатки) – это светло-охристые и слоисто-охристо-оподзоленные почвы, на восточном побережье Камчатки (долина р. Авачи) – аллювиальные серогумусовые, слоисто-охристые и слоисто-светло-охристые почвы, сформированные на разных отложениях. На территории Западной Камчатской низменности (долина р. Быстрой) – аллювиальные серогумусовые и охристые оподзоленные почвы разного гранулометрического состава. Образцы

в естественных почвах отбирались по всему почвенному профилю, в агрогенных – из пахотного и подпахотного горизонтов. Анализы проводились общепринятыми методами: гумус – по Тюрину, рН водный и солевой – потенциометрически, обменные основания – в вытяжке уксуснокислого аммония, гидролитическая кислотность по Каппену, подвижный фосфор – по Кирсанову, обменный калий – по Масловой.

Исследованные почвы являются легкосуглинистыми в поверхностных слоях и супесчаными в глубоких, наблюдается облегчение гранулометрического состава вниз по профилю. В слоисто-окристых и слоисто-светло-окристых почвах преобладающей фракцией является песчаная, во всех остальных – крупнопылеватая. Содержание илистой фракции невелико, максимум ее приходится на верхние горизонты. Накопление тонких фракций в поверхностных слоях является свидетельством активного проявления процессов биогенного и химического разрушения первичных минералов в корнеобитаемой зоне.

Абсолютное большинство гумусово-аккумулятивных горизонтов естественных почв полуострова имеют малую мощность (5–12 см), поэтому пахотный слой окультуренных почв сформирован за счет нескольких горизонтов, зачастую резко отличающихся между собой по своим физико-химическим свойствам. Поэтому при сравнении содержания гумуса и основных элементов питания (фосфора и калия) целинных и агрогенных почв использовались данные не по содержанию, а по запасам этих показателей в корнеобитаемом слое (20 см), рассчитанные с учетом мощности горизонтов и плотности их сложения. Наложение единообразных систем основной обработки почвы и технологии возделывания сельскохозяйственных культур способствовали определенному нивелированию свойств агрогенного горизонта в разных типах почв, поэтому оценку проводили по средним характеристикам почв полуострова в целом и различных земледельческих районов.

Актуальная кислотность большинства естественных синлитогенных почв оценивается как слабокислая, обменная – как сильноокислая, показатели гидролитической кислотности варьируют от средних до очень высоких. Сумма поглощенных катионов низкая, степень насыщенности основаниями лежит в пределах от крайне до очень низкой, что является следствием легкого гранулометрического состава и слабой выветрелости почв (табл.). Запас гумуса характеризуется как низкий в почвах Центральной Камчатской депрессии и Восточно-Камчатского побережья и средний в почвах Западно-Камчатской низменности. Запас подвижного фосфора варьирует от низкого в прибрежных районах до повышенного в центральной части полуострова. Запас подвижного калия оценивается как низкий по всему региону (рис.).

Физико-химические свойства почв Камчатки (средние значения)

Почвы	рН		Гк*	Поглощённые катионы			Емкость поглощения	Степень насыщенности по Гк, %		
	H ₂ O	KCl		Ca ²⁺	Mg ²⁺	Сумма				
				Mг-экв./100 г почвы						
Центральная Камчатская депрессия										
Естественные	5.0	4.4	13.7	4.92	3.14	8.06	18.6	34		
Агрогенные	5.3	4.7	11.5	7.53	2.35	9.88	16.8	30		
Западно-Камчатская низменность										
Естественные	5.3	4.7	6.9	4.29	5.38	9.67	11.21	51		
Агрогенные	5.5	5.2	4.7	8.61	2.12	10.73	13.2	58		
Восточно-Камчатское побережье										
Естественные	5.1	4.7	6.6	5.59	1.66	7.25	12.17	49		
Агрогенные	5.5	5.1	4.5	7.14	1.13	8.27	11.5	64		
Камчатка в целом										
Естественные	5.2	4.7	6.6	5.59	1.65	7.24	12.17	49		
Агрогенные	5.5	5.1	4.5	7.46	1.35	8.81	11.98	62		


Примечание. * Гк – гидролитическая кислотность.

Распашка и агрогенное воздействие практически не влияют на актуальную и обменную кислотность почв, выявлено только небольшое снижение гидролитической кислотности, что в совокупности с повышением содержания поглощенных катионов (в основном кальция) является результатом известкования, которое привело к увеличению степени насыщенности почв основаниями, что, несомненно, является положительным моментом.

Анализ запасов питательных веществ в корнеобитаемом слое агрогенных почв позволил выявить тенденции в изменении плодородия региона. В целом по региону запас гумуса оценивается как низкий, выявлено снижение запаса гумуса в поверхностном слое 0–20 см, при этом в агрогенных почвах Западно-Камчатской низменности этот параметр оценивается как средний и отмечается его увеличение.

Запас подвижного фосфора в агропочвах Центральной Камчатской депрессии и Западно-Камчатской низменности характеризуется как низкий, в почвах Восточно-Камчатской низменности – повышенный. По сравнению с показателями целинных почв в последнем районе наблюдается его резкое увеличение, в агропочвах Западно-Камчатской низменности – незначительное увеличение и значительное снижение в Центральной Камчатской депрессии.

Запас подвижного калия в агропочвах Западно-Камчатской низменности, по сравнению с целинными аналогами, практически не изменился,



Запасы гумуса и элементов питания в естественных (ц) и агрогеновых (п) почвах Камчатки в слое 0–20 см. А – Центральная Камчатская депрессия, Б – Западно-Камчатская низменность, В – Восточно-Камчатская низменность, Г – Камчатка в целом

незначительно вырос на восточнокамчатском побережье и резко увеличился до повышенного в Центральной Камчатской депрессии.

В целом почвы Камчатки отличаются невысоким уровнем плодородия. В совокупности с легким гранулометрическим составом это свидетельствует о их низкой буферной способности и необходимости регулярного мониторинга физико-химических и агрохимических показателей используемых в сельскохозяйственном производстве почв. Значительные отличия в распределении запасов гумуса и элементов питания в агропочвах разных районов полуострова связаны с неодинаковой степенью устойчивости почв к истощению и неравномерным внесением минеральных и органических удобрений.

ЛИТЕРАТУРА

- Захарихина Л.В., Литвиненко Ю.С. 2011. Генетические и геохимические особенности почв Камчатки. М. : Наука. 244 с.
 Зонн С.В., Карпачевский Л.О., Стефин В.В. 1963. Лесные почвы Камчатки. М. : Изд-во АН СССР. 255 с.
 Карпачевский Л.О., Алябина И.О., Захарихина Л.В., Макеев А.О., Маречек М.С., Радюкин А.Ю., Шоба С.А., Таргульян В.О. 2009. Почвы Камчатки. М. : Геос. 224 с.

Ливеровский Ю.А. 1959. Почвы равнин Камчатского полуострова. М. ; Л. : Наука. 126 с.

Соколов И.А. 1973. Вулканизм и почвообразование. М. : Наука. 225 с.

Прохорова З.А., Соколов И.А. 1971. Агрохимическая характеристика почв Камчатской области // Агрохимическая характеристика почв СССР. М. : Наука. С. 170–239.