

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  
НАСЕКОМЫХ (INSECTA) И ПАУКОВ (ARANEI) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЗОВ ТИГРА»**

Сундуков Ю.Н.

Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова,  
с. Лазо, Приморский край

Настоящий список подготовлен на основе сбора беспозвоночных на территории национального парка в 2010 г. автором статьи и с.н.с. Лазовского заповедника Шохриным В.П. Кроме того, частично были определены материалы по насекомым и паукам, собранные автором на территории парка в 1996-2008 гг. во время работ по инвентаризации фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Южного Сихотэ-Алиня. В определении собранного материала участвовали Купянская А.Н., Курзенко И.В. Локтионов В.М., Процалькин М.Ю., Стороженко С.Ю., Тесленко А.В., Тиунова Т.М. (все Владивосток), Волкович М.Г., Мандельштам М.Ю. (оба Санкт-Петербург), Гусаков А.А., Казанцев С.В., Любарский Г.Ю., Макаров К.В. Мельник И.В., Просви́ров А.С., Соколов А.В. (все Москва), Легалов А.А., Чернышев С.Э. (оба Новосибирск), Марусик Ю.М. (Магадан), Михайлов Ю.Е. (Екатеринбург), Прокин А.А. (Воронеж), Смирнов М.Э. (Иваново), Сундуков Ю.Н. (Лазо), Шаврин А.В. (Иркутск), Односум В.К. (Киев, Украина), Ружичка Я. (Прага, Чехия) и Нильсон А.Н. (Умея, Швеция). Всего приводятся сведения о 618 видах из 72 семейств беспозвоночных (589 видов из 60 семейств насекомых и 29 видов из 12 семейств пауков), определенных с территории национального парка, что составляет не более 10% от реального числа обитающих здесь видов.

**КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA  
ОТРЯД ПОДЕНКИ – EPHEMEROPTERA**

Семейство Leptophlebiidae

*Leptophlebia (Neoleptophlebia) chocolata* (Imanishi, 1937). Собран на руч. Лукьянов Лог. Горные быстротекущие водотоки. Обычный.

**ОТРЯД ТАРАКАНОВЫЕ – BLATTOPTERA**

Семейство Cryptoceridae

*Cryptocercus relictus* Bey-Bienko, 1935. Собран на горах Горелая Сопка и Сестра, где населяет темнохвойные и темнохвойно-березовые леса на высотах 1250-1300 м. Встречается в гнилых валежинах и пнях хвойных деревьев. Редкий.

**ОТРЯД ВЕСНЯНКИ – PLECOPTERA**

Семейство Leuctridae

*Paraleuctra cercia* (Okamoto, 1922). Собран на руч. Лукьянов Лог. Обычный в небольших и крупных предгорных реках.

*Paraleuctra zapekinae* Zhiltzova, 1974. Собран на руч. Лукьянов Лог. Населяет предгорные быстротекущие водотоки. Редкий.

Семейство Nemouridae

*Nemoura arctica* Esben-Petersen, 1910. Собран на руч. Лукьянов Лог. В различных водотоках. Обычный.

*Nemoura fulva* (Šamal, 1921). Собран на руч. Лукьянов Лог. В различных водотоках. Редкий.

Семейство Perlodidae

*Megarcys ochracea* Klapálek, 1912. Собран на руч. Лукьянов Лог. В горных холодных ручьях и реках. Обычный.

Семейство Chloroperlidae

*Suwallia asiatica* Zhiltzova, 1978. Собран на руч. Лукьянов Лог. В горных и предгорных реках и ручьях. Редкий.

*Sweltsa lepnevae* Zhiltzova, 1977. Собран на руч. Лукьянов Лог. В горных и предгорных реках и ручьях. Редкий.

**ОТРЯД ГРИЛЛОБЛАТТИДОВЫЕ – GRYLLOBLATTIDA**

Семейство Grylloblattidae

***Grylloblattina djakonovi* Bey-Bienko, 1951.** Собран на горах Сестра и Снежная, в истоках р. Уссури и р. Маргаритовка. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. Встречается в опаде и под камнями на берегах горных ручьев или под пологом леса в таежной и альпийской зонах. Не редкий.

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA

Семейство Настоящие кузнечики – Tettigoniidae

***Hypsopedes kurentzovi* Bey-Bienko, 1951.** Собран на г. Горелая Сопка. Эндемик Сихотэ-Алиня. Обычный в августе-сентябре на каменистых россыпях и кустарничковых тундрах на высоте 1350-1400 м.

Семейство Пещерные кузнечики – Rhabdophoridae

***Paratachycines (Paratachycines) ussuriensis* Storozhenko, 1990.** Собран на руч. Веселый. В каменистых россыпях и пещерах в зоне долинных широколиственных и смешанных лесов. Не редкий.

Семейство Настоящие саранчовые – Acrididae

***Aeropus kudia* (Caudell, 1927).** Собран на г. Горелая Сопка. На заросших кустарниками каменистых осыпях на высоте 800-1600 м. Обычный.

***Chorthippus fallax fallax* (Zubowsky, 1900).** Собран на г. Горелая Сопка. На лугах и опушках леса, в горах на каменистых осыпях. Обычный.

***Podismopsis genicularibus* (Shiraki, 1910).** Собран на г. Горелая Сопка. На опушках леса и полянах. Обычный.

***Prumna kurentzovi* (Mistshenko, 1974).** Собран на горах Сестра и Горелая Сопка. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. На каменистых россыпях с микробиотой и другими кустарничками на высоте 1000-1600 м. Обычный.

***Zubovskya koeppeni parvula* (Ikonnikov, 1911).** Собран на г. Горелая Сопка. В долинных лесах, на опушках, полянах, лугах. Обычный.

ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ ЖУКИ – COLEOPTERA

Семейство Трахипахиды – Trachypachidae

***Trachypachus zetterstedti* (Gyllenhal, 1827).** Собран в устье руч. Победа. В горных таежных лесах на открытых или слабо затененных участках. Редкий.

Семейство Плавунцы – Dytiscidae

***Dytiscus dauricus* Gebler, 1832.** Собран в нижнем течение руч. Сестринский. В стоячих водоемах. Редкий.

***Rhantus (Rhantus) notaticollis* (Aubé, 1837).** Собран в верховьях р. Пасечная. В стоячих и слабо текущих водоемах. Не редкий.

Семейство Ризодиды – Rhysodidae

***Rhysodes comes* (Lewis, 1888).** Собран в верховьях руч. Коварный. Под корой и в древесине валежин деревьев в долинах рек. Редкий.

Семейство Жужелицы – Carabidae

***Acupalpus (Setacupalpus) hilaris* Tschitschérine, 1899.** Собран на г. Снежная. Долины: во влажных биотопах под пологом леса. Редкий.

***Agonum (Agonum) dolens* (C.R. Sahlberg, 1827).** Собран в устье руч. Победа. Берега различных водоемов в поймах крупных рек. Редкий.

***Agonum (Agonum) gracilipes* (Duftschmid, 1812).** Собран на руч. Коварный. На сухих пастбищных и других лугах в долинах крупных рек. Не редкий.

***Agonum (Agonum) impressum* (Panzer, 1796).** Собран в верховьях руч. Коварный и р. Пасечная. На лугах и на берегах водоемов в долинах крупных рек. Не редкий.

***Agonum (Agonum) jankowskii* Lafer, 1992.** Собран на руч. Коварный. На сырых лугах и болотах в долинах и среднегорной зоне. Редкий.

***Agonum (Agonum) mandli* Jedlička, 1933.** Собран на руч. Коварный, горах Горелая Сопка, Облачная и Снежная, р. Милоградовка. Низкогорная и среднегорная зоны: на берегах рек и других водоемов в затененных местах. Обычный.

*Agonum (Agonum) sculptipes* (Bates, 1883). Собран на руч. Коварный, р. Милоградовка. Низкогорная и среднегорная зоны: на сырых лугах и болотах. Не редкий.

*Agonum (Europhilus) bellicum* Lutshnik, 1934. Собран на горах Горелая Сопка, Снежная и Облачная, в истоке р. Уссури, ручьи Победа, Светлый, Забытый и Коварный. Вся лесная зона: на берегах водоемов. Многочисленный.

*Agonum (Europhilus) consimile* (Gyllenhal, 1810). Собран в верховьях р. Милоградовка. Низкогорья и среднегорья: на заболоченных берегах водоемов. Редкий.

*Agonum (Liebherrius) alpinum* Motschulsky, 1844. Собран на горах Облачная и Снежная. Таежный лесной и субальпийский пояса: на берегах горных ручьев под пологом леса. Обычный.

*Agonum (Liebherrius) fallax* (A. Morawitz, 1862). Собран на ручьях Коварный и Победа. Пойменные широколиственные леса в долинах крупных рек: живет скоплениями под пологом леса в увлажненных биотопах. Редкий.

*Amara (Amara) aeneola* Poppius, 1906. Собран на г. Снежная. Высокогорные ландшафты. Редкий.

*Amara (Amara) chalcites* Dejean, 1828. Собран на руч. Коварный. Долинные неморальные леса: в подстилке на опушках, полянах и вдоль дорог. Обычный.

*Amara (Amara) communis* (Panzer, 1797). Собран на руч. Коварный. Пояса широколиственных и кедрово-широколиственных лесов: в подстилке на опушках, полянах, лугах и вдоль дорог. Обычный.

*Amara (Amara) coraica* Kolbe, 1886. Собран на руч. Коварный. Долинные неморальные и смешанные леса: в подстилке на опушках, полянах и вдоль дорог. Обычный.

*Amara (Amara) kingdonoides* Hieke, 2002. Собран на горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Сестра, Снежная и Облачная. Темнохвойные леса и высокогорье: обычный в горных тундрах и каменноберезовых лесах на высотах 1300-1800 м.

*Amara (Amara) laferi* Hieke, 1976. Собран на руч. Сестринский. Долинные и низкогорные широколиственные леса: в парковых насаждениях и на опушках леса. Редкий.

*Amara (Amara) lunicollis* Schiødte, 1837. Собран на горах Снежная и Горелая Сопка, ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Коварный, в верховьях р. Пасечная. Все лесные пояса: на открытых местах, вдоль дорог или в разреженных насаждениях; отмечен в горных тундрах. Обычный.

*Amara (Amara) magnicollis* Tschitschérine, 1894. Собран на ручьях Коварный, Лукьянов Лог и Победа. Широколиственные и смешанные леса: в открытых биотопах в лесной зоне. Обычный.

*Amara (Amara) orienticola* Lutshnik, 1935. Собран в верховьях р. Пасечная и на г. Снежная. Долинные и горные неморальные и смешанные леса: на открытых участках (опушки, дороги). Обычный.

*Amara (Amara) ovata* (Fabricius, 1792). Собран на г. Снежная, в верховьях р. Пасечная, ручьи Сестринский, Светлый, Забытый и Победа. Долинные и горные леса: на открытых участках (опушки, дороги); отмечен в субальпийском поясе. Обычный.

*Amara (Amara) sundukowi* Hieke, 2002. Собран на руч. Коварный и г. Снежная. Долинные и низкогорные неморальные леса: на открытых участках (поляны, опушки, вдоль дорог); отмечен в субальпийском поясе. Обычный.

*Amara (Amara) tibialis* (Paykull, 1798). Собран в верховьях р. Уссури, ручьи Забытый, Сухая Речка и Коварный. Долинные и горные неморальные и смешанные леса: на открытых участках (поляны, опушки, вдоль дорог). Не редкий.

*Amara (Amara) ussuriensis* Lutshnik, 1935. Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог. Долинные и горные неморальные и смешанные леса: на открытых участках (поляны, опушки, вдоль дорог). Обычный.

*Amara (Bradytus) amplipennis* Baliani, 1943. Собран на руч. Победа. Долинные неморальные леса: на открытых участках на берегах водоемов в подстилке и растительном мусоре. Не редкий.

*Amara (Bradytus) aurichalcea* Germar, 1824. Собран на руч. Коварный и р. Милоградовка. Долинные неморальные леса: на открытых участках на берегах водоемов в подстилке и растительном мусоре. Обычный.

*Amara (Bradytus) mikae* Lafer, 1980. Собран на руч. Коварный. Долины рек в неморальной зоне: на лугах. Редкий.

*Amara (Celia) brunnea* (Gyllenhal, 1810). Собран на руч. Лукьянов Лог, горах Горелая Сопка, Облачная и Снежная. Лесная зона: в подстилке. Обычный в каменноберезово-пихтовых лесах на высотах 1200-1700 м.

*Amara (Reductocelia) minuta* (Motschulsky, 1844). Собран на г. Камень-Брат и руч. Сестринский. Зона неморальных и смешанных лесов: на берегах крупных рек в подстилке. Не редкий.

*Amara (Zezea) plebeja* (Gyllenhal, 1810). Собран на руч. Коварный. Долинные леса: на лесных полянах, сухих лугах и в антропогенных ландшафтах. Редкий.

*Anisodactylus (Pseudanisodactylus) signatus* (Panzer, 1796). Собран на руч. Коварный и в верховьях р. Уссури. Долины рек: в открытых сухих биотопах и агроценозах. Обычный.

*Apristus striatus* (Motschulsky, 1844). Собран в верховьях рек Уссури и Милоградовка, ручьях Березняки и Коварный. Галечниковые берега рек в зоне неморальных лесов. Обычный.

*Asaphidion semilucidum* (Motschulsky, 1862). Собран на ручьях Забытый, Коварный, Лукьянов Лог, истоке р. Уссури. Вся лесная зона, кроме пояса темнохвойной тайги: на поверхности почвы в разреженных лесах, на полянах и берегах рек. Обычный.

*Asaphidion ussuriense* Jedlička, 1965. Собран на ручьях Забытый и Коварный, верховья рек Милоградовка и Пасечная, г. Снежная. Вся лесная зона, кроме пояса темнохвойной тайги: на поверхности почвы в разреженных лесах, на полянах и берегах рек. Обычный.

*Badister (Baudia) marginellus* Bates, 1873. Собран на руч. Коварный, г. Камень-Брат, р. Милоградовка. Долинные и низкогорные неморальные леса: под пологом леса в подстилке и под камнями; отмечен в горной тундре. Обычный.

*Bembidion (Asioperypus) altestriatum* Netolitzky, 1934. Собран на ручьях Лукьянов Лог и Березняки, в верховьях рек Уссури и Милоградовка. На берегах стоячих водоемов и в других сырых биотопах в поясе широколиственных и смешанных лесов. Обычный.

*Bembidion (Asioperypus) ovale* (Motschulsky, 1844). Собран на ручьях Лукьянов Лог и Сестринский, р. Милоградовка. На берегах рек, стоячих водоемов и в других сырых биотопах в поясе широколиственных и смешанных лесов. Обычный.

*Bembidion (Bembidion) mandli* Netolitzky, 1932. Собран на горах Горелая Сопка, Снежная и Облачная, исток р. Уссури, руч. Коварный. В лесной зоне на открытых участках: полях, лугах, опушках, берегах рек; отмечен в поясе горных лугов и в горных тундрах. Многочисленный.

*Bembidion (Bembidion) paediscum* Bates, 1883. Собран в истоке р. Уссури. В зоне широколиственных лесов на открытых участках: лугах, опушках, берегах рек. Не редкий.

*Bembidion (Blepharoplastaphus) hastii* C.R. Sahlberg, 1827. Собран на ручьях Коварный и Березняки. На галечниковых берегах рек в зоне неморальных лесов. Редкий.

*Bembidion (Bracteon) conicolle* Motschulsky, 1844. Собран на руч. Березняки. На песчаных берегах рек и больших ручьев. Редкий.

*Bembidion (Bracteon) velox* (Linnaeus, 1761). Собран на руч. Березняки. На песчаных берегах рек и больших ручьев. Редкий.

*Bembidion (Hirmoplastaphus) hirmocoelum* Chaudoir, 1850. Собран на ручьях Березняки и Коварный, р. Милоградовка. Галечниковые берега рек в поясе неморальных лесов. Не редкий.

*Bembidion (Metallina) elevatum* (Motschulsky, 1844). Собран на горах Горелая Сопка, Снежная и Облачная, верховья р. Пасечная, ручьи Лукьянов Лог и Забытый. Вся лесная зона: под пологом леса в подстилке. Обычный.

*Bembidion (Metallina) properans* (Stephens, 1828). Собран на горах Горелая Сопка и Облачная. Вся лесная зона: под пологом леса в подстилке. Не редкий.

*Bembidion (Neoemphanes) shimoyamai* Habu, 1978. Собран на руч. Сестринский. В пойменных лесах под корой старых упавших деревьев, лежащих недалеко от проточных водоемов. Редкий.

*Bembidion (Notaphus) obliquum* Sturm, 1825. Собран на ручьях Коварный и Березняки. На песчаных и заиленных берегах рек в низкогорной зоне. Обычный.

*Bembidion (Ocydromus) scopulinum* (Kirby, 1837). Собран в истоке р. Уссури. В сырых биотопах в лесной зоне. Редкий.

*Bembidion (Peryphus) amurense* (Motschulsky, 1859). Собран на ручьях Победа, Коварный и Березняки, р. Милоградовка, г. Снежная. На берегах стоячих водоемов и в других сырых биотопах в поясе широколиственных и смешанных лесов; заходит в высокогорья. Обычный.

*Bembidion (Peryphus) captivorum* Netolitzky, 1943. Собран на ручьях Коварный и Березняки, р. Милоградовка. На берегах рек, ручьев, луж и в других влажных местах в лесной зоне. Обычный.

*Bembidion (Peryphus) grapii* Gyllenhal, 1827. Собран на ручьях Светлый и Коварный, горах Облачная и Снежная, в верховьях рек Уссури, Милоградовка и Пасечная. На берегах рек, ручьев и вдоль дорог в лесной зоне; заходит в высокогорья. Обычный.

*Bembidion (Peryphus) umeyai* Habu, 1959. Собран в верховьях р. Милоградовка. На скальном берегу горной реки в зоне смешанных лесов. Редкий. Для фауны России известен только с территории национального парка и Лазовского заповедника.

*Bembidion (Plataphodes) difficile* (Motschulsky, 1844). Собран на горах Камень-Брат, Горелая Сопка и Облачная, в истоке р. Уссури. Гигрофилен. На галечниковых берегах горных рек и ручьев. Обычный.

*Bembidion (Plataphodes) tetraporum* Bates, 1883. Собран на горах Камень-Брат и Снежная, в истоке р. Уссури. На галечниковых берегах горных рек и ручьев. Обычный.

*Bembidion (Plataphus) altaicum* (Gebler, 1833). Собран в верховьях р. Пасечная и руч. Березняки. На галечниковых берегах рек и ручьев в зоне широколиственных и смешанных лесов. Обычный.

*Bembidion (Plataphus) gebleri* Gebler, 1833. Собран в верховьях р. Пасечная и руч. Березняки. На галечниковых берегах рек и ручьев в зоне широколиственных и смешанных лесов. Обычный.

*Bembidion (Plataphus) infuscatipenne* Netolitzky, 1938. Собран на руч. Коварный. На галечниковых берегах рек и ручьев в лесной зоне. Обычный.

*Brachinus macrocerus* Chaudoir, 1876. Собран на р. Милоградовка. Зона неморальных лесов: на галечниковых берегах горных рек. Не редкий.

*Brachinus stenoderus* Bates, 1873. Собран на руч. Коварный. Зона неморальных лесов: на галечниковых берегах горных рек. Редкий.

*Bradycellus (Tachycellus) glabratulus* Lafer, 1989. Собран на г. Горелая Сопка. Все лесные пояса: в подстилке под пологом леса. Не редкий.

***Bradycellus (Tachycellus) glabratus* Reitter, 1894.** Собран на ручьях Лукьянов Лог, Сестринский и Победа, горах Горелая, Облачная и Снежная, р. Милоградовка. Все лесные пояса: в подстилке под пологом леса; отмечен в субальпийском поясе. Обычный.

***Calosoma (Calosoma) cyanescens* (Motschulsky, 1859).** Собран на руч. Коварный, в истоке р. Уссури и г. Снежная. Все типы лесов, кроме темнохвойной тайги; залетает в горные тундры. Хищничает на гусеницах бабочек-шелкопрядов. Не редкий.

***Calosoma (Campalita) chinense* Kirby, 1819.** Собран на руч. Коварный. Открытые пространства (лугов, болот и полей). Хищничает на гусеницах бабочек-совок. Редкий.

***Calosoma (Charmosta) lugens* Chaudoir, 1869.** Собран на руч. Коварный. Разреженные неморальные леса или опушки. Редкий.

***Carabus (Acoptolabrus) schrenckii* Ménériés, 1860.** Собран на ручьях Коварный, Забытый и Сухая Речка, г. Снежная. Под пологом леса во всех высотных поясах до высоты 1600 м. Не редкий.

***Carabus (Aulonocarabus) careniger* Chaudoir, 1863.** Собран на горах Горелая Сопка, Сестра, Снежная и Облачная, ручьях Забытый, Коварный, и Лукьянов Лог. Эндемик юга Сихотэ-Алиня. Во всех типах лесов; отмечен на горных лугах и в тундрах. Многочисленный.

***Carabus (Aulonocarabus) gossarei* Hauray, 1879.** Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог, горах Горелая Сопка, Сестра, Камень-Брат, Снежная и Облачная, р. Пасечная. Зеленомошные и разнотравные березово-елово-пихтовые леса на высоте 1000-1500 м; не редкий на северных склонах в горных тундрах. Многочисленный.

***Carabus (Carabus) arcensis* Herbst, 1784.** Собран на руч. Коварный. Неморальные леса: преимущественно на открытых местах (влажные и заболоченные луга, поляны, разреженные леса) в долинах рек и ручьев. Не редкий.

***Carabus (Carabus) granulatus* Linnaeus, 1758.** Собран в верховьях р. Милоградовка и руч. Коварный. Пойменные леса и заболоченные луга до высоты 500 м. Не редкий.

***Carabus (Diocarabus) aurocinctus* Motschulsky, 1844.** Собран в верховьях р. Пасечная, руч. Лукьянов Лог, горах Облачная и Снежная. Горно-таежный вид: в осветленных зеленомошных елово-пихтовых и каменноберезовых лесах. Не редкий.

***Carabus (Hemicarabus) macleayi* Dejean, 1826.** Собран на горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Снежная и Облачная, руч. Коварный, р. Милоградовка. Горные тундры; изредка в долинах рек. Обычный.

***Carabus (Hemicarabus) tuberculatus* Dejean, 1829.** Собран на руч. Коварный. Пойменные луга и открытые влажные участки в пойменных лесах. Редкий.

***Carabus (Megodontus) vietinghoffi* F.M. Adams, 1812.** Собран на горах Горелая Сопка, Облачная и Снежная, ручьях Коварный, Сестринский и Забытый, р. Милоградовка. Во всей лесной зоне; отмечен в горных тундрах. Обычный.

***Carabus (Morphocarabus) hummeli* Fischer von Waldheim, 1823.** Собран на ручьях Коварный, Лукьянов Лог и Забытый, горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Снежная и Облачная, р. Милоградовка. Все типы лесов, поляны и высокогорные луга. Обычный.

***Carabus (Morphocarabus) venustus* A. Morawitz, 1862.** Собран на горах Горелая Сопка и Снежная, ручьях Коварный и Забытый, реках Пасечная и Милоградовка. Во всех типах лесов и на высокогорных лугах. Многочисленный.

***Carabus (Parhomopterus) billbergi* Mannerheim, 1827.** Собран на горах Камень-Брат, Сестра, Горелая Сопка, Облачная и Снежная, руч. Коварный, верховья р. Пасечная. Все типы лесов, горные луга и тундры. Многочисленный.

***Chlaenius (Agostenus) quadrisulcatus* (Paykull, 1790).** Собран на руч. Коварный. На заболоченных лугах и сфагновых болотах в долинах крупных рек. Редкий.

***Chlaenius (Chlaenius) pallipes* (Gebler, 1823).** Собран на руч. Коварный. Открытые и разреженные биотопы в пойменных и долинных неморальных и смешанных лесах. Обычный.

***Chlaenius (Lissauchenius) posticalis* Motschulsky, 1854.** Собран на руч. Коварный. В зоне широколиственных долинных и пойменных лесов: на лугах, полях и в агроценозах. Редкий.

***Cicindela (Cicindela) coerulea* Pallas, 1773.** Собран в верховьях рек Пасечная и Милоградовка. Открытые пространства: песчаные луга, песчаные пляжи на берегах крупных рек и дороги, проходящие через луга и поля; выбирает уплотненные грунты. Не редкий.

***Cicindela (Cicindela) sachalinensis* A. Morawitz, 1862.** Собран на руч. Сестринский, г. Снежная, р. Милоградовка и устье руч. Победа. Открытые места с плотным или нарушенным грунтом вдоль берегов рек, по минерализованным полосам и на водоразделах в лесной зоне и высокогорьях. Обычный.

***Cicindela (Cicindela) transbaicalica* Motschulsky, 1844.** Собран в верховьях рек Пасечная и Милоградовка. Песчаные пляжи и косы непосредственно вдоль берегов рек. Не редкий.

***Curtonotus brevicollis* (Chaudoir, 1850).** Собран на руч. Коварный. Неморальная зона: на сухих лугах, полянах, сельскохозяйственных полях и пастбищах в долинах рек. Редкий.

***Curtonotus kataevi* Sundukov, 2001.** Собран на горах Горелая Сопка, Снежная и Облачная. Альпийская зона: на каменистых россыпях и в скалах на высотах 1400-1800 м. Обычный. Известен только с территории национального парка.

*Cychnus moravitzii* Géhin, 1885. Собран на горах Облачная и Снежная, ручьях Забытый и Коварный, р. Милоградовка. Под пологом леса в долинных и горных лесах. Не редкий.

*Cylindera (Cylindera) gracilis* (Pallas, 1773). Собран в верховьях р. Уссури. Сухие и умеренно влажные луга в долинах рек. Редкий.

*Cymindis (Menas) daimio* Bates, 1873. Собран на руч. Коварный. На сухих и увлажненных долинных лугах. Редкий.

*Cymindis (Tarulus) laferi* Sundukov, 1999. Собран на г. Снежная. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. Долинные и горные леса: на почве, под камнями и под корой упавших деревьев. Редкий.

*Cymindis (Tarulus) vaporariorum* (Linnaeus, 1758). Собран на горах Горелая Сопка и Облачная. В горных тундрах и каменноберезовых лесах на высоте 1300-1700 м. Редкий.

*Dicheirotichus (Trichocellus) punctatellus* (Reitter, 1894). Собран на руч. Коварный. Низкогорья: на открытых участках и берегах водоемов в долинах рек. Очень редкий.

*Diplous (Platidius) depressus* (Gebler, 1829). Собран на руч. Лукьянов Лог, Сестринский и Коварный, верховья рек Пасечная, Уссури и Милоградовка. Берега горных рек и ручьев до высоты 1000-1200 м: под камнями, живет колониями. Многочисленный.

*Diplous (Platidius) dolini* Zamotajlov, 2005. Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог, верховьях р. Уссури и Милоградовка. Берега горных рек и ручьев до высоты 1000-1200 м: под камнями, живет колониями. Обычный.

*Dromius (Dromius) maritimus* Lafer, 1989. Собран в верховьях р. Уссури. Долинные и низкогорные неморальные леса: в кронах деревьев. Очень редкий.

*Dromius (Dromius) quadraticollis* A. Morawitz, 1862. Собран на руч. Медоносный. Неморальные и смешанные долинные и горные леса: в кронах деревьев. Обычный.

*Drypta ussuriensis* Jedlička, 1963. Собран на руч. Коварный. Зона неморальных лесов: на лугах и полянах. Жуки бегают по почве среди травы или лазают по их стеблям. Редкий.

*Dyschirius (Eudyschirius) amurensis* Fedorenko, 1991. Собран на горах Облачная и Снежная. Открытые биотопы: поляны в долинных лесах, песчаные и заболоченные луга; отмечен в горных тундрах. Редкий.

*Dyschirius (Eudyschirius) ussuriensis* Fedorenko, 1991. Собран на г. Облачная и руч. Коварный. На обочинах дорог и раскорчевках в долинных лесах; обнаружен в темнохвойных лесах и горных тундрах. Редкий.

*Elaphropus latissimus* (Motschulsky, 1851). Собран в руч. Коварный. Предпочитает нарушенные биотопы: встречается под камнями и в почве по кромке полей и пастбищных лугов; заходит в пояс темнохвойной тайги до высоты 600-650 м. Редкий.

*Elaphropus zouhari* (Jedlička, 1961). Собран в истоке р. Уссури и руч. Коварный. Предпочитает нарушенные биотопы: встречается под камнями и в почве по кромке полей и пастбищных лугов в неморальной зоне. Редкий.

*Elaphrus (Neoelaphrus) sibiricus* Motschulsky, 1844. Собран на г. Облачная и р. Пасечная. На заболоченных берегах рек, озер и других водоемов в лесной зоне. Редкий.

*Eobrosicus (Eobrosicus) lutshniki* (Roubal, 1928). Собран на руч. Лукьянов Лог. Берега горных рек и ручьев в поясе темнохвойной тайги: в нишах под камнями или под корой деревьев. Не редкий.

*Harpalus (Harpalus) affinis* (Schrank, 1781). Собран на руч. Коварный, в верховьях р. Уссури, горах Облачная и Снежная. Долины рек: на открытых сухих участках (поляны, луга, пастбища, берега водоемов); отмечен в альпийском поясе. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) bungii* Chaudoir, 1844. Собран в верховьях р. Уссури и на г. Облачная. Зона долинных и низкогорных неморальных лесов: на открытых сухих участках (поляны, луга, пастбища, берега водоемов); отмечен на субальпийских лугах. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) corporosus* (Motschulsky, 1861). Собран в верховьях р. Пасечная и на г. Снежная. Неморальная зона: в открытых биотопах; отмечен в таежном поясе и на субальпийских лугах. Редкий.

*Harpalus (Harpalus) egorovi* Lafer, 1989. Собран в верховьях рек Уссури и Милоградовка. Поймы рек: на сухих галечниковых участках. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) laevipes* Zetterstedt, 1828. Собран на горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Снежная и Облачная. Вся лесная зона, чаще в темнохвойных и каменноберезовых лесах: в подстилке под пологом леса. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) lederi* Tschitschérine, 1899. На Сихотэ-Алине известен лишь с высокогорий г. Снежная, где является массовым видом. На сухих каменистых участках в горной тундре.

*Harpalus (Harpalus) major* (Motschulsky, 1850). Собран на руч. Коварный, верховьях р. Уссури, горах Облачная и Снежная. Вся лесная зона: в подстилке под пологом леса; отмечен в высокогорьях. Редкий.

*Harpalus (Harpalus) pallidipennis* A. Morawitz, 1862. Собран в устье руч. Победа. Долинные и низкогорные неморальные леса: на сухих лугах, лесных полянах, пастбищах и полях. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) tarsalis* Mannerheim, 1825. Собран на ручьях Лукьянов Лог и Коварный. Зоны неморальных и смешанных лесов: в подстилке под пологом леса или на лесных опушках. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) tichonis* Jakobson, 1907. Собран на г. Снежная. Смешанные леса: на опушках и полянах. На Южном Сихотэ-Алине очень редкий.

*Harpalus (Harpalus) torridoides* Reitter, 1900. Собран на горах Горелая Сопка, Сестра, Камень-Брат, Снежная и Облачная. Луга и пустоши в горных тундрах. Многочисленный.

*Harpalus (Harpalus) ussuricus* Mlynář, 1979. Собран на руч. Сестринский и верховьях р. Уссури. Вся лесная зона: в подстилке под пологом леса. Обычный.

*Harpalus (Harpalus) xanthopus* Gemminger et Harold, 1868. Собран на руч. Лукьянов Лог и г. Камень-Брат. Вся лесная зона, но более обычный в поясе темнохвойной тайги: в подстилке под пологом леса. Обычный.

*Harpalus (Pseudoophonus) coreanus* (Tschitschérine, 1895). Собран на руч. Коварный. Неморальная зона: на лесных полянах. Редкий.

*Harpalus (Pseudoophonus) griseus* (Panzer, 1796). Собран на руч. Коварный и в верховьях р. Уссури. Низкогорье: на сухих лугах, полях и других открытых биотопах. Обычный.

*Lachnolebia cribricollis* (A. Morawitz, 1862). Собран на г. Горелая Сопка и руч. Коварный. Долинные неморальные леса и низкогорные дубняки: на кустах леспедецы и под опадом на лесных полянах; имаго питаются личинками листоедов (сем. Chrysomelidae), живущими на леспедеце. Не редкий.

*Lebia (Poecilothais) bifenestrata* A. Morawitz, 1862. Собран в устье руч. Забытый. Долинные и низкогорные неморальные леса: в кронах деревьев лиственных пород. Обычный.

*Lebidia bioculata* A. Morawitz, 1863. Собран на г. Горелая Сопка. Долинные и низкогорные неморальные леса: в кронах деревьев лиственных пород. Редкий.

*Lebidia octoguttata* A. Morawitz, 1862. Собран на г. Горелая Сопка и устье ручьев Победа, Забытый и Изюбриный. Долинные и низкогорные неморальные леса: в кронах деревьев лиственных пород. Обычный.

*Leistus (Leistus) janae* Farkač et Plutenko, 1992. Эндемик г. Облачная. Высокогорная зона: на каменистых россыпях и скалах у выхода водотоков. Не редкий.

*Leistus (Leistus) niger* Gebler, 1847. Собран на реках Милоградовка и Пасечная, ручьях Коварный, Лукьянов Лог, Победа, Березняки и Забытый, горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Сестра, Облачная и Снежная. Горно-лесной вид. В трухлявых валежинах и под корой сухих деревьев во всех типах лесов. Обычный.

*Masuzoa ussuriensis* Lafer, 1989. Эндемик г. Облачная. Населяет пояс кедрового стланика в высокогорьях: влажные биотопы, в камнях под моховой дерновиной. Многочисленный.

*Microlestes minutulus* (Goeze, 1777). Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог, г. Облачная. Долины рек: на сухих лугах и пастбищах; отмечен на высокогорных лугах. Обычный.

*Miscodera arctica* (Paykull, 1798). Для Сихотэ-Алиня известен только из высокогорий г. Снежная. Собран на субальпийском лугу. Очень редкий.

*Nebria (Boreonebria) subdilata* Motschulsky, 1844. Собран на реках Милоградовка и Пасечная, руч. Коварный. Галечниковые берега рек и ручьев в зоне широколиственных и смешанных лесов. Обычный.

*Nebria (Catonebria) baicalopacifica* Dudko et Shilenkov, 2006. Для Сихотэ-Алиня известен 1 экз. с г. Облачная. Субальпийская зона. Редкий.

*Nebria (Catonebria) banksi* Crotch, 1871. Собран на р. Пасечная, ручьях Лукьянов Лог и Забытый, горах Камень-Брат и Облачная. Пояс темнохвойной тайги: под камнями на берегах горных рек и ручьев до высоты 1200-1600 м. Обычный.

*Nebria (Eonebria) djakonovi* Semenov et Znojko, 1928. Собран на горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Снежная и Облачная, реках Милоградовка и Пасечная, ручьях Лукьянов Лог и Березняки. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. В поясе темнохвойной тайги от 400 м до зоны горных тундр: под корой деревьев, в трухлявых валежинах, под камнями, в подстилке. Обычный.

*Nebria (Orientonebria) coreica* Solsky, 1875. Собран в верховьях руч. Коварный. Влажные луга, поляны и болота на равнинах и в низкогорье. Редкий.

*Nebria (Reductonebria) ochotica* R.F. Sahlberg, 1844. Собран на руч. Коварный и р. Милоградовка. Галечниковые берега рек и ручьев в зоне широколиственных и смешанных лесов до высоты 500-600 м. Обычный.

*Notiophilus impressifrons* A. Morawitz, 1862. Собран на ручьях Лукьянов Лог и Веселый, р. Милоградовка. Неморальные леса: обычно под сухими листьями или открыто бегают на почве. Не редкий.

*Notiophilus reitteri* Späth, 1900. Собран на руч. Лукьянов Лог и г. Горелая Сопка. В поясе темнохвойной тайги: чаще в еловых или пихтовых лесах на мхах на открытых участках. Не редкий.

*Notiophilus sibiricus* Motschulsky, 1844. Собран на г. Горелая Сопка. Каменно-березовые леса на южных склонах. Редкий.

*Paradromius (Manodromius) ruficollis* (Motschulsky, 1844). Собран на горах Горелая Сопка, Снежная и Облачная. В каменноберезняках и на брусничниках на высоте 1200-1500 м. Обычный.

*Patrobis assimilis* Chaudoir, 1844. Для Дальнего Востока России известен по 1 экз., собранному на г. Сестра. На берегу ручья в земеномошном лесу в поясе темнохвойной тайги на высоте 1450-1500 м. Очень редкий.

*Platynus (Platynus) assimilis* (Paykull, 1790). Собран на р. Милоградовка и в устье руч. Победа. Пойменные леса: на берегах водоемов или во влажных биотопах под пологом леса. Обычный.

*Poecilus (Poecilus) encopoleus* Solsky, 1873. Собран в устье руч. Победа. Вся лесная зона: на лугах, полянах, пастбищах и садовых участках. Не редкий.

*Poecilus (Poecilus) fortipes* (Chaudoir, 1850). Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог, верховьях р. Уссури. В безлесных ландшафтах в долинах рек и на лугах. Обычный.

*Poecilus (Poecilus) lamproderus* (Chaudoir, 1868). Собран на горах Горелая Сопка, Облачная и Снежная, руч. Сестринский. В разреженных лесах, на опушках, полянах в долинах рек, берегах водоемов; отсутствует в поясе темнохвойной тайги. Обычный; многочисленный в горных тундрах на высотах 1400-1600 м.

***Poecilus (Poecilus) reflexicollis* Gebler, 1832.** Собран на ручьях Лукьянов Лог и Коварный. Зона неморальных и смешанных лесов: на лугах и полянах. Обычный.

***Pristosia proxima* (A. Morawitz, 1862).** Собран на ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Победа, горах Горелая Сопка, Снежная и Облачная, р. Милоградовка. Вся лесная зона: только под пологом леса; часто залазят на стебли трав и кустарников; отмечен в высокогорье. Обычный.

***Pterostichus (Argutor) dulcis* (Bates, 1883).** Собран на руч. Коварный. На влажных лугах и болотах. Редкий.

***Pterostichus (Argutor) sulcitaris* A. Morawitz, 1862.** Собран в верховьях р. Уссури и руч. Коварный. В долинных и пойменных неморальных лесах: на берегах водоемов или в осветленных влажных биотопах. Обычный.

***Pterostichus (Badistrinus) laiticollis* (Motschulsky, 1844).** Собран в верховьях р. Милоградовка. Долинные и пойменные неморальные леса: предпочитает увлажненные биотопы на опушках и по границе лесонаждений; отмечен в поясе бореальных лесов на берегах водоемов. Не редкий.

***Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus* Eschscholtz, 1823.** Собран в верховьях рек Уссури, Милоградовка и Пасечная, ручьях Лукьянов Лог, Березняки, Забытый и Коварный, горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Облачная и Снежная. Все типы лесов всех высотных поясов: только под пологом леса. Обычный.

***Pterostichus (Bothriopterus) subovatus* (Motschulsky, 1860).** Собран на руч. Коварный. На берегах водоемов и других влажных участках в пойменных лесах; отмечен в темнохвойных лесах и в субальпийском поясе. Не редкий.

***Pterostichus (Cryobius) kurosawai* Tanaka, 1958.** Собран на руч. Коварный, горах Облачная и Снежная. Пояс темнохвойной тайги на высотах 800-1600 м: в подстилке и под камнями в истоках горных ключей. Обычный.

***Pterostichus (Cryobius) sp.*** Собран на г. Облачная. На альпийских пустошах и лугах на высоте 1800-1856 м. Обычный. Новый для науки вид.

***Pterostichus (Eosteropus) alacer* A. Morawitz, 1862.** Собран в верховьях рек Уссури и Пасечная, ручьях Лукьянов Лог, Победа, Светлый и Березняки, горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Снежная и Облачная. Вся лесная зона и субальпийский пояс: под пологом леса. Обычный.

***Pterostichus (Eosteropus) tuberculiger* (Tschitschérine, 1897).** Собран на ручьях Коварный, Лукьянов Лог и Забытый, р. Милоградовка. Неморальные и смешанные леса: под пологом леса. Обычный.

***Pterostichus (Eurythoracana) haptoderoides* (Tschitschérine, 1889).** Собран в верховьях р. Уссури. В пойменных лесах в увлажненных биотопах. Редкий.

***Pterostichus (Feroperis) kurentzovi* Lafer, 1979.** Собран на горах Горелая Сопка, Сестра и Камень-Брат, ручьях Лукьянов Лог, Сестринский, Сухая Речка и Коварный. Эндемик юго-восточного Сихотэ-Алиня. Все лесные пояса: под пологом леса; заходит в высокогорья. Многочисленный.

***Pterostichus (Feroperis) labzuki* Lafer, 1979.** Собран на горах Облачная и Снежная, руч. Забытый, р. Милоградовка. Эндемик юго-восточного Сихотэ-Алиня. Все лесные пояса: под пологом леса; заходит в высокогорья. Многочисленный.

***Pterostichus (Koreonialoe) microps* Heyden, 1887.** Собран на ручьях Забытый и Коварный, горах Облачная и Снежная, р. Милоградовка. Только под пологом леса, обычно в кедровых и темнохвойных лесах до высоты 1500 м: ведет скрытный подземный образ жизни. Обычный.

***Pterostichus (Lenapterus) galae* Farkač et Plutenko, 1996.** Собран на горах Горелая Сопка, Сестра, Камень-Брат, Облачная и Снежная. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. На каменистых россыпях в альпийской зоне. Обычный.

***Pterostichus (Metallophilus) interruptus* (Dejean, 1828).** Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог, горах Камень-Брат, Сестра, Снежная и Облачная, р. Милоградовка. Все типы лесов во всех высотных поясах: под пологом леса в почве, под камнями и под корой отмерших деревьев. Обычный; многочисленный в горных тундрах.

***Pterostichus (Petrophilus) sutschanensis* Jedlička, 1962.** Собран в верховьях рек Уссури и Пасечная, ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Коварный, горах Горелая Сопка, Камень-Брат, Облачная и Снежная. Эндемик Сихотэ-Алиня. Вся лесная зона: только под пологом леса. Многочисленный.

***Pterostichus (Phonias) eobius* (Tschitschérine, 1899).** Собран в верховьях р. Пасечная, ручьях Коварный и Забытый. Неморальные и смешанные леса: под пологом леса в подстилке. Обычный.

***Pterostichus (Phonias) jankowskyi* (Tschitschérine, 1897).** Собран на верховья р. Пасечная, руч. Коварный, г. Снежная. В долинных и горных неморальных и смешанных лесах: под пологом леса в подстилке; отмечен в альпийском поясе. Обычный.

***Pterostichus (Phonias) morawitzianus* (Lutshnik, 1922).** Собран на ручьях Забытый и Победа, г. Снежная, р. Милоградовка. В долинных лесах во всех зонах: под пологом леса. Обычный.

***Pterostichus (Phonias) sotkaensis* Jedlička, 1958.** Собран на г. Снежная и р. Милоградовка. Неморальные леса: под пологом леса в подстилке. Обычный.

***Pterostichus (Phonias) sp.*** Собран на г. Снежная. В подстилке у верхней границы темнохвойного леса на высоте 1400-1500 м и в альпийской зоне на берегу ручья на высоте 1600 м. Обычный. Новый для науки вид.

***Pterostichus (Platysma) eschscholtzi* (Germar, 1824).** Собран в верховьях р. Милоградовка. В пойменных неморальных лесах. Редкий.

***Pterostichus (Pledarus) gibbicollis (Motschulsky, 1844)***. Собран на горах Горелая Сопка и Снежная, ручьях Сестринский и Победа, р. Милоградовка. В лесной зоне: на опушках или лужайках. Обычный; не редкий в субальпийском поясе.

***Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull, 1790)***. Собран на руч. Коварный. На берегах рек, ручьев и других водоемов в пойменных лесах. Обычный.

***Pterostichus (Pseudomaseus) rotundangulus A. Morawitz, 1862***. Собран на руч. Коварный. На заболоченных пойменных лугах и моховых болотах. Редкий.

***Pterostichus (Rhaquadus) microcephalus (Motschulsky, 1860)***. Собран на руч. Коварный. Долинные и пойменные неморальные леса: предпочитает увлажненные биотопы. Редкий.

***Sericoda quadripunctata (DeGeer, 1774)***. Собран на горах Горелая Сопка, Облачная и Снежная. Вся лесная зона: более обычный в высокогорье, в нижних лесных поясах встречается на полянах и опушках. Не редкий.

***Stenolophus (Stenolophus) propinquus A. Morawitz, 1862***. Собран на ручьях Сестринский и Коварный. Долины рек: под пологом леса или на опушках в подстилке сырых биотопов. Обычный.

***Syntomus pallipes (Dejean, 1825)***. Собран на ручьях Коварный и Лукьянов Лог. Луга, поляны и разреженные леса в долинах рек. Обычный.

***Synuchus (Synuchus) agonus (Tschitschérine, 1895)***. Собран на горах Горелая Сопка и Облачная, руч. Светлый, р. Милоградовка. Во всех поясах лесной зоны: под пологом леса; имаго появляются во второй половине лета (июль-октябрь); отмечен в альпийском поясе. Многочисленный.

***Synuchus (Synuchus) congruus (A. Morawitz, 1862)***. Собран на руч. Лукьянов Лог. Разреженные леса, вырубки, опушки и заросли кустарников в неморальной зоне. Редкий.

***Synuchus (Synuchus) intermedius Lindroth, 1956***. Собран на г. Горелая Сопка, руч. Лукьянов Лог. Долинные и горные неморальные леса: только под пологом леса; имаго появляются во второй половине лета (июль-сентябрь). Редкий.

***Synuchus (Synuchus) vivalis (Illiger, 1798)***. Собран на горах Горелая Сопка и Облачная, ручьях Лукьянов Лог и Сестринский. Вся лесная зона, более обычный в темнохвойных лесах: под пологом леса; имаго появляются во второй половине лета (август-октябрь). Обычный.

***Tachys (Paratachys) micros Fischer von Waldheim, 1828***. Собран в истоке р. Уссури, руч. Коварный, г. Снежная. Во влажных биотопах на полях, лугах и берегах рек под камнями; залетает до высоты 1000-1600 м. Редкий.

***Tachyta (Tachyta) nana (Gyllenhal, 1810)***. Собран на руч. Коварный и г. Снежная. Под корой мертвых деревьев в поймах рек, но отмечен в альпийской зоне. Обычный.

***Trechus (Ephius) densicornis (Fischhuber, 1977)***. Собран на руч. Коварный. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. Берега рек и ручьев, пойменные леса, влажные биотопы в дубняках, во мху в темнохвойных и в подстилке в каменноберезовых лесах до высоты 900-950 м. Обычный.

***Trechus (Trechus) apicalis Motschulsky, 1845***. Собран на горах Горелая Сопка и Сестра. В лесной подстилке в поясе темнохвойной тайги на высотах 1300-1600 м. Обычный.

***Trechus (Trechus) basarukini P. Moraveč et Wrase, 1997***. Собран на горах Горелая Сопка, Сестра и Снежная, руч. Лукьянов Лог. Эндемик верховий р. Уссури. Пояса темнохвойной тайги и высокогорий на высотах 1100-1680 м: в лесной подстилке, под камнями и на берегах ручьев. Многочисленный.

***Trechus (Trechus) sikhotealinus Uéno et Lafer, 1994***. Собран на горах Горелая Сопка, Сестра, Облачная и Снежная, ручьях Забытый и Березняки. Эндемик Сихотэ-Алиня. Пояс темнохвойной тайги на высотах 1200-1600 м: в лесной подстилке и на берегах ручьев. Многочисленный.

***Trechus (Trechus) sundukovi P. Moraveč et Wrase, 1997***. Известен по 1 экз. с г. Сестра, собранному в лесной подстилке в поясе темнохвойной тайги на высоте 1600-1650 м. Очень редкий.

***Trichotichnus (Trichotichnus) coruscus (Tschitschérine, 1895)***. Собран на ручьях Коварный, Победа и Забытый, р. Милоградовка. Долинные и горные неморальные и смешанные леса: под камнями и в подстилке под пологом леса. Обычный.

***Trichotichnus (Trichotichnus) nishioi Habu, 1961***. Собран в верховьях р. Милоградовка. Долинные и горные неморальные леса: под камнями и в подстилке под пологом леса. Не редкий.

***Xestagonum nazarovi (Lafer, 1976)***. Собран на горах Камень-Брат, Облачная и Снежная, руч. Лукьянов Лог. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. Пояс темнохвойных и смешанных лесов: ведет скрытный образ жизни, встречается в почве, под камнями и глубоко в подстилке на высотах 500-1700 м. Многочисленный.

#### Семейство Морщинники – Helophoridae

***Helophorus (Rhopalhelophorus) browni McCorcle, 1967***. Собран на г. Облачная. На берегах водоемов: в иле и на глинистых почвах. Редкий.

***Helophorus (Rhopalhelophorus) nanus (Sturm, 1836)***. Собран на г. Облачная. Разнообразные стоячие водоемы: в иле и глине. Редкий.

#### Семейство Водолюбы – Hydrophilidae

*Laccobius (Laccobius) binotatus* d'Orchymont, 1934. Собран на г. Облачная. В прибрежной зоне стоячих и слабопроточных водоемов. Не редкий.

*Laccobius (Laccobius) minutus* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Облачная. В прибрежной зоне различных водоемов. Не редкий.

#### Семейство Карапузики – Histeridae

*Acritus minutus* (Herbst, 1792). Собран в верховьях р. Пасечная. Под корой и в трухе деревьев. Обычный.

*Hister sedakovii* Marseul, 1861. Собран на руч. Лукьянов Лог. В навозе и гниющих растительных остатках. Не редкий.

#### Семейство Агиртиды – Agyrtidae

*Pteroloma forstroemi* (Gyllenhal, 1810). Собран на горах Горелая Сопка и Снежная, руч. Лукьянов Лог. Темнохвойные и кедрово-широколиственные леса: на каменистых берегах быстрых рек и ручьев под пологом леса. Редкий.

*Pteroloma sibiricum* Székessy, 1935. Собран на г. Облачная. Темнохвойные и кедрово-широколиственные леса, альпийский пояс: на каменистых берегах быстрых рек и ручьев. Редкий.

#### Семейство Малые падальные жуки – Leiodidae

*Apocatops sachalinensis* (Yablokov-Khzorlan, 1970). Собран на горах Горелая Сопка и Облачная. В лесной подстилке. Не редкий.

*Catops angustitarsis angustitarsis* (Reitter, 1896). Собран на г. Горелая Сопка. В лесной подстилке, на трупах. Обычный.

*Catops lydiae* Yablokov-Khnozian, 1970. Собран на горах Горелая Сопка и Облачная. В лесной подстилке. Не редкий.

*Mesocatops ussuriensis* Růžička, 1992. Описан и до сих пор известен лишь с г. Облачная. В лесной подстилке. Редкий.

*Perkovskius ussuriensis* Lafer, 1989. Собран на горах Горелая Сопка и Сестра. Эндемик юга Приморского края. Берега рек и ручьев: во влажной лесной подстилке. Обычный.

*Perkovskius zerchei* Perreau et Růžička, 2007. Собран на г. Горелая Сопка. Эндемик юга Приморского края. Берега рек и ручьев: во влажной лесной подстилке. Не редкий.

*Ptomaphagus (Ptomaphagus) sibiricus* Jeannel, 1934. Собран на г. Облачная. В подстилке. Редкий.

*Sciodrepoides fumatus* (Spence, 1813). Собран на г. Горелая Сопка. Под пологом леса: в подстилке. Не редкий.

#### Семейство Мертвоеды и могильщики – Silphidae

*Aclypea daurica* (Gebler, 1832). Собран в устье руч. Забытый. На лесных полянах и лугах. Обычный.

*Aclypea opaca* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Победа. На лесных полянах и лугах. Обычный.

*Dendroxena sexcarinata* Motschulsky, 1862. Собран в устье ручьев Забытый, Изюбриный и Победа. Хищник. На ветках и цветах кустарников и деревьев. Обычный.

*Nicrophorus investigator* (Zetterstedt, 1824). Собран на г. Горелая Сопка. На падали. Обычный.

*Nicrophorus maculifrons* Kraatz, 1877. Собран на г. Горелая Сопка и в устье руч. Забытый. На падали. Обычный.

*Nicrophorus quadripunctatus* Kraatz, 1877. Собран в устье руч. Забытый. Долинные и горные неморальные леса: на падали. Обычный.

*Nicrophorus tenuipes* (Lewis, 1887). Собран на г. Облачная. В лесах: на падали. Редкий.

*Nicrophorus vespilloides* (Herbst, 1783). Собран на горах Облачная и Снежная. На лугах, опушках, под пологом леса; более обычный в зоне темнохвойных и смешанных лесов. Обычный.

*Oiceoptoma thoracicum* (Linnaeus, 1758). Собран в устье ручьев Забытый и Победа. На экскрементах, падали, гниющих грибах, вытекающем соке деревьев. Обычный.

*Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758). Собран в устье ручьев Изюбриный и Победа. Хищник. На дорогах и в подстилке под пологом леса. Обычный.

*Silpha perforata* (Gebler, 1832). Собран на горах Горелая Сопка и Снежная. На падали, экскрементах, в подстилке. Обычный.

*Thanatophilus sinuatus* (Fabricius, 1775). Собран в устье руч. Победа. На полянах: на падали и экскрементах. Редкий.

#### Семейство Стафилиниды – Staphylinidae

*Philontus (Philonthus) oberti* Eppelsheim, 1889. Собран на руч. Лукьянов Лог. В лесной подстилке. Обычный.

*Stenus (Stenus) secretus* Bernhauer, 1915. Собран на руч. Лукьянов Лог. На галечниковых берегах рек и ручьев. Обычный.

*Zyras (Zyras) optatus* (Sharp, 1888). Собран на г. Облачная. В лесной подстилке. Редкий.

#### Семейство Пластинчатогусы – Scarabaeidae

*Aphodius (Acrossus) binaevulus* Heyden, 1887. Собран на г. Горелая Сопка. В экскрементах. Редкий.

*Aphodius (Acrossus) depressus* (Kugelann, 1889). Собран в устье руч. Забытый. В экскрементах. Обычный.

*Aphodius (Phaeaphodius) rectus* (Motschulsky, 1866). Собран на г. Горелая Сопка, устья ручьев Забытый и Победа. В экскрементах. Обычный.

*Caccobius (Caccobius) brevis* Waterhouse, 1875. Собран на руч. Лукьянов Лог. В экскрементах. Редкий.

*Caccobius (Caccophilus) christophi* Harold, 1879. Собран на г. Горелая Сопка, руч. Лукьянов Лог. В экскрементах, на падали. Обычный.

*Caccobius (Caccophilus) sordidus* Harold, 1886. Собран на руч. Лукьянов Лог. В экскрементах. Редкий.

*Cetonia (Eucetonia) magnifica* Ballion, 1871. Собран на г. Снежная. Имаго на цветах. Обычный.

*Gnorimus subopacus* Motschulsky, 1860. Собран в устье руч. Забытый. Имаго на цветах. Обычный.

*Lasiotrichius succinctus* (Pallas, 1781). Собран на ручьях Лукьянов Лог и Забытый. Имаго на цветах. Обычный.

*Onthophagus (Alonthophagus) uniformis* Heyden, 1886. Собран в устье руч. Победа. В экскрементах. Обычный.

*Onthophagus (Palaeonthophagus) olsoufieffi* Boucomont, 1924. Собран в верховьях р. Маргаритовка. В экскрементах. Редкий.

*Protaetia (Liocola) marmorata* (Fabricius, 1792). Собран в устье ручьев Забытый и Победа. Под пологом леса. Обычный.

*Sericaria fuscolineata* Motschulsky, 1860. Собран на г. Горелая Сопка, устье руч. Забытый. Имаго на цветах. Обычный.

#### Семейство Златки – Buprestidae

*Agrilus* (inc. sed.) *quadrisignatus* Marseul, 1866. Собран в устье руч. Изюбриный. На ильмовых. Обычный.

*Agrilus (Robertius) peregrinus* Kiesenwetter, 1879. Собран в устье руч. Забытый. На японской ольхе и ильмовых. Не редкий.

*Agrilus (Robertius) subauratus amurensis* Obenberger, 1922. Собран в устье ручьев Победа, Забытый и Изюбриный. На тополях, ивах, осинах, березах, дубах, лещине. Обычный.

*Anthaxia (Melanthaxia) quadrifoveolata attavistica* Obenberger, 1918. Собран на г. Сестра, устье ручьев Победа и Забытый. Личинки вероятно на хвойных; жуки на цветках. Не редкий.

*Anthaxia (Melanthaxia) reticulata* Motschulsky, 1859. Собран в устье ручьев Забытый и Изюбриный. Личинки на кедре корейском, пихтах и, вероятно, на других соснах; жуки на цветках. Многочисленный.

*Dicerca furcata* (Thunberg, 1787). Собран на р. Милоградовка и устье руч. Забытый. На березах. Обычный.

#### Семейство Пилюльщики – Byrrhidae

*Byrrhus (Byrrhus) fasciatus* (Forster, 1771). Собран на г. Снежная. На мхах в горнотаежных лесах и альпийской зоне. Не редкий.

*Byrrhus (Byrrhus) pilula* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Облачная. На мхах в субальпийском поясе, темнохвойных и кедрово-широколиственных лесах. Не редкий.

*Byrrhus (Byrrhus) sochondensis* Tshernyshev, 1999. Собран на горах Горелая Сопка и Снежная. На мхах в лесах и альпийском поясе. Редкий.

*Cytilus sericeus* (Forster, 1771). Собран на руч. Лукьянов Лог. На мхах на берегах рек и ручьев. Обычный.

*Exomella sikhotealinensis* Pütz et Lafer, 1995. Собран на горах Сестра и Снежная. Эндемик Сихотэ-Алиня. На мхах в таежных лесах. Редкий.

*Lamprobyrrhulus nitidus* (Schaller, 1783). Собран на г. Снежная. Во влажной подстилке темнохвойных лесов. Не редкий.

#### Семейство Щелкуны – Elateridae

*Agrypnus agrillaceus* (Solsky, 1871). Собран на руч. Лукьянов Лог. Имаго на древесной и травянистой растительности; личинки под корой гнилой древесины дубов. Редкий.

*Berninelsonius hyperboreus* (Gyllenhal, 1827). Собран на г. Снежная. Берега рек и ручьев. Обычный.

*Corymbitodes epipedus* Gurjeva, 1985. Собран на руч. Лукьянов Лог. Эндемик Приморского края. Поляны и опушки в лесной зоне. Не редкий.

*Denticollis cinctus* (Candèze, 1863). Собран на г. Горелая Сопка. Личинки в гнилой древесине. Обычный.  
*Denticollis linearis* (Linnaeus, 1758). Собран на руч. Лукьянов Лог. Личинки в гнилой древесине различных пород. Обычный.  
*Ectinus dahuricus* (Candèze, 1863). Собран на руч. Лукьянов Лог. Широколиственные и смешанные леса: личинки в почве и подстилке. Обычный.  
*Hypoganomorphus laevicollis* (Mannerheim, 1852). Собран на г. Снежная и в верховьях р. Пасечная. В лесах: личинки в лесной почве и подстилке, в почве и под камнями по берегам рек и ручьев. Обычный.  
*Metanomus infuscatus* (Eschscholtz, 1829). Собран на горах Снежная и Горелая Сопка. Горные леса и высокогорья: личинки в почве и в подстилке. Обычный.  
*Sericus brunneus* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Горелая Сопка. Лесной вид: личинки в сухих стадиях, фитофаги. Не редкий.

#### Семейство Краснокрылы – Lycidae

*Dictyoptera aurora* (Herbst, 1784). Собран в устье ручьев Забытый и Победа. В гнилой древесине лиственных пород. Не редкий.  
*Erotides nasuta* (Kiesenwetter, 1874). Собран в устье руч. Победа. В гнилой древесине лиственных пород. Редкий.

#### Семейство Мякотелки – Cantharidae

*Cantharis rufa* Linnaeus, 1758. Собран в устье ручьев Забытый и Победа. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Обычный.  
*Malthacus angusticollis* (Motschulsky, 1860). Собран в устье руч. Забытый. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Редкий.  
*Malthacus flavimanus* (Motschulsky, 1860). Собран в устье руч. Забытый. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Редкий.  
*Malthacus kolymensis* (Kazantsev, 1992). Собран в устье руч. Победа. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Не редкий.  
*Pacificanthia knirschi* (Pic, 1929). Собран в устье руч. Забытый. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Не редкий.  
*Podabrus annulatus* (Mannerheim, 1825). Собран в устье руч. Победа. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Редкий.  
*Podabrus marginellus* Motschulsky, 1860. Собран в устье руч. Забытый. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Редкий.  
*Rhagonycha geniculata* Gebler, 1832. Собран в устье руч. Забытый. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Редкий.  
*Rhagonycha mimica* Medvedev et Ryvkin, 1989. Собран в устье руч. Победа. На различной растительности: деревьях, кустарниках, травах. Редкий.

#### Семейство Малашки – Malachiidae

*Troglocollops sundukovi* Tshernyshev, 2007. Собран на горах Камень-Брат и Снежная. На камнях в высокогорной зоне. Редкий.

#### Семейство Плоскотелки – Cucujidae

*Cucujus haematodes* Erichson, 1845. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Победа и Забытый. Не редкий.  
*Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792). Собран на руч. Лукьянов Лог. Под корой лиственных и хвойных пород. Не редкий.

#### Семейство Скрытноеды – Cryptophagidae

*Atomaria elongatula* Erichson, 1845. Собран в истоке руч. Березняки. В лесной подстилке, на грибах. Не редкий.

#### Семейство Жуки-ящерицы – Languriidae

*Cryptophilus quadrisignatus* Motschulsky, 1861. Собран на г. Снежная. На грибах. Не редкий.

#### Семейство Жуки-грибовики – Erotylidae

*Pseudotritoma arakii* (Nakane, 1954). Собран на руч. Забытый. На грибах-трутовиках. Редкий.

*Pseudotritoma laferi* Krivolutskaya, 1992. Собран на г. Облачная. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. На грибах-трутовиках. Редкий.

Семейство Плеснееды – Endomychidae

*Lycoperdina mandarinea* Gerstaecker, 1858. Собран на руч. Лукьянов Лог. На грибах-дождевиках. Редкий.

Семейство Божьи коровки – Coccinellidae

*Aiolocaria hexaspilota* (Hope, 1831). Собран в устье руч. Забытый. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Обычный.

*Anatis halonis* Lewis, 1896. Собран на г. Снежная. На хвойных породах. Обычный.

*Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758). Собран в истоке руч. Березняки. На хвойных породах, редко на лиственных. Редкий.

*Calvia decemguttata* (Linnaeus, 1767). Собран на г. Горелая Сопка. На лиственных породах. Обычный.

*Calvia duodecimmaculata* (Gebler, 1832). Собран на г. Снежная и руч. Лукьянов Лог. На лиственных породах, редко на хвойных. Обычный.

*Myrzha octodecimguttata* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Горелая Сопка. Хвойные леса; питается тлями. Редкий.

Семейство Пыльцееды – Alleculidae

*Allecula (Upinella) ussuriensis* Borchmann, 1937. Собран на руч. Лукьянов Лог. Имаго на цветах; личинки в разлагающейся древесине. Обычный.

*Hymenalia (Hymenalia) rufipennis* (Marseul, 1876). Собран в устье руч. Забытый. Имаго на цветах; личинки в подстилке, почве. Многочисленный.

Семейство Огнецветки – Pyrochroidae

*Schizotus fuscicollis* (Mannerheim, 1853). Собран в верховьях р. Пасечная и на г. Снежная. Имаго на стеблях, листьях и цветах; личинки в разлагающейся древесине. Обычный.

Семейство Скраптииды – Scraptiidae

*Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758). Собран на ручьях Забытый и Лукьянов Лог. На цветущей растительности; питаются пыльцой. Многочисленный.

Семейство Листоеды – Chrysomelidae

*Agelasa nigriceps* Motschulsky, 1860. Собран на ручьях Лукьянов Лог и Забытый. На актинидии. Обычный.

*Agelastica coerulea* Baly, 1874. Собран ручьях Лукьянов Лог и Изюбриный. На ольхе, редко на березе, орешнике, ивах. Многочисленный.

*Altica bisulcata* (Weise, 1887). Собран на г. Горелая Сопка и руч. Лукьянов Лог. На ивах, осине, рододендроне даурском. Обычный.

*Altica carduorum* (Guerin-Meneville, 1858). Собран в устье ручьев Победа и Забытый. Луга, агроценозы, рудеральная растительность. Редкий.

*Altica sajanica* (Csiki, 1901). Собран на руч. Лукьянов Лог. Луга, берега водоемов. Редкий.

*Argopus (Argopus) unicolor* Motschulsky, 1860. Собран на руч. Лукьянов Лог. Луга, разреженные дубняки на сопках. Обычный.

*Basilepta fulvipes* (Motschulsky, 1860). Собран на руч. Лукьянов Лог. Сухие луга, залежи: на полыни, плодовых деревьях и кустарниках. Обычный.

*Bromius obscurus* Linnaeus, 1758. Собран в устье ручьев Победа и Забытый, г. Снежная. На кипрее и винограде. Обычный.

*Cassida (Cassida) nebulosa* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Забытый. На маревых, амарантовых. Редкий.

*Chrysolina (Anopachys) sundukovi* Mikhailov, 2006. Собран на г. Облачная. Эндемик Южного Сихотэ-Алиня. На полыни. Редкий.

*Chrysolina (Bourdonneana) koltzei lamii* Takizawa, 1970. Собран в устье ручьев Изюбриный и Забытый. Влажные болотистые луга. Обычный.

*Chrysolina (Chrysocrosita) nikolskyi sutschanica* L. Medvedev, 1970. Собран на г. Снежная. Горно-таежный вид. Обычный.

*Chrysomela (Chrysomela) populi* Linnaeus, 1758. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Победа и Изюбриный. На осине, тополе, ивах. Обычный.

*Chrysomela (Chrysomela) tremula* Fabricius, 1787. Собран в устье руч. Забытый. На осине. Обычный.

*Chrysomela (Macrolina) cuprea* Fabricius, 1775. Собран на ручьях Лукьянов Лог и Победа. На ивах, чозении. Многочисленный.

*Chrysomela (Macrolina) lapponica* Linnaeus, 1758. Собран на г. Снежная. На ивах, березах, ольхе. Редкий.

*Chrysomela (Macrolina) vigintipunctata* (Scopoli, 1763). Собран на ручьях Лукьянов Лог, Победа и Забытый. На ивах, реже на тополе. Многочисленный.

*Clytra (Clytra) arida* Weise, 1889. Собран на руч. Лукьянов Лог. Разреженные широколиственные леса, опушки: полифаг, предпочитает иву, лещину, березу. Не редкий.

*Colasposoma dauricum* Mannerheim, 1849. Собран в устье руч. Изюбриный. Сухие луга, залежи, пустыри: полифаг. Не редкий.

*Cryptocephalus (Asionus) hirtipennis* Faldermann, 1835. Собран в устье руч. Победа. Пойменные луга: на иве, чозении, березе, ольхе. Редкий.

*Cryptocephalus (Cryptocephalus) krutovskyi* Jacobson, 1901. Собран на г. Снежная. Альпийский и субальпийский пояса: на березе. Редкий. Впервые отмечается на Дальнем Востоке.

*Cryptocephalus (Cryptocephalus) luridipennis luridipennis* Suffrian, 1854. Собран на г. Снежная. Лесной вид, в горах и предгорьях вдоль рек и во влажных понижениях: на лещине и дазифоре. Обычный.

*Cryptocephalus (Cryptocephalus) ochroloma* Gebler, 1830. Собран в устье руч. Забытый. Леса, опушки, пойменные заросли: на ивах, березе, осине, дубе и кустарниковых розоцветных. Обычный.

*Gallerucida bifasciata* Motschulsky, 1860. Собран в устье ручьев Победа и Забытый. На щавеле и горцах. Многочисленный.

*Gastrolina peltoidea* (Gebler, 1832). Собран на ручьях Лукьянов Лог, Победа и Забытый. На ольхе и ясене. Обычный.

*Gonioctena (Brachyphytodecta) fulva* Motschulsky, 1860. Собран на руч. Лукьянов Лог. На леспедеце. Обычный.

*Gonioctena (Gonioctena) flavicornis* (Suffrian, 1851). Собран на г. Снежная. На березах, ивах. Не редкий.

*Gonioctena (Gonioctena) gracilicornis* (Kraatz, 1879). Собран в устье руч. Победа. На иве, реже на чозении. Редкий.

*Gonioctena (Gonioctena) honshuensis honshuensis* Nakane, 1963. Собран в устье руч. Победа. На иве, березе. Редкий. Впервые отмечается для Приморского края.

*Gonioctena (Gonioctena) jacobsoni* Ogloblin et L. Medvedev, 1956. Собран в верховьях р. Пасечная, устье ручьев Победа и Забытый. На ивах и тополях. Обычный.

*Gonioctena (Gonioctena) ogloblini* L. Medvedev et Dubeshko, 1972. Собран в верховьях р. Пасечная, руч. Лукьянов Лог, г. Снежная. Монофаг на ольхе. Многочисленный.

*Gonioctena (Gonioctena) sibirica* Weise, 1893. Собран на ручьях Лукьянов Лог и Победа, г. Снежная. На черемухе и рябине. Обычный.

*Gonioctena (Gonioctena) viminalis* (Linnaeus, 1758). Собран в устье ручьев Изюбриный и Забытый. На иве, осине, чозении. Обычный.

*Lochmaea capreae cribrata* (Solsky, 1872). Собран в устье ручьев Победа, Изюбриный и Забытый. На ивах, березе. Обычный.

*Melixanthus pumilio* (Suffrian, 1854). Собран на г. Горелая Сопка. На ивах. Редкий. Впервые отмечается для Приморского края.

*Phratora (Phratora) laticollis* Suffrian, 1851. Собран на руч. Лукьянов Лог. На ивах. Редкий.

*Phratora (Phyllodecta) atrovirens* (Cornelius, 1857). Собран в устье руч. Победа. На ивах, березах. Обычный.

*Phratora (Phyllodecta) vitellinae* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Снежная. На ивах, тополях, чозении, реже на березе. Не редкий.

*Plagiosterna aenea aenea* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Снежная, в устье ручьев Забытый, Победа и Изюбриный. На ольхе. Многочисленный.

*Plateumaris (Plateumaris) sericea sibirica* (Solsky, 1872). Собран в устье руч. Изюбриный. Заболоченные берега стоячих водоемов в поймах рек: на осоке. Не редкий.

*Prasocuris phellandrii* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Изюбриный. Берега водоемов, сырые луга: на зонтичных. Редкий.

*Smaragdina (Monrosiana) aurita hammarstroemi* Jacobson, 1901. Собран на руч. Лукьянов Лог. На иве, леспедеце. Не редкий.

*Smaragdina (Monrosiana) obscuripes* (Weise, 1887). Собран на руч. Лукьянов Лог. На березах, черемухе, ивах. Обычный.

*Syneta adamsi* Baly, 1877. Собран на г. Горелая Сопка и устье руч. Изюбриный. Полифаг на древесных породах. Обычный.

*Syneta betulae amurensis* (Pic, 1901). Собран на ручьях Лукьянов Лог и Забытый, г. Снежная. Полифаг на древесных породах. Многочисленный.

*Xanthogaleruca maculicollis* (Motschulsky, 1853). Собран в верховьях р. Пасечная. На ильме. Редкий.

*Xanthogaleruca semifulva* (Jacoby, 1885). Собран в устье руч. Изюбриный. В лесах: на липе. Редкий.

*Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833). Собран в устье ручьев Победа и Забытый. Связан с хвойными. Не редкий.

*Acmaeops septentrionis* C.Thomson, 1866. Собран в устье руч. Победа. Связан с хвойными. Редкий.

*Agapanthia (Agapanthiella) daurica* Ganglbauer, 1884. Собран в устье ручьев Победа и Забытый. Поля, луга, опушки: на сложноцветных. Обычный.

*Alosterna perpera* Danilevsky, 1988. Собран в устье ручьев Забытый и Победа. На соцветиях травянистых растений и актинидии. Не редкий.

*Amarysius altajensis sellatus* Germar, 1824. Собран в устье руч. Победа. На чубушнике, рябинолистнике. Редкий.

*Anastrangalia renardi* (Gebler, 1848). Собран в устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Обычный.

*Anastrangalia scotodes continentalis* Plavilstshikov, 1936. Собран на г. Облачная и устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Обычный.

*Anastrangalia sequensi* (Reitter, 1898). Собран в устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Обычный.

*Anoplodera (Anoploderomorpha) cyanea* (Gebler, 1832). Собран в устье руч. Забытый. Жуки на цветках. Не редкий.

*Aseum striatum* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Победа. Связан с хвойными; технический вредитель. Обычный.

*Brachyta amurensis* Kraatz, 1879. Собран на руч. Веселый. Жуки на пионах. Обычный.

*Brachyta bifasciata* (Olivier, 1792). Собран в устье руч. Победа. На пионах в период цветения. Не редкий.

*Brachyta sachalinensis* Matsumura, 1911. Собран на г. Снежная и устье руч. Забытый. На цветах. Обычный.

*Evodinellus borealis* (Gyllenhal, 1827). Собран на г. Снежная и устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Обычный.

*Carilia virginea kozhevnikovi* Plavilstshikov, 1915. Собран в устье ручьев Забытый и Победа. Связан с хвойными. Не редкий.

*Clytus (Clytus) arietoides* Reitter, 1899. Собран в устье руч. Победа. На листьях и тонких сухих веточках деревьев и кустарников. Редкий.

*Judolia parallelopipeda* (Motschulsky, 1860). Собран на г. Горелая Сопка. Связан с хвойными. Редкий.

*Lamia textor* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Победа. Ивняки по берегам рек. Редкий.

*Leptura (Leptura) duodecimguttata* Fabricius, 1801. Собран на г. Снежная и устье руч. Победа. Чаще на зонтичных. Обычный.

*Lepturobosca virens* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Снежная. Связан с хвойными. Редкий.

*Mesosa myops* (Dalman, 1817). Собран в устье руч. Изюбриный. Многояден: на валежнике, дровах лиственных пород. Обычный.

*Molorchus (Molorchus) minor* (Linnaeus, 1767). Собран в устье ручьев Победа, Изюбриный и Забытый. Связан с хвойными; технический вредитель древесины. Многочисленный.

*Monochamus guttulatus* Gressit, 1951. Собран в устье руч. Победа. На усохших ветках лиственного валежа. Редкий.

*Monochamus saltuarius* Gebler, 1830. Собран в устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Редкий.

*Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758). Собран в устье ручьев Победа и Забытый. Связан с хвойными; технический вредитель древесины. Обычный.

*Monochamus urussovii* (Fischer von Waldheim, 1806). Собран на г. Снежная, устье ручьев Забытый и Победа. Связан с хвойными, крайне редко заселяет березу; технический вредитель древесины. Обычный.

*Nivellia extensa* (Gebler, 1841). Собран в устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Редкий.

*Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827). Собран на г. Снежная, устье ручьев Забытый и Победа. Связан с хвойными. Обычный.

*Oberea (Oberea) depressa* (Gebler, 1825). Собран в устье руч. Победа. На лиственных породах. Редкий.

*Oberea (Oberea) morio* Kraatz, 1879. Собран в устье руч. Победа. На чине. Редкий.

*Oedecnema gebleri* Ganglbauer, 1889. Собран в устье руч. Забытый. Связан с хвойными. Не редкий.

*Pachyta bicuneata* Motschulsky, 1860. Собран в устье руч. Забытый. Связан с кедром корейским. Редкий.

*Rhagium inquisitor rugipenne* Reitter, 1898. Собран на г. Снежная. Связан с хвойными. Обычный.

*Rhopaloscelis unifasciatus* Blessig, 1873. Собран в устье ручьев Победа, Изюбриный и Забытый. На усохших ветках различных лиственных. Обычный.

*Sachalinobia koltzei* (Heyden, 1887). Собран на г. Горелая Сопка. Горные хвойные леса: на пихте. Редкий.

*Saperda (Compsidia) balsamifera* (Motschulsky, 1860). Собран в устье руч. Победа. Связан с хвойными. Редкий.

*Saperda (Saperda) alberti* Plavilstshikov, 1916. Собран в устье руч. Победа. Видимо, связан с хвойными. Редкий.

*Saperda (Saperda) interrupta* Gebler, 1825. Собран в устье ручьев Победа и Забытый. Связан с хвойными. Не редкий.

*Stictoleptura (Aredolpona) dichroa* (Blanchard, 1871). Собран на г. Горелая Сопка. В толстых гнилых стволах, преимущественно хвойных деревьев. Не редкий.

*Stictoleptura (Stictoleptura) variicornis* (Dalman, 1817). Собран на г. Горелая Сопка. В толстых гнилых стволах, преимущественно хвойных деревьев. Редкий.

*Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758). Собран на г. Горелая Сопка. Связан с хвойными. Не редкий.

*Strangalomorpha tenuis* Solsky, 1873. Собран в устье руч. Забытый. Имаго на цветах. Редкий.

*Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Победа. Связан с хвойными; технический вредитель. Не редкий.

*Xylotrechus adspersus* (Gebler, 1830). Собран в устье ручьев Победа и Забытый. Чаще на чозении; жуки обычно бегают по упавшим стволам. Обычный.

*Xylotrechus rusticus* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Изюбриный. На мертвых и усыхающих стволах ольхи, ивы и других лиственных. Редкий.

#### Семейство Ринхитиды, или веткорезы – Rhynchitidae

*Byctiscus populi* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Победа. Преимущественно на осине. Редкий.

*Byctiscus princeps* (Solsky, 1872). Собран в верховьях р. Пасечная, г. Горелая Сопка, устье ручьев Изюбриный, Забытый и Победа. На ильме и липе. Обычный.

*Byctiscus puberulus* (Motschulsky, 1860). Собран на горах Снежная, Облачная и Горелая Сопка, ручьях Лукьянов Лог, Изюбриный, Забытый и Победа. На клене и других деревьях. Обычный.

*Byctiscus rugosus* (Gebler, 1830). Собран на горах Снежная и Горелая Сопка, ручьях Забытый и Победа. На тополе, яблоне и других. Обычный.

*Deporaus (Roelofsdeporaus) affectatus* Faust, 1887. Собран на горах Снежная и Горелая Сопка. На дубе, березе, рябине. Обычный.

*Deporaus (Roelofsdeporaus) unicolor* (Roelofs, 1874). Собран на г. Снежная. На дубе. Не редкий.

*Paradeporaus depressus* (Faust, 1882). Собран в устье руч. Забытый. Развивается в трубках рода *Byctiscus* (Rhynchitidae). Редкий.

*Parinvolvulus zherichini* (Legalov, 2004). Собран в устье руч. Победа. Сворачивает трубки из листьев барбариса. Редкий.

*Teretiorhynchites caeruleus ussuriensis* (Voss, 1930). Собран в устье руч. Победа. На различных деревьях семейства розоцветных. Редкий.

#### Семейство Аттелабиды, или трубкаверты – Attelabidae

*Apoderus (Apoderus) coryli* (Linnaeus, 1758). Собран на горах Снежная и Горелая Сопка, ручьях Лукьянов Лог, Изюбриный, Забытый и Победа. На березе, ольхе, лещине и других. Обычный.

*Apoderus (Konoapoderus) jekelii* Roelofs, 1874. Собран в устье руч. Забытый. На дубе, ольхе, маньчжурском орехе, березе и ивах. Редкий.

*Attelabus (Attelabus) cyanellus* Voss, 1925. Собран на горах Снежная и Горелая Сопка, руч. Лукьянов Лог. На ольхе, душекии и березе. Обычный.

*Compsapoderus (Compsapoderus) erythropterus* (Gmelin, 1790). Собран в устье ручьев Изюбриный и Победа. На различных розоцветных, а также ильме, лещине, леспедеце. Не редкий.

*Cycnotrachelodes (Cycnotrachelodes) cyanopterus* (Motschulsky, 1860). Собран в устье руч. Изюбриный. На леспедеце. Редкий.

*Cyrtolabus christophi* (Faust, 1884). Собран на г. Снежная. На дубе. Редкий.

*Leptapoderus (Leptapoderidius) rubidus* (Motschulsky, 1860). Собран на г. Снежная, ручьях Лукьянов Лог, Изюбриный и Забытый. На ивах, черемухе, рододендроне и других. Обычный.

*Leptapoderus (Paraleptapoderus) carbonicolor* (Motschulsky, 1860). Собран на горах Снежная и Горелая Сопка, ручьях Лукьянов Лог, Изюбриный, Забытый и Победа. На крапиве, смородине, клопоне, какали и других. Обычный.

*Paracycnotrachelus longiceps* (Motschulsky, 1860). Собран на ручьях Лукьянов Лог и Изюбриный. На дубе, лещине. Не редкий.

*Phymatapoderus flavimanus* (Motschulsky, 1860). Собран на ручьях Лукьянов Лог и Забытый. Преимущественно на крапиве. Обычный.

#### Семейство Долгоносики, или слоники – Curculionidae

*Anoplus plantaris* (Naezen, 1836). Собран на г. Снежная. На березе. Редкий.

*Anthribus* sp. Собран в устье руч. Забытый. Очень редкий.

*Anthonomus (Anthonomus) rubi* (Herbst, 1795). Собран на г. Снежная. На шиповнике, малине, землянике. Обычный.

*Asphalmus japonicus* Sharp, 1896. Собран на руч. Лукьянов Лог. Редкий.

*Bysorpages dissimilis* (Faust, 1860). Собран на г. Горелая Сопка. Не редкий.

*Callirus gebleri* (Boheman, 1834). Собран на горах Снежная, Горелая Сопка и Облачная. На бадане. Обычный.

*Callirus haroldi* (Faust, 1882). Собран на г. Облачная. На хвойных. Редкий.  
*Callirus longulus* (Faust, 1882). Собран на г. Облачная. На хвойных. Редкий.  
*Callirus* sp. Собран в устье ручьев Забытый и Победа. Редкий.  
*Catapionus viridimetallicus* Motschulsky, 1860. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Победа. Полифаг. Многочисленный.  
*Ceutorhynchus nitidulus* Faust, 1887. Собран на руч. Лукьянов Лог. На кардамоне. Редкий.  
*Chlorophanus sibiricus* Gyllenhal, 1834. Собран на руч. Лукьянов Лог. На иве, ильме, спирее. Обычный.  
*Cleonis* sp. Собран на г. Снежная. Редкий.  
*Coeliadinus parcesquamosus* (Hustache, 1916). Собран на г. Горелая Сопка и в верховьях р. Пасечная. На орехе маньчжурском. Редкий.  
*Curculio dentipes* (Roelofs, 1874). Собран на г. Облачная. На дубе. Обычный.  
*Curculio fordii* Pelsue et Zhang, 2002. Собран на г. Горелая Сопка и в верховьях р. Пасечная. На лещине. Обычный.  
*Curculio* sp. Собран на г. Горелая Сопка, устье руч. Забытый. Редкий. Новый для науки вид.  
*Cyphicerinus tessellatus* (Motschulsky, 1860). Собран на г. Горелая Сопка. Полифаг. Обычный.  
*Dactylotus (Dactylotinus) orientalis* Korotyaev et Egorov, 1992. Собран на горах Снежная и Горелая Сопка, руч. Лукьянов Лог. В горных темнохвойных лесах. Обычный.  
*Donus rugulosus* (Petri, 1901). Собран на г. Горелая Сопка. Эндемик Приморского края. Редкий.  
*Dorytomus egorovi* Korotyaev, 1976. Собран в верховьях р. Пасечная. Редкий.  
*Dorytomus rufulus* (Bedel, 1888). Собран в верховьях р. Пасечная. На ивах. Редкий.  
*Dyslobus variegatum* (Motschulsky, 1849). Собран на г. Горелая Сопка и руч. Лукьянов Лог. В темнохвойных лесах. Не редкий.  
*Ellescus* sp. Собран на г. Снежная. Редкий.  
*Grypus mannerheimi* Faust, 1881. Собран на г. Горелая Сопка. На хвоце. Редкий.  
*Hylobius excavatus* (Laicharting, 1781). Собран на г. Облачная и в устье руч. Победа. На лиственнице. Не редкий.  
*Lepyrus nordenskioldi* Faust, 1885. Собран на горах Снежная и Облачная. На иве, березе и ольхе. Обычный.  
*Lepyrus quadrinotatus* Boheman, 1840. Собран на г. Облачная. На иве и ольхе. Редкий.  
*Lepyrus ventricosus* Faust, 1882. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Победа. Обычный.  
*Magdalis* sp. Собран в устье ручьев Изюбриный и Победа. Редкий.  
*Metialma signifera* Pascoe, 1875. Собран в устье руч. Изюбриный. На недотроге. Редкий.  
*Miarus ajugae* (Herbst, 1795). Собран на руч. Лукьянов Лог. На колокольчиках. Не редкий.  
*Notaris illibatus* Faust, 1883. Собран на руч. Лукьянов Лог. На осоково-хвоцевых лугах. Редкий.  
*Orchestes (Orchestes) mutabilis* Boheman, 1843. Собран в устье руч. Победа. На ильме. Редкий.  
*Phyllobius (Angarophyllobius) femoralis* Boheman, 1843. Собран на г. Снежная. Горные тундры. Редкий.  
*Phyllobius (Subphyllobius) viridiaeris* (Laicharting, 1781). Собран на г. Горелая Сопка. Горные тундры. Редкий.  
*Pissodes* sp. 1. Собран в устье руч. Победа. Редкий.  
*Pissodes* sp. 2. Собран в устье руч. Победа. Редкий.  
*Polydrusus (Polydrusus) fulvicornis* (Fabricius, 1792). Собран на горах Горелая Сопка и Снежная. Обычный.  
*Pseudocneorhinus obesus* Roelofs, 1873. Собран в верховьях р. Пасечная. Полифаг. Многочисленный.  
*Rhamphus (Rhamphus) pulicarius* (Herbst, 1793). Собран на г. Сестра. На иве, березе, боярышнике. Редкий.  
*Rhinoncus sibiricus* Faust, 1893. Собран на руч. Лукьянов Лог. Очень редкий.  
*Simpiezomias schoenherri* (Faust, 1882). Собран в устье руч. Изюбриный. Полифаг. Многочисленный.  
*Sitona amurensis* Faust, 1882. Собран в верховьях р. Пасечная. На бобовых. Обычный.  
*Sitona lepidus* Gyllenhal, 1834. Собран на г. Горелая Сопка. На клевере. Редкий.  
*Sitona ovipennis* Hochhut, 1851. Собран в верховьях р. Пасечная. На карагане, копеечнике и других. Не редкий.  
*Trichalophus albonotatus* (Motschulsky, 1860). Собран в устье руч. Изюбриный. Обычный.  
*Trichalophus rubripes* Reitter, 1913. Собран на руч. Лукьянов Лог. Полифаг. Обычный.  
*Tychius (Tychius) picirostris* (Fabricius, 1787). Собран в верховьях р. Пасечная. На клевере. Обычный.

#### Семейство Короеды – Scolytidae

*Alniphagus costatus* (Blandford, 1894). Собран на руч. Лукьянов Лог. На ольхе. Редкий.  
*Cryphalus piceus* Eggers, 1926. Собран в верховьях р. Пасечная. Под корой сучьев сухостойной ели. Обычный.  
*Cryphalus scopiger* Berger, 1916. Собран в верховьях р. Пасечная. Под корой ореха маньчжурского. Не редкий.  
*Crypturgus hispidulus* Thomson, 1870. Собран в верховьях р. Пасечная. На хвойных породах в ходах короедов разных видов. Обычный.  
*Crypturgus pusillus* (Gyllenhal, 1813). Собран в верховьях р. Пасечная. На хвойных породах в ходах короедов разных видов. Обычный.

*Dryocoetes orientalis* Kurenzov, 1941. Собран в верховьях р. Пасечная. На корейском кедре и кедровом стланике. Не редкий.  
*Hylurgops longipilus* (Reitter, 1894). Собран на руч. Лукьянов Лог. На хвойных, чаще на корейском кедре. Не редкий.  
*Ips typographus* (Linnaeus, 1758). Собран в верховьях р. Пасечная. Чаще на ели. Многочисленный.  
*Orthotomicus golovjankoi* Pjatnitzky, 1930. Собран в верховьях р. Пасечная. На хвойных, в массе на корейском кедре. Многочисленный.  
*Pityogenes chalcographus* (Linnaeus, 1761). Собран в верховьях р. Пасечная. На хвойных. Обычный.  
*Polygraphus proximus* Blandford, 1894. Собран в верховьях р. Пасечная. На пихте белокорой. Не редкий.  
*Polygraphus* sp. Собран в верховьях р. Пасечная. На пихте и корейском кедре. Не редкий.  
*Scolytoplatypus tycon* Blandford, 1893. Собран в верховьях р. Пасечная. Полифаг лиственных пород. Обычный.  
*Scolytus jacobsoni* (Spessivtsev, 1919). Собран в верховьях р. Пасечная. На ильме. Редкий.  
*Trypodendron niponicum* Blandford, 1894. Собран в верховьях р. Пасечная. Полифаг лиственных пород. Редкий.

#### ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ – NEUROPTERA

##### Семейство Аскалафы – Ascalaphidae

*Libelloides sibiricus* (Eversmann, 1850). Собран у пос. Нижний. На сухих полянах, главным образом в долинах рек. Не редкий.

#### ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA

##### Сем. Ксиелиды – Xyelidae

*Xyela* (*Xyela*) sp. Собран на г. Снежная. На кедровом стланике. Вероятно, новый для науки вид.

##### Семейство Паутинные пилильщики, или пилильщики-ткачи – Pamphiliidae

*Acantholyda aglaia aglaia* Zhelochovtsev, 1968. Собран на руч. Лукьянов Лог. На елях. Обычный.  
*Cephalcia abietis* (Linnaeus, 1758). Собран на руч. Лукьянов Лог. На елях. Не редкий.  
*Cephalcia arvensis* Panzer, 1805. Собран на руч. Лукьянов Лог. На елях. Редкий.  
*Cephalcia lariciphila lariciphila* Wachtl, 1898. Собран на руч. Лукьянов Лог. На лиственнице. Обычный.  
*Cephalcia pallidula* (Gussakovskij, 1935). Собран на руч. Лукьянов Лог, г. Горелая Сопка. На елях. Обычный.  
*Cephalcia variegata* (Takeuchi, 1930). Собран на руч. Лукьянов Лог. На кедровом стланике. Редкий.  
*Cephalcia* sp. Собран на руч. Лукьянов Лог. Редкий.  
*Neurotoma atrata* Takeuchi, 1930. Собран на руч. Лукьянов Лог. На дубе. Редкий.  
*Neurotoma sibirica* Gussakovskij, 1935. Собран на руч. Лукьянов Лог. На рябине. Обычный.  
*Pamphilius alnivorus* Shinohara, 2005. Собран на руч. Лукьянов Лог. На ольхе волосистой. Не редкий.  
*Pamphilius hortorum* (Klug, 1808). Собран на руч. Лукьянов Лог. На малине. Обычный.  
*Pamphilius itoi* Shinohara, 1985. Собран на руч. Лукьянов Лог. На ольхе волосистой. Не редкий.  
*Pamphilius varius* (Serville, 1823). Собран на руч. Лукьянов Лог. На березе. Обычный.

##### Семейство Аргиды – Argidae

*Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939. Собран в устье руч. Победа. На ильме. Обычный.  
*Arge captiva* (F. Smith, 1874). Собран в устье руч. Забытый. На ильме. Редкий.  
*Arge ciliaris* (Linnaeus, 1767). Собран на ручьях Победа и Изюбриный. На лабазнике. Обычный.  
*Arge dimidiata* (Fallén, 1808). Собран на ручьях Забытый и Победа. На березе. Обычный.  
*Arge gracilicornis* (Klug, 1814). Собран в устье руч. Изюбриный. На малине. Редкий.  
*Arge mali* (Takahashi, 1906). Собран на руч. Лукьянов Лог. На яблоне. Редкий.  
*Arge nigripes* (Retzius, 1783). Собран на руч. Победа. На шиповнике. Редкий.  
*Arge nigrovaginata* Malaise, 1931. Собран на руч. Лукьянов Лог. Редкий.  
*Arge pagana pagana* (Panzer, 1797). Собран на руч. Победа. На шиповнике. Редкий.  
*Arge potanini* Jakovlev, 1891. Собран на руч. Лукьянов Лог. Обычный.  
*Arge solowiyofka* (Matsumura, 1911). Собран в устье руч. Забытый и г. Снежная. На березе. Не редкий.  
*Arge* sp. 1. Собран на руч. Лукьянов Лог. Близок к *A. ustulata*. Обычный.  
*Arge* sp. 2. Собран на руч. Лукьянов Лог. Близок к *A. ustulata*. Не редкий.  
*Arge ustulata* (Linnaeus, 1758). Собран на руч. Лукьянов Лог. На ивах, березах. Обычный.  
*Spinarge metallica* (Klug, 1834). Собран на руч. Изюбриный. На березе. Редкий.

##### Семейство Папоротниковые стеблевые пилильщики – Blasticotomidae

*Blasticotoma filiceti pacifica* Malaise, 1931. Собран на руч. Лукьянов Лог, г. Горелая Сопка. Личинки в стеблях и главных жилках листьев папоротника-орляка. Не редкий.

Семейство Булавоусые пилильщики, или цимбициды – Cimbicidae

*Abia mutica* Thomson, 1871. Собран на ручьях Забытый и Изюбриный, г. Снежная. На жимолости. Обычный.

*Agenocimbex eous* Semenov, 1935. Собран в устье руч. Забытый. Редкий.

*Cimbex connatus japonicus* W.F. Kirby, 1882. Собран в устье руч. Забытый. На ивах, тополях, осине. Не редкий.

*Cimbex femoratus* (Linnaeus, 1758). Собран на руч. Изюбриный. На березе. Не редкий.

*Cimbex luteus* (Linnaeus, 1758). Собран в устье руч. Победа. На ивах и тополях. Редкий.

*Leptocimbex allantiformis* (Mocsáry, 1909). Собран на руч. Лукьянов Лог. Летают вдоль берегов горных ручьев. Обычный.

*Orientabia japonica* (Cameron, 1887). Собран на руч. Лукьянов Лог. На жимолости. Редкий.

*Praia taczanowskii* Wankowicz, 1880. Собран в устье руч. Забытый. На березе. Редкий.

*Pseudoclavellaria amerinae* (Linnaeus, 1758). Собран на ручьях Победа, Изюбриный и Забытый, г. Снежная. На ивах и тополях. Обычный.

*Trichiosoma latreillii* Leach, 1817. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Победа. На ивах. Обычный.

*Trichiosoma opacum* Konow, 1906. Собран на г. Снежная. На ивах. Редкий.

*Trichiosoma sericeum* Konow, 1903. Собран на ручьях Победа, Изюбриный и Забытый. На ивах, тополе, березе. Обычный.

*Trichiosoma villosum* (Motschulsky, 1860). Собран на г. Снежная, ручьях Забытый и Изюбриный. На осине. Обычный.

*Trichiosoma vitellina* (Linnaeus, 1760). Собран на руч. Забытый. На березе, ольхе, ивах. Не редок.

Семейство Сосновые пилильщики – Diprionidae

*Gilpinia abieticola* (Dalla Torre, 1894). Собран на руч. Лукьянов Лог. На пихте. Не редкий.

*Gilpinia hercyniae* (Hartig, 1837). Собран в устье руч. Изюбриный. На пихте; имаго на цветках одуванчика. Обычный.

*Gilpinia polytoma* (Hartig, 1834). Собран на руч. Лукьянов Лог. На пихте. Редкий.

*Microdiprion pallipes* (Fallén, 1808). Собран на руч. Лукьянов Лог. На соснах и кедре. Редкий.

Семейство Настоящие пилильщики – Tenthredinidae

*Ametastegia (Ametastegia) glabrata* (Fallén, 1808). Собран на ручьях Победа и Забытый. На спорыше, мари, щавельнике. Обычный.

*Ametastegia (Protemphytus) carpini* (Hartig, 1837). Собран на руч. Изюбриный, г. Снежная. На герани. Обычный.

*Athalia rosae ruficornis* Jakovlev, 1888. Собран на руч. Изюбриный. На крестоцветных. Обычный.

*Athalia scutellariae flammula* Zhelochovtsev, 1927. Собран на руч. Победа. На шлемнике. Редкий.

*Birka (Lineobirka) koreana* (Takeuchi, 1941). Собран в устье руч. Победа. Редкий.

*Craesus japonicus* Takeuchi, 1921. Собран на руч. Забытый. На древесных породах колониями. Редкий.

*Dineura testaceipes* (Klug, 1816). Собран на г. Снежная. На рябине. Обычный.

*Dineura virididorsata* (Retzius, 1783). Собран на ручьях Забытый и Изюбриный. На березе. Редкий.

*Macrophya (Macrophya) annulata* (Geoffroy, 1785). Собран на ручьях Забытый, Победа и Изюбриный. На малине, шиповнике и других. Обычный.

*Macrophya (Macrophya) infumata* Rohwer, 1925. Собран на ручьях Забытый, Победа и Изюбриный. На бузине. Обычный.

*Megadineura grandis* (André, 1882). Собран в устье руч. Забытый. Редкий.

*Monostegia abdominalis* (Fabricius, 1798). Собран на устье руч. Победа. На вербейнике. Не редкий.

*Nematus (Kontuniemiana) ribesii* (Scopoli, 1763). Собран в устье руч. Изюбриный. На смородине. Не редкий.

*Nematus (Nematus) caeruleocarpus* Hartig, 1837. Собран на ручьях Забытый и Изюбриный, г. Снежная. На ивах, тополях, пионах и других. Обычный.

*Nematus (Nematus) princeps* Zaddach, 1876. Собран на г. Снежная. На ивах. Обычный.

*Pachyprotasis rapae* (Linnaeus, 1767). Собран на г. Снежная, ручьях Победа и Забытый. На золотарнике, норичнике, ясене и других. Обычный.

*Rhogogaster (Rhogogaster) viridis* (Linnaeus, 1758). Собран на ручьях Победа, Забытый и Изюбриный. На березе, ивах, тополях, розоцветных, ольхе и других. Обычный.

*Selandria serva* (Fabricius, 1793). Собран на ручьях Забытый и Изюбриный. На злаках, осоковых. Не редкий.

*Siobla ruficornis* (Gimmerthal, 1834). Собран на г. Снежная, ручьях Забытый, Изюбриный и Лукьянов Лог. На кипрее. Массовый.

*Taxonus zhelochovtsevi Viitasaari et Zinovjev, 1991*. Собран на руч. Изюбриный. Редкий.  
*Tenthredo (Endotethryx) adusta Motschulsky, 1866*. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Забытый и Изюбриный. Имаго на зонтичных. Обычный.  
*Tenthredo (Eurogaster) mesomela Linnaeus, 1758*. Собран на ручьях Лукьянов Лог, Забытый, Победа и Изюбриный. На зонтичных, лютиках и других. Обычный.  
*Tenthredo (Eurogaster) obsoleta Klug, 1817*. Собран в устье руч. Победа. На подорожнике. Редкий.  
*Tenthredo (Temuledo) finschi finschi W.F. Kirby, 1882*. Собран на ручьях Победа и Изюбриный. Имаго на зонтичных и спирейных. Обычный.  
*Tenthredo (Tenthredella) colon Klug, 1817*. Собран на г. Снежная, ручьях Лукьянов Лог, Забытый, Победа и Изюбриный. На папоротниках, ивах и других. Многочисленный.  
*Tenthredo (Tenthredella) fagi Panzer, 1798*. Собран на г. Снежная. На рябине и лещине. Редкий.  
*Tenthredo (Tenthredella) moniliata Klug, 1817*. Собран в устье руч. Забытый и Изюбриный. На подорожнике, клевере. Не редкий.  
*Tenthredo (Tenthredo) brevicornis (Konow, 1886)*. Собран на руч. Победа. Имаго на зонтичных. Редкий.  
*Tenthredopsis auriculata (Thomson, 1870)*. Собран на ручьях Победа и Забытый. На вейнике. Обычный.  
*Tenthredopsis nassata (Linnaeus, 1767)*. Собран на г. Снежная, ручьях Лукьянов Лог, Победа и Забытый. На злаках и осоковых. Многочисленный.

#### Семейство Рогохвосты – Siricidae

*Xoanon matsumurae (Rohwer, 1910)*. Собран в устье руч. Победа. На пихте и кедре корейском. Не редкий.

#### Семейство Остробрюхие рогохвосты, или ксифидрииды – Xiphydriidae

*Xiphydria camelus (Linnaeus, 1758)*. Собран в устье ручьев Победа и Изюбриный. На ольхе и березе. Не редкий.

*Xiphydria kastsheevi Ermolenko, 1979*. Описан из верховий р. Уссури. Очень редкий.

*Xiphydria palaeanarctica Semenov, 1921*. Собран в устье руч. Победа. На ольхе. Редкий.

#### Семейство Хлебные, или злаковые пилильщики – Cephidae

*Cephus cinctus Norton, 1872*. Собран на г. Горелая Сопка. На злаках. Не редкий.

*Cephus hyalinatus Konow, 1897*. Собран в устье руч. Изюбриный. На злаках; имаго на цветах одуванчика. Обычный.

*Hartigia sibiricola (Jakovlev, 1892)*. Собран на г. Горелая Сопка. В побегах розоцветных. Редкий.

#### Семейство Сапиги – Sapygidae

*Sapyga similis (Fabricius, 1793)*. Собран на г. Горелая Сопка. На цветах. Редкий.

#### Семейство Дорожные осы – Pompilidae

*Arachnospila (Arachnospila) fumipennis (Zetterstedt, 1838)*. Собран на г. Горелая Сопка. Каменисто-песчаные берега рек и почвы. Редкий.

*Dipogon (Deuteragenia) vechti Day, 1979*. Собран на руч. Лукьянов Лог. Гнездится в древесине. Обычный.

*Epsyron arrogans (Smith, 1873)*. Собран на г. Горелая Сопка. Лесные дороги, просеки, опушки. Не редкий.

*Priocnemis (Umbripennis) pseudojaponica Lelej, 1988*. Собран на г. Горелая Сопка. Эндемик Приморского края. Редкий.

#### Семейство Муравьи – Formicidae

*Camponotus saxatilis Ruzsky, 1895*. Собран на г. Облачная. Гнезда в древесных остатках под покровом почвы. Обычный.

#### Семейство Пчелы-галикты – Halictidae

*Evylaeus (Smeathhalictus) briseis eomontanus (Ember, 2006)*. Описан с г. Горелая Сопка. Редкий.

#### Семейство Мегахилиды – Megachilidae

*Hoplitis (Monumetha) tuberculata (Nylander, 1848)*. Собран на г. Горелая Сопка. На цветах. Обычный.

#### Семейство Апиды – Apidae

***Bombus (Bombus) patagiatus* Nylander, 1848.** Собран на г. Горелая Сопка. На цветах. Обычный.

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, ИЛИ БАБОЧКИ – LEPIDOPTERA

Семейство Данаиды – Danaidae

***Parantica sita* (Kollar, 1844).** Наблюдался на руч. Лукьянов Лог, 11.IX 2009. Бабочка летала на лесной поляне. Очень редкий.

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ - ARACHNIDA

ОТРЯД ПАУКИ – ARANEI

Семейство Воронкопряды – Agelenidae

***Alloclubionoides* sp.** Собран на г. Горелая Сопка. Вероятно, новый для науки вид.

Семейство Крестовики – Araneidae

***Hypsosinga sanguinea* (C.L. Koch, 1844).** Собран на г. Горелая Сопка. Мелкий кругопряд. Сети устраивает среди травостоя, невысоко над землей. Обычный.

Семейство Мешкопряды – Clubionidae

***Clubiona (Clubiona) propinqua* L. Koch, 1879.** Собран на г. Горелая Сопка. Паук-засадник. Обычный.

***Clubiona (Clubiona) sapaikensis* Paik, 1990.** Собран на г. Горелая Сопка. Паук-засадник. Не редкий.

Семейство Гнафозиды – Gnaphosidae

***Callilepis schuszeri* (Herman, 1879).** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий герпетобионт. Обычный.

***Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834).** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий герпетобионт. Редкий.

***Gnaphosa sticta* Kulczyński, 1908.** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий герпетобионт. Редкий.

***Kishidaia albimaculata* (Saito, 1934).** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий хорто-тамнобионт. Редкий.

***Zelotes potanini* Schenkel, 1963.** Собран в верховьях р. Пасечная. Бродячий герпетобионт. Не редкий.

Семейство Hahniidae

***Hahnia corticicola* Bösenberg et Strand, 1906.** Собран в верховьях р. Пасечная. Мелкий тенетник-герпетобионт. Обычный.

Семейство Пигмеи – Linyphiidae

***Porrhomma longjiangense* Zhu et Wang, 1983.** Собран в верховьях р. Пасечная. Герпетобионт. Редкий.

***Styloctetor lehtineni* Marusik et Tanasevitch, 1999.** Собран в верховьях р. Пасечная. Герпетобионт. Обычный.

Семейство Волки – Lycosidae

***Acantholycosa lignaria* (Clerck, 1758).** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий эпигейный паук. Не редкий.

***Alopecosa hokkaidensis* Tanaka, 1985.** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий эпигейный паук. Не редкий.

***Pardosa* sp.** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий эпигейный паук. Обычный. Новый для науки вид.

***Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861).** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий эпигейный паук. Не редкий.

Семейство Рыси – Oxyopidae

***Oxyopes licenti* Schenkel, 1953.** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий паук: населяет травостой, активный дневной охотник. Не редкий.

Семейство Бокоходы – Philodromidae

***Thanatus* aff. *miniaceus* Simon, 1880.** Собран на г. Горелая Сопка. Бродячий паук. Обычный.

Семейство Скакунчики – Salticidae

*Chalcoscirtus tanya* Logunov et Marusik, 1999. Собран на г. Горелая Сопка. Эндемик Приморского края. Эпигейный петрофил. Обычный.

*Dendryphantes czekanowskii* (Grube, 1861). Собран на г. Горелая Сопка. Хорто-тамнобионт. Редкий.

*Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802). Собран на г. Горелая Сопка. Герпетобионт. Обычный.

*Evarcha proszynskii* Marusik et Logunov, 1998. Собран на г. Горелая Сопка. Хорто-тамнобионт. Обычный.

*Phlegra fasciata* (Hahn, 1826). Собран на г. Горелая Сопка. Герпетобионт. Не редкий.

*Pseudoeuophrys iwatensis* (Bohdanowicz et Prószyński, 1987). Собран на г. Горелая Сопка. Герпетобионт. Редкий.

#### Семейство Theridiidae

*Steatoda phalerata* (Panzer, 1801). Собран на г. Горелая Сопка. Герпетобионт. Редкий.

#### Семейство Пауки-крабы – Thomisidae

*Lysiteles maius* Ono, 1979. Собран на г. Горелая Сопка. Хортобионт, засадник. Обычный.

*Xysticus ephippiatus* Simon, 1880. Собран на г. Горелая Сопка. Хорто-герпетобионт. Не редкий.

*Xysticus lepnevae* Utotchkin, 1968. Собран на г. Горелая Сопка. Хорто-герпетобионт. Обычный.

*Xysticus* aff. *sibiricus* Kulczyński, 1908. Собран на г. Горелая Сопка. Обычный. Видимо, новый для науки вид.