

БИОТА И ПОЧВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»



А.В. Богачева, Е.М. Булах, Г.Н. Бутовец,
Н.В. Бухарова, И.А. Галанина, Г.А. Гладкова,
Л.Н. Егорова, Н.Д. Крониковская, Ю.И. Манько,
И.В. Маслова, Л.А. Медведева, М.Е. Сергеев,
Л.А. Сибирина, С.Ю. Стороженко, Л.С. Яковченко

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНОЙ БИОТЫ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
FAR EASTERN BRANCH
FEDERAL SCIENTIFIC CENTER OF THE EAST ASIA
TERRESTRIAL BIODIVERSITY

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
FAR EASTERN BRANCH

FEDERAL SCIENTIFIC CENTER OF THE EAST ASIA
TERRESTRIAL BIODIVERSITY

A.V. Bogacheva, E.M. Bulakh, G.N. Butovets, N.V. Bukharova,
I.A. Galanina, G.A. Gladkova, L.N. Egorova, N.D. Kronikovskaya,
Yu.I. Man'ko, I.V. Maslova, L.A. Medvedeva, M.E. Sergeev, L.A. Sibirina,
S.Yu. Storozhenko, L.S. Yakovchenko

**BIOTA AND SOILS
OF THE “UDEGE LEGEND”
NATIONAL PARK**



Vladivostok
Dalnauka
2020

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНОЙ БИОТЫ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

А.В. Богачева, Е.М. Булах, Г.Н. Бутовец, Н.В. Бухарова, И.А. Галанина,
Г.А. Гладкова, Л.Н. Егорова, Н.Д. Крониковская, Ю.И. Манько,
И.В. Маслова, Л.А. Медведева, М.Е. Сергеев, Л.А. Сибирина,
С.Ю. Стороженко, Л.С. Яковченко

**БИОТА И ПОЧВЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»**



Владивосток
Дальнаука
2020

УДК 502.2
Б 63

Ответственный редактор
А.В. Богачева

Рецензенты:
В.Ю. Баркалов, В.А. Бакалин

Б 63 **Биота и почвы национального парка «Удэгейская легенда»** / А.В. Богачева, Е.М. Булах, Г.Н. Бутовец, Н.В. Бухарова, И.А. Галанина, Г.А. Гладкова, Л.Н. Егорова, Н.Д. Крониковская, Ю.И. Манько, И.В. Маслова, Л.А. Медведева, М.Е. Сергеев, Л.А. Сибирина, С.Ю. Стороженко, Л.С. Яковченко. – Владивосток : Дальнаука, 2020. – 360 с. : ил.


ISBN 978-5-8044-1694-3

В коллективной монографии изложены начальные результаты исследования почвы, растительности, грибов, насекомых и пресмыкающихся национального парка «Удэгейская легенда», основанного в 2007 г. Основу работы составляет аннотированный список, сопровождающийся иллюстрациями и включающий данные о 662 видах сосудистых растений, 10 видах цианобактерий и 153 – водорослей, 406 – грибов, 77 – лишайников, 97 – насекомых, 5 – земноводных и 5 видах пресмыкающихся. Монография содержит историческую справку о первых исследователях долины р. Большая Уссурка и ее притоков, физико-географическую характеристику охраняемой территории, сведения о структуре и разнообразии ее почв и растительности. Настоящая работа продолжает цикл публикаций о заповедных территориях Дальневосточного региона.

Книга предназначена для микологов, ботаников, энтомологов, альгологов, герпетологов, почвоведов, биогеографов, специалистов в области охраны природы и окружающей среды, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Biota and Soils of the National park “Udege Legend” / A.V. Bogacheva, E.M. Bulakh, G.N. Butovets, N.V. Bukharova, I.A. Galanina, G.A. Gladkova, L.N. Egorova, N.D. Kronikovskaya, Yu.I. Man'ko, I.V. Maslova, L.A. Medvedeva, M.E. Sergeev, L.A. Sibirina, S. Yu. Storozhenko, L.S. Yakovchenko. – Vladivostok : Dalnauka, 2020. – 360 p. : il.

The book is intended for mycologists, botanists, biogeographers, specialists in the field of environmental protection, teachers and students of higher educational institutions.



Утверждено к печати Ученым советом ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 20-14-00008 Д, не подлежит продаже.

ISBN 978-5-8044-1694-3

© Коллектив авторов, 2020
© Издательство Дальнаука, 2020

Оглавление

Введение	7
История изучения лесов бассейна Большой Уссурки и создания национального парка «Удэгейская легенда» (Ю.И. Манько, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Н.Д. Крониковская, ФГБУ «Национальный парк “Удэгейская легенда”»)	8
Физико-географический очерк (Н.Д. Крониковская, ФГБУ «Национальный парк “Удэгейская легенда”»).....	12
Геология	13
Тектоника	15
Полезные ископаемые	15
Рельеф	16
Гидрография	18
Климат	19
Ландшафты (Н.Д. Крониковская, ФГБУ «Национальный парк “Удэгейская легенда”»).....	37
Почвы (Г.Н. Бутовец, Г.А. Гладкова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)	42
Почвы горных хвойно-широколиственных лесов	43
Курумы	57
Почвы дубовых лесов	58
Почвы долинных лесов	59
Аннотированный список сосудистых растений (Г.А. Гладкова, Л.А. Сибирина, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)	68
Особенности флоры национального парка	132
Редкие и охраняемые виды	136
Леса (Л.А. Сибирина, Г.А. Гладкова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)	137
Лесоводственные свойства основных древесных пород	137
Лесные формации	144
Грибы (А.В. Богачева, Е.М. Булах, Н.В. Бухарова, Л.Н. Егорова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).....	169
Аннотированный список грибов	179
Лишайники (И.А. Галанина, Л.С. Яковченко, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).....	210
Цианобактерии и водоросли (Л.А. Медведева, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).....	219
Герпетофауна (И.В. Маслова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)	230
Жуки-листоеды (М.Е. Сергеев, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)	246
Прямкрылые насекомые (С.Ю. Стороженко, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).....	256
Список литературы	268
Фотоприложение	287
Указатель латинских названий.....	339

Contents

Introduction	7
The history of the study of forests, the Bol'shaya Ussurka river and the establishment of National Park "Udege legend" (<i>Y.I. Man'ko, FSC Biodiversity FEB RAS, N.D. Kronikovskaya, National Park "Udege Legend"</i>)	8
Physico-geographical essay (<i>N.D. Kronikovskaya, National Park "Udege Legend"</i>)	12
Geology	13
Tectonics	15
Minerals	15
Relief	16
Hydrography	18
Climate	19
Landscapes (<i>N.D. Kronikovskaya, National Park "Udege Legend"</i>)	37
Soils (<i>G.N. Butovets, G.A. Gladkova, FSC of Biodiversity FEB RAS</i>)	42
The soils of mountain mixed coniferous-deciduous forests	43
Kurums	57
Soils of oak forests	58
Valley soils	59
Annotated list of vascular plants (<i>G.A. Gladkova, L.A. Sibirina, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	68
Features of the flora of the National Park "Udege Legend"	132
Rare and protected species	136
Forests (<i>L.A. Sibirina, G.A. Gladkova, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	137
Forestry properties of the main tree species	137
Forest formations	144
Fungi (<i>A.V. Bogacheva, E.M. Bulakh, N.V. Bukharova, L.N. Egorova, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	169
Annotated list of fungi	179
Lichens (<i>I.A. Galanina, L.S. Yakovchenko, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	210
Cyanobacteria and algae (<i>L.A. Medvedeva, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	219
The Herpetofauna (<i>I.V. Maslova, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	230
The leaf beetles (<i>M.E. Sergeev, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	246
The Orthoptera (<i>S.Yu. Storozhenko, FSC Biodiversity FEB RAS</i>)	256
List of references	268
Photo application	287
Index latina nomina	339

ВВЕДЕНИЕ

Горная система Сихотэ-Алинь расположена на крайнем юго-востоке материковой части Российской Федерации, в Хабаровском и Приморском краях. Современный Сихотэ-Алинь представляет собой сложную систему горных хребтов, речных долин, межгорных депрессий и горных плато. Основным природным комплексом Сихотэ-Алиня – леса, которые по разнообразию лесообразующих пород, богатству и своеобразию флоры значительно превосходят все другие в России. Гарантом сохранения и условием богатого видового разнообразия является наличие здесь четырех природных заповедников, двух национальных парков и лесного стационара.

Чернопихтово-кедрово-широколиственные леса южных низкогорных отрогов (гора Пржевальского) находятся под охраной Уссурийского государственного природного заповедника им. акад. В.Л. Комарова и Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). В южной части, охватывая хребет Заповедный, располагается Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капанова, сохраняющий уникальный комплекс лиановых кедрово-широколиственных лесов. В водораздельной части хребта Сихотэ-Алинь, в долине р. Бикин, верхней части бассейнов рек Уссури, Милоградовка и Киевка, где сохранился самый крупный на земном шаре массив нетронутых кедрово-широколиственных лесов, осуществляет свою природоохранную и эколого-просветительскую деятельность национальный парк «Зов тигра». Для предотвращения уничтожения биологического и ландшафтного разнообразия горных лесных экосистем центральной части Сихотэ-Алиня, включая уникальные горные кедровники, был организован Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Бассейн р. Соколовка в зоне горных лесов входит в охранную зону Верхнеуссурийского биогеоценологического стационара Биологического почвенного института ДВО РАН, ныне Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН); ельники, лиственничные, хвойно-широколиственные и мелколиственные леса северо-восточных склонов Сихотэ-Алинского хребта – в зону государственного природного заповедника «Ботчинский». Задачу сохранения долинного природного комплекса рек западного макросклона, куда входят кедрово-широколиственные, долинные широколиственные леса и кедровники, выполняет национальный парк «Удэгейская легенда». Последней из вышеперечисленных охранных территорий посвящена данная монография. В ней представлена подробная характеристика физико-географических условий территории парка, его ландшафтов и почв, описаны растительность и биологическое разнообразие животных, растений и грибов парка.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСОВ БАССЕЙНА БОЛЬШОЙ УССУРКИ И СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»

Новые земли около берегов Восточного океана, по Амуру и его притокам, вошедшие в административный состав Восточной Сибири в 1858 г., требовали детального топографического описания. В 1859 г. Министерство государственных имуществ с высочайшего разрешения командировало в Восточную Сибирь лесоустроительную партию под руководством штаб-капитана корпуса лесничих Алексея Федоровича Будищева. В состав ее вошли запасной топограф Марцеллий Мартынович Любенский и топографы Артур Григорьевич Петрович и Антон Иванович Корзун. Ими были осмотрены леса в нижней части рек Пор (Хор) и Бикин, по р. Усури до устья р. Има (Иман, ныне Большая Уссурка) (Колесников, 1961). Работа партии началась в 1860 г. Выполнялась она в невероятно трудных условиях: при отсутствии дорог, связи, продовольственных баз, в сложной погодной обстановке, что приводило к порче продуктов и, в свою очередь, вызывало существенное изменение намеченных маршрутов. В итоге самоотверженных усилий специальная лесоустроительная партия под руководством А.Ф. Будищева «искрестила Приамурский край по всей системе орошающих его рек и их водоразделов», как отмечено в предисловии к капитальному труду «Описание лесов южной части Приморской области», позже опубликованному по результатам работы партии (Будищев, 1867). За эту работу А.Ф. Будищев был награжден малой золотой, а А.Г. Петрович – серебряной медалью Русского географического общества.

А.И. Корзун обследовал правые притоки р. Усури, в результате чего были составлены отчеты: «Описание лесов по притокам уссурийской системы реки Бикина и по верховьям рек Пора и Има» и «Описание лесов и местностей по рекам Има и Ваку и по их притокам» (Леса Дальнего Востока..., 2016). В целом отмечалось, что бассейны этих рек заняты лесом и практически не заселены. По р. Иман (Большая Уссурка) и ее притокам находилось 25 китайских фанз и 45 ороchonских юрт. Леса пребывали в разном состоянии. Отмечалось наличие кедра «огромной величины», так что можно из него выпилить доски до двух аршин шириной.

А.Ф. Будищев обследовал р. Усури, пройдя по ее долине несколько раз. В отчете «Описание лесов по главному руслу р. Усури и ее источникам и по притоку р. Дауби» имеются сведения по Иманскому району (Леса Дальнего Востока..., 2016). В перечисленных документах приводятся общая характеристика лесов, их состав, состояние и размещение, а также описание древесных и кустарниковых пород. По мнению И.К. Шишкина (1930), в этих отчетах немало интересных материалов как по общей характеристике растительного покрова различных частей района, так и по географическому распределению различных древесных и кустарниковых пород. В то же время он предупреждал, что некоторые ботанические описания в этих отчетах могут содержать неточности.

Общий очерк изучения флоры и растительности бассейна р. Большая Уссурка, включая часть территории современного национального парка «Удэгейская легенда», опубликовал И.К. Шишкин (1930). Он собрал полные сведения о работах, проведенных здесь до 1930 г., а также привел данные о 928 растениях. По мнению И.К. Шишкина, первым исследователем бассейна р. Иман должен быть назван Р.К. Маак, путешествующий здесь в 1859 г. с целью общего естественноисторического изучения бассейна р. Уссури (Маак, 2011, 2012). В этом же году, но несколько позже Р.К. Маака по Уссури путешествовал К.И. Максимович (1862). Ссылаясь на Б.А. Ивашкевича (1927), он приводит имена лесостроителей А.А. Милевского, А.Н. Иванова, С.Д. Корнеенко, Ф.И. Киселева и Т.Н. Салтыкова, сделавших описания лесов в бассейне р. Иман. Кроме того, И.К. Шишкин перечислил агрономических работников и сотрудников переселенческого управления, работы которых были связаны с Иманским районом. Он обратил внимание на то, что с 1927 г. темп исследовательских работ на территории Иманского района значительно возрос. Проведены почвенные и геоботанические исследования (И.К. Семенов, Е.И. Рябова, И.Н. Кремена). Г.И. Карев первым проник в высокогорную область водораздела рек Ваку и Уссури, поднявшись на вершину сопки Лаугондызы (Синья) и собрав ряд редких растений.

И.К. Шишкин проводил собственное изучение флоры и растительности нижней части бассейна Большой Уссурки. Составленный им список растений включает как виды, упомянутые в литературе, так и хранящиеся в сборах Гордеева, Карева и др.

В 1934 г. Дальневосточный филиал АН СССР снарядил зоологическую экспедицию в Средний Сихотэ-Алинь, в составе которой участвовал А.И. Куренцов, изучавший чешуекрылых и короедов. В обстоятельной работе А.И. Куренцов (1935) описал основные закономерности размещения растительности в бассейне р. Большая Уссурка. Им приведены схемы размещения растительных группировок в нижней и средней частях реки, отражающие изменения в формационном составе в зависимости от высотного положения.

В 1959–1960 гг. долинные леса были обследованы Н.Г. Васильевым (1963а, б). Им были совершены маршруты по крупным притокам – Арму и Вака, а также посещены отдельные крупные горные вершины. В итоге было заложено много профилей распределения растительности в долинах рек и на горных склонах, составлены характеристики основных лесных формаций и сделаны выводы об их динамике. Н.Г. Васильев обратил внимание на необходимость срочного образования заказника в средней части бассейна р. Арму, где преобладают «рекордные по производительности кедровые леса».

Заслуживают внимания работы П.В. Крестова (1992, 1993а, б), Л.А. Сибириной, Г.А. Гладковой, Г.Н. Бутовец и Н.Д. Крониковской (Сибирина и др., 2015), посвященные эколого-фитоценотической характеристике лесов широколиственно-хвойного пояса в бассейне р. Большая Уссурка и редким растительным сообществам в этом поясе. Исходя из полученных результатов авторы высказываются о необходимости сохранения одного из малонарушенных участков коренной растительности.

История создания национального парка «Удэгейская легенда» насчитывает без малого 17 лет. Работа по его созданию началась в 1990 г., когда по настоянию местных жителей эта территория была включена как проектируемая ООПТ федерального значения в Долговременную программу охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г. (Бакланов и др., 1993). Первоначальное название «Средне-Уссурский» в 1999 г. было заменено на настоящее в память об историческом прошлом Приморского края и для туристической привлекательности.

Данные о выборе и достоинствах территории, ее размерах, границах, цели и задачи национального парка изложены в эколого-экономическом обосновании (ЭЭО), созданном группой ученых Тихоокеанского института географии ДВО РАН в 1996 г. под редакцией проф. А.Б. Косолапова и к.г.н. А.Н. Качура. В эти же годы проводилась процедура согласования границ национального парка, при этом учитывались мнения и пожелания всех арендаторов на территории парка и сопредельных площадях, недропользователей (геологов) и лесозаготовителей, администраций района и края. ЭЭО было отредактировано в 2000 г. в соответствии с материалами согласований со специально уполномоченными на то органами в области охраны окружающей среды Приморского края. Затем оно прошло несколько этапов экспертизы на краевом и федеральном уровнях. С учетом результатов согласования с Рощинским лесхозом в 1999 г. был составлен акт технического обследования лесов по материалам лесоустройства 1995 г. с перечнем лесных кварталов и их площадей, предлагаемых к включению в территорию национального парка. Затем в управлении Росприроднадзора по Приморскому краю было составлено предварительное описание границ парка. Сумма площадей лесных кварталов и, следовательно, национального парка равна 103 744 га.

Одним из первых официальных документов, которым предусматривалось резервирование данной территории и выделение ее в особый природоохранный фонд, было решение сессии Приморского краевого Совета народных депутатов № 145 от 28.06.1991 г. «О системе охраняемых природных территорий Приморского края». Инициатива создания национального парка была поддержана на местном муниципальном уровне в постановлении администрации Красноармейского района № 424 от 25.12.1996 г. «Об организации Средне-Уссурского национального парка». Распоряжением Правительства РФ № 572-р от 23.04.1994 г. Средне-Уссурский национальный парк «вошел» в федеральную программу создаваемых заповедников и национальных парков в период 1994–2005 гг. Затем, сменив название на «Удэгейскую легенду», парк распоряжением Правительства РФ от 23.05.2001 г. № 725-р был включен в федеральную программу создаваемых на территории РФ заповедников и национальных парков в период 2001–2010 гг.

Большой вклад в подготовку и создание национальных парков в Приморье, в том числе и «Удэгейской легенды», внес Юрий Игоревич Берсенев, к.м.н., заслуженный эколог России. В своих выступлениях он подчеркивал, что территория парка играет большую роль в сохранении уникального долинного комплекса рек западного макросклона Сихотэ-Алиня и является одним из основных мест обита-

ния амурского тигра в зимний период. Необходимость охраны природных комплексов была причиной включения значительной части данной территории в 1935 г. в состав Сихотэ-Алинского заповедника. Впоследствии (1951 г.), с сокращением его площади, она перестала быть заповедной, но не потеряла своей значимости для сохранения биоразнообразия (Берсенев, 2006).

Реки Большая Уссурка и Арму – основные водные артерии национального парка – издавна пользовались большой популярностью у туристов, в основном любителей рыбалки и сплава по рекам. В настоящее время большое количество туристов с удовольствием приезжают с целью отдыха на берегу реки, пеших прогулок, поездок на лодках, семейного отдыха. На территории парка и прилегающей площади зарегистрировано 27 археологических памятников эпохи неолита. Среди них руинированные поселения, военизированные укрепления и стоянки, расположение их приурочено к долинам рек.

Вопрос организации национального парка «Удэгейская легенда» на территории, соседствующей с землями сел Дерсу и Островное, обсуждался гражданами и представителями коренного малочисленного народа удэге (25.08.1996 г. и 11.12.2006 г.). Результаты общественного обсуждения и согласования свидетельствуют о положительном отношении населения. По мнению известного историка В.А. Тураева, создание национального парка давало уникальную возможность сохранения и возрождения этнокультурной общности иманских удэгейцев, «разбросанных» в то время по многим селам Красноармейского района. Для этих целей в национальном парке была создана функциональная зона экстенсивного традиционного природопользования. 9 июня 2007 г. вышло распоряжение Правительства Российской Федерации от № 745-р «Об учреждении национального парка “Удэгейская легенда”», в котором лесные земли согласно перечню кварталов, указанному в приложении, переводились в категорию особо охраняемой территории. Федеральное государственное учреждение «Национальный парк “Удэгейская легенда”» было создано 23 января 2008 г. распоряжением Правительства РФ № 51-р. Директором его был назначен Федор Владимирович Крониковский, ранее общественный директор-организатор национального парка, занимавшийся разъяснительной работой среди населения, вопросами организации и проведения собраний, подготовкой различных материалов, журнальных и газетных публикаций, перепиской с органами власти различных уровней.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Национальный парк «Удэгейская легенда» расположен в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации на севере Приморского края в пределах центральной части Красноармейского муниципального района (рис. 1). Офис администрации находится в с. Рощино Красноармейского района, по адресу: ул. Ленинская, д. 50. Ближайшими населенными пунктами являются села Дальний Кут, Дерсу и Островное. С офисом парк связан грунтовой автомобильной дорогой, которая прерывается р. Большая Уссурка. Переправа летом осуществляется на пароме, здесь же находится подвесной пешеходный мост, зимой – по зимнику, проложенному по льду. Расстояние от Рощино до переправы 48 км, до ближайшей железнодорожной станции Дальнереченск – 114 км. С краевым центром Рощино связано автодорогой с асфальтовым покрытием Дальнереченск–Рощино–Восток (104 км) и далее федеральной трассой Хабаровск–Владивосток (421 км). Географически парк располагается на западном макросклоне Сихотэ-Алинского хребта в зоне горных южно-таежных хвойно-широколиственных, долинных кедрово-широколиственных лесов с преобладанием кедр корейского.



Рис. 1. Местоположение национального парка «Удэгейская легенда»

При составлении настоящей главы были использованы материалы эколого-экономического обоснования создания национального парка «Удэгейская легенда» (1996, 2000 гг.), в подготовке которого принимали участие научные сотрудники Дальневосточного отделения Российской академии наук (Тихоокеанского института географии и Биолого-почвенного института, ныне Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской академии наук). Разделы геологии и полезных ископаемых парка и прилегающей территории даны по информации В.А. Михайлова, к.м.н. Ю.И. Берсенева, А.Л. Зенина; рельефа – к.м.н. Ю.И. Берсенева; гидрографии – Л.М. Яковлевой; климата – Г.П. Скрыльника. Разделы дополнены информацией, накопленной и обработанной в национальном парке «Удэгейская легенда».

Геология

Территория парка выделена в пределах Восточной и Центральной структурно-формационных зон, покрыта геологической съемкой М 1 : 200 000 и М 1 : 50 000. Однако со времени проведения этих работ представления о строении вышеназванных зон испытали кардинальные изменения, с учетом чего и дается их краткая характеристика.

Стратиграфия. Восточная зона. Меловая система. Нижний отдел. Отложения нижнего отдела меловой системы играют ведущую роль в строении Восточной зоны, слагая ее большую часть. Это преимущественно ритмично переслаивающиеся серии осадочных морских отложений, так называемые флишоидные толщи, образованные в условиях геосинклинального прогиба, среди которых по особенностям состава и строения выделяется ряд свит. На описываемой территории обнажаются лишь самые нижние части разреза Восточной зоны, представленные журавлевской, ключевской и устьколумбинской свитами.

Журавлевская свита развита в виде полос северо-восточного простирания преимущественно в западной части зоны (и, соответственно, центральной части парка). Она сложена в основном алевролитами с отдельными горизонтами, пачками и слоями песчаников, иногда содержащими остатки берриас-валанжинских представителей двухстворчатых моллюсков – бухий. Мощность свиты достигает 1000 м.

Ключевская свита широко распространена во всех частях Восточной зоны. Литологически сходна с журавлевской, отличаясь несколько большей ролью алевролитов и набором органических остатков, представленных валанжинскими бухиями. Мощность ее достигает 2000 м.

Устьколумбинская свита приурочена к восточной части территории. Сложена она преимущественно песчаниками с пачками и горизонтами флишоидного переслаивания песчаников и алевролитов, горизонтами и слоями алевролитов и гравелитов. Суммарный разрез свиты достигает 1950 м.

Центральная зона. Юрская система. Средний-верхний отдел. Ведущую роль в Центральной зоне играет средне-позднеюрская олистострома – переотложенные разновозрастные сцементированные породы, объединившие

образования ранее выделявшихся самаркинской, себучарской, тудовакской, эльдовакской, маляновской и ряда других свит и толщ, возраст которых колеблется от позднего палеозоя до мела. Работами последних лет доказано, что эти толщи являются гигантским осадочным меланжем средне-позднеюрского возраста с аллохтонными, т.е. перемещенными, разновозрастными включениями размером от нескольких сантиметров до сотен метров и огромными тектоническими пластами протяженностью до десятков километров. В составе обломков глыб, так называемых олистолитов, и пластин – олистоплак преобладают протерозойские глубоко метаморфизованные породы и габброиды – эффузивные образования среднего-верхнего палеозоя. Особенно широкое распространение получили олистоплаки и покровы триас-юрских кремней (Т – Ю), по своему составу и возрасту практически идентичные одноименным образованиям Прибрежной зоны. Аллохтонные тела погружены во флишеидный и алевро-аргиллитовый матрикс со следами взмучивания, подводного оползания, тектонического расслаивания и осадочного меланжа. Объективно оценить мощность олистостромы практически невозможно, но, несомненно, она весьма значительна и испытывает существенные колебания по простиранию.

Восточно-Сихотэ-Алинский вулканический пояс (ВСАВП). Меловая система. Верхний отдел. На описываемой территории к зоне Центрального разлома приурочены узкие, вытянутые в субмеридиональном направлении грабенообразные депрессии, выполненные туфами и игнимбритами риолитов и риодацитов дорофеевской свиты раннего маастрихта – фрагменты структур перивулканической зоны ВСАВП. Они с резким несогласием перекрывают образования как Восточной, так и Центральной зон, их мощность оценивается в сотни метров.

Интрузивные образования. Ранне-позднемеловые интрузии широко распространены в описываемом районе. Тяготея к зоне Центрального разлома и оперяющим его трещинам, они сгруппированы в «интрузивные цепочки» северо-восточного простирания, являющиеся, очевидно, выходами на поверхность крупного криптобатолита. В структурном отношении формируют магматогенные своды, формирование которых приурочено к инверсионному этапу развития Сихотэ-Алиня. Как правило, многофазны, с гомодромной последовательностью внедрения дериватов: от габбро-диоритов, кварцевых диоритов, монцодиоритов начальных фаз к гранитам, гранодиоритам основной фазы и аляскитовым гранитам в завершающей. Для этих интрузий характерно присутствие первичномагматического граната (альмандина) и кордиерита, что указывает на избыточную глиноземистость родоначальных расплавов. Геохронологические датировки колеблются от 115 до 85 млн лет. Как правило, интрузии окружены широкими ореолами роговиков и ороговикованных пород, с ними часто связаны проявления олова, вольфрама, молибдена.

Позднемеловые интрузии являются субвулканическими аналогами серий ВСАВП и представлены мелкими штокообразными телами, сложенными преимущественно гранит-порфирами и риолитами. Иногда с ними связаны проявления олова, свинца, цинка, бериллия.

Тектоника

Структура Восточной зоны традиционно трактуется как гигантская мегасинклиналь с выполняющими ее центральные части наиболее молодыми образованиями альбской лужкинской свиты. На описываемой территории обнажается западное крыло мегасинклинория, где разрез в целом наращивается на юго-восток. Разрез зоны сложен практически полностью нижнемеловыми терригенными, часто флишеидными образованиями и характеризуется ритмичным строением. Породы интенсивно дислоцированы в крутые линейные, часто изоклиналильные и опрокинутые складки северо-восточного простирания, осложненные субмеридиональными и северо-восточными сдвигами и сопряженными с ними сбросами и взбросо-надвигами.

Крупнейшей разрывной структурой является Центральный разлом, служащий западной границей зоны и отделяющий ее от Центральной зоны. Его сдвиговая природа доказана еще Б.А. Ивановым (1972), который предполагал горизонтальные смещения по его зоне порядка 200 км. Центральный разлом хорошо выражен в рельефе спрямленными участками долин рек Перевальная и Дальняя, изломами хребтов и отчетливо дешифрируется на аэрофотоснимках любого масштаба, включая космические, в виде линейной зоны протяженностью более 500 км.

Согласно последним представлениям Центральная зона рассматривается как аккреационная призма, сложенная чередующимися пластинами турбидитов и олистостром с пластинами и включениями более древних пород различного состава. Для зоны характерны тектоническая расчлененность, крутые, часто лежащие и опрокинутые складки.

Территория национального парка располагается в шестибалльной сейсмической зоне (Карта сейсмического районирования СССР, 1983).

Полезные ископаемые

Отмечается достаточно детальная поисковая изученность района. К югу от национального парка находится один из старейших в Приморье районов золотодобычи – Благодатненский золотоносный узел, россыпи которого отрабатываются и в настоящее время (россыпь ручья Пионерка). Здесь же расположены коренные месторождения золота – Глухое и Благодатное (эксплуатировавшиеся до 1942 г.).

Основным полезным ископаемым центральной части территории является россыпное золото. Россыпи золота участка Дерсу: ручьи Кондратов, Прямой и Левый Михайловский – прогнозируются в 200, 130, 70 кг соответственно. Запасы определены по категории Р, т.е. как прогнозные. Все они находятся в водоохранной зоне нерестовой реки. При значительных затратах на природоохранные мероприятия и незначительных запасах россыпей разработка их нерентабельна. Около с. Дерсу расположено вольфрамовое с бериллием и молибденом рудопроявление Музейное. Вблизи границ парка в приустьевых частях ручьев Пропущенный и Малая Пихтовка находятся оловянно-полиметаллические с вольфрамом рудопроявления Дружное и Ближнее.

На юго-западе, в приграничной территории парка (2 км), находится оловянно-вольфрамовое месторождение Забытое, на котором проведены поисково-оценочные работы. Оно признано мелким по запасам объектом и относится к редкометалльно-касситерит-вольфрамитовому типу. Размеры рудного поля 1,5 x 1,5 км. Рудные тела с промышленными параметрами представлены свитами жил и прожилков (линейные штокверковые зоны) протяженностью до 800–850 м и жилами выполнения протяженностью 50–660 м и мощностью от 0,2 до 10 м. Руды комплексные, главным рудным компонентом является вольфрам. Промышленную ценность имеют также олово, окись бериллия, висмут, молибден и др.

В южной части парка находится несколько оловянно-полиметаллических с вольфрамом, медью рудопоявлений: Ростиславское, Академическое, Чайное, Туенгу, Средняя Куала (юго-западная граница), Ганхозское (юго-восточная граница).

Рельеф

Рельеф территории национального парка низкогорный, расчлененный. Основную роль в его строении играют долины рек Большая Уссурка и Арму, ее крупного правого притока, разделяющие территорию на три большие части.

Долина р. Большая Уссурка в ее среднем течении между впадением в нее р. Дальняя до устья р. Перевальная вытянута в меридиональном направлении. Протяженность 25 км. Долина корытообразная, ширина днища от 1 до 4 км (в районе с. Дальний Кут), частично заболоченная, преимущественно асимметричная, глубина вреза 200–250 м. Крутизна бортов от 5–8 до 40°, в подавляющем большинстве измерений – 10–15°. Днище долины в пределах парка располагается на отметках от 180 до 210 м над урочищем. Русло реки интенсивно меандрирует, разделено на серию протоков, переходит от одного борта долины к другому. Основной приток на этом отрезке – р. Беглянка. Долина этой реки, впадающей с востока, вытянута в северо-восточном направлении (длина 18 км). Также имеет корытообразную форму, ширина днища около 1 км. Глубина вреза 200–300 м. Крутизна бортов от 10 до 25°.

Крупный левый приток Большой Уссурки – р. Перевальная имеет прямую долину, вытянутую в северо-северо-восточном направлении, трассирующую Центральный Сихотэ-Алинский разлом. Долина корытообразная, ширина днища 2 км, частично заболочена. Борта асимметричные, преимущественно вогнутые. Глубина вреза 200–250 м.

Выше по течению, между устьями рек Перевальная и Арму, долина р. Большая Уссурка имеет субширотное направление (протяженность 18 км) и извилистые очертания. Как и ниже по течению, долина здесь корытообразная, с широким (до 4 км) плоским днищем. Вместе с тем долина имеет выраженный асимметричный профиль. Северный борт прямой, крутой (15–30°, местами обрывистый), тогда как южный вогнутый, относительно пологий (5–20°). Глубина вреза – 300 м. Русло реки переходит от одного борта долины к другому, местами разветвлено на ряд протоков.

Долина Арму также имеет в целом субширотное направление и корытообразный профиль. Ширина долины не превышает 2 км. Наиболее крупные притоки реки на данной территории – это реки Большая Пихтовая, впадающая с севера, и Крутогорка – с юга. Долина р. Большая Пихтовая вытянута в субмеридиональном направлении (протяженность 22 км), слабоизвилиста. Ее профиль в верхней части U-образный, ниже – корытообразный. Днище заболоченное, плоское, шириной до 1 км. Борта в основном крутые (15–35°, местами скальные с осыпями), прямые. Глубина вреза до 300 м. Долина р. Крутогорка асимметричная длиной 8 км, шириной в нижней части до 1 км, имеет также субмеридиональное направление и U-образный профиль. Глубина вреза 300 м.

Выше слияния с Арму и до южной границы парка долина Большой Уссурки вытянута в меридиональном направлении на 15 км. В отличие от ранее описанных участков долина здесь более прямая, а в русле почти отсутствуют меандры. Долина корытообразная, асимметричная (левый борт крутой, а правый пологий), с глубиной вреза 500–600 м. Ширина днища до 3 км. Долина ее основного притока на этом отрезке – р. Лесовозная – имеет корытообразный профиль, в истоках – U-образный, днище плоское, заболоченное, шириной до 1 км. Борта прямые, относительно крутые (до 10–20°). Глубина вреза 200–250 м.

Водораздельное пространство между долиной Большой Уссурки на западе и юге и долиной Большой Пихтовой на востоке представляет собой низкогорье, расчлененное водотоками первого и второго порядка. Средняя высота вершин 750–850 м, превышение над днищами долин указанных рек достигает 450–550 м. Водораздельные гребни между водотоками выраженные, постепенно понижающиеся в сторону долин рек. В южной части располагается платообразная реликтовая поверхность выравнивания (диаметр около 4 км) с максимальными для данного района абсолютными отметками – 1181,9 м (г. Заманиха). Склоны почти повсеместно покрыты чехлом элювиально-делювиальных отложений, и лишь в юго-западной части участка имеется ряд площадей с распространением скальных останцев высотой от 6 до 15 м.

Территория, ограниченная с севера и востока долиной р. Большая Уссурка, а с запада долиной р. Перевальная, имеет в целом аналогичное строение. Максимальная высота здесь – 982,6 м (г. Снеговая). Превышение над днищами долин 450–650 м. Склоны отрогов имеют прямой профиль, крутизна 15–20°. Отроги, идущие в северном направлении, обычно положе – 10–20°.

Часть парка, располагающаяся к востоку от Большой Уссурки и ограниченная с востока долиной Крутогорки, а с юга – водоразделом, отделяющим бассейн р. Лесовозная от верхних притоков Большой Уссурки (ключ Болотный) и притоков р. Колумбе, интенсивно расчленена долинами водотоков первого и второго порядков. Высоты водоразделов здесь 650–950 м. Максимальная отметка 1145 м (г. Крутогорка). Относительное превышение над днищами рек 550–750 м. Водоразделы узкие, извилистые. Склоны до 15–25°, обычно 10–15°, покрыты элювиально-делювиальным чехлом. Скальные выходы единичны.

Наибольшая высотная отметка в пределах территории располагается у ее южной границы – г. Арму (1330,8 м), являющаяся центральной рельефообразующей структурой данного участка. К северу и северо-западу от нее отходят четко выраженные узкие водораздельные гребни с превышением над днищем долины р. Большая Уссурка – 600–800 м и абсолютными высотами до 1000–1100 м.

Развитие современного рельефа поверхности происходило на протяжении всего кайнозоя. Основные рельефоформирующие процессы – эрозия и денудация. На данной территории очень ярко проявляется связь форм рельефа с тектоникой, в первую очередь крупных его элементов, таких как долины рек. Морфология гор – характер склонов, вершинных поверхностей, седловин, густота расчленения – в большой степени зависит от состава пород, слагающих тот или иной участок территории. В формировании характера бортов долин рек огромную роль играла боковая эрозия.

Гидрография

Территория национального парка охватывает центральную часть бассейна р. Большая Уссурка на расстоянии от 294 до 206 км от устья, включая приустьевую часть и низовья рек Арму и Перевальная. Большая Уссурка принимает водосборы рек Лесовозная, Крутогорка, Перевальная, Арму и ряда малых рек.

Река Большая Уссурка протекает среди горной лесистой местности. Ее глубокая и узкая долина имеет вид ущелья, стеснена грядами сопков, близко подступающих к потоку с обеих сторон. Относительная высота близлежащих сопков колеблется от 500 до 800 м. Их покрытые лесом склоны круто опускаются ко дну долин, а местами нависают над руслом в виде скалистых обрывов. Склоны расчленены долинами, ущельями и оврагами. Пойма прерывистая, располагается главным образом в местах излучин реки; ширина ее колеблется от 0,3 до 1 км на ровной и сплошь заросшей пойме, местами встречаются старицы с заболоченными берегами. Пойма в основном сложена аллювиальными отложениями. Полное затопление поймы происходит лишь во время очень сильных паводков.

Русло реки на охраняемом участке образует ряд крупных извилин с большим радиусом кривизны. В конце участка между устьями рек Лесовозная и Арму оно почти прямолинейно. Перекаты и плесы чередуются примерно через каждые 2–3 км. Наиболее известен перекат Каменный, затрудняющий движение по реке даже на лодках. Ширина потока варьирует в пределах от 35–50 до 110 м; глубина на мелководных участках – 0,4–1 м, на плесах до 2–2,5 м. Скорости течения 2–2,5 и 0,8–1 м с⁻¹ соответственно. Берега крутые и обрывистые.

Талая вода начинает поступать в реки в первой пентаде апреля. Весеннее половодье вместе с традиционными дождевыми паводками наступает в апреле–мае. Величина стока за эти месяцы составляет 20–30% годового объема. Подъем уровня составляет 2–2,5 м. Весеннее половодье не вызывает значительного затопления поймы по причине низкого уровня воды в реках бассейна Большой Уссурки в зимний период.

Для рек района характерен летне-осенний интенсивный паводковый режим. Паводки почти непрерывно следуют друг за другом в течение всего теплого периода года. Продолжительность периода, когда на реках наблюдается значительный подъем воды (превышение среднегодового показателя в 2 раза и более), составляет в среднем 55–60 дней, в отдельные годы – 90–110 дней (40–45% продолжительности теплого периода). Однако размеры паводков сравнительно небольшие (средние максимальные расходы воды превышают минимальные летние в 10–25 раз). Поэтому распределение стока более равномерное, чем на реках других районов (соотношение минимальных летних расходов к средним годовым составляет 0,5–0,8). Среднее число паводков в году – 4.

Повторяемость сильных паводков, наблюдаемая до 2009 г., фиксировалась 1 раз в 10 лет. Начиная с 2009 г. интенсивность паводков с полным затоплением поймы в районе национального парка и прилегающих к нему территорий наблюдается с периодичностью 1–3 года. Пиковый подъем уровня воды во время сильных паводков достигает 4–5 м.

Дождевые паводки наблюдаются обычно до сентября, но в отдельные годы проходят в сентябре, например в 2018 г. Спад воды после прохождения последних паводков продолжается до середины ноября. В зимний период сток низкий, но довольно устойчивый; величина его составляет 4–5% годового объема. Реки здесь довольно многоводны. Средние модули стока имеют величины: годового стока 10–15; минимального летнего 10–12; минимального зимнего 0,4–0,8 л с⁻¹ км². Средняя мутность воды не превышает 20–30 г м⁻³. Осенний ледоход начинается в начале ноября, в отдельные годы – в третьей декаде октября.

Продолжительность ледовых явлений – 170–180 дней. Средняя дата наступления ледостава – первая декада декабря. Реки начинают замерзать в последней пентаде ноября, вскрываются в последней пентаде апреля или первой пентаде мая. Средняя продолжительность ледостава 140–150 дней. Ледостав устойчивый, наибольшая толщина льда до 140 см. В отдельные годы на реках образуются поля торосов, к концу ледостава часто формируются пустоты (пустоледка), создающие опасность для крупных животных. Во второй половине ледостава обычно появление наледей на реках, устьях рек и ручьев.

В летний период вода холоднее, чем в других районах Приморского края. Ее температура также ниже температуры воздуха в продолжение всего «безледоставного» периода и выше – лишь в октябре. Вода чистая, питьевого качества.

Климат

Климат северо-западного макросклона Среднего Сихотэ-Алиня, в пределах которого расположен национальный парк, характеризуется как континентальный с муссонными чертами. Региональные и локальные особенности климата подробно проанализированы и описаны при создании национального парка в «Эколого-экономическом обосновании на создание Национального парка “Удэгейская легенда”». Анализ климатических особенностей проведен на основании материалов регулярных наблюдений по 2 ближайшим репрезентативным метеостанциям:

Мельничное (примерно в 15 км к югу от границ парка, абсолютная высота 331–335 м) и Глубинное (около 25 км к северу, абсолютная высота 208 м) (Научно прикладной..., 1988). Кроме того, в ходе расчетно-экстраполяционных построений и учета «высотно-экспозиционного» влияния рельефа на климат, а также при описании отдельных метеоэлементов привлекались выборочные данные по некоторым «соседним» метеостанциям – Картун – Рошино, в 30 км к западу-северо-западу – абсолютная высота 148 м; высота 1647, в 60 км к северо-востоку – абсолютная высота 1570 м; Малиново – Малиновка, в 80 км к юго-востоку – абсолютная высота 138 м (Справочник..., 1966 а, б). При этом необходимо подчеркнуть, что по комплексу природных условий наиболее информативными для всей территории являются материалы наблюдений на метеостанции Мельничное. Абсолютная отметка, к которой приурочены наблюдения за природными явлениями на территории национального парка, в месте расположения КПП 1 урочища Корейский ключ, – 227,4 м, это примерно на равном удалении от метеостанции Глубинное – 35 км и метеостанции Мельничное – 36 км. Наблюдения проводились с помощью портативной метеостанции Skywatch Geois 11, фиксировались государственными инспекторами в дневниках наблюдений, научными сотрудниками национального парка.

Продолжительность солнечного сияния, как известно, зависит от длительности светового дня, облачности и закрытости горизонта в конкретных местоположениях. Ее характеристики приводятся по данным метеостанций Картун и Мельничное, единственных из ближайших, где проводились такие наблюдения (табл. 1).

Средняя продолжительность дня для всей описываемой территории, расположенной в целом между 45°49 и 45°33 с.ш., принимается по выполненным расчетам для широты ее центральной полосы (45°40 с.ш.). Минимальная продолжительность солнечного сияния отмечается в начале зимы (в среднем около 132 ч), а наибольшая – в начале лета (июнь, в среднем 205–207 ч). В отдельные годы число часов солнечного сияния может сильно отклоняться от многолетних средних (от 30–40 зимой до 150 ч летом, причем в обе стороны).

На общем фоне закономерного увеличения (от зимы к лету) и уменьшения (от лета к зиме) продолжительности солнечного сияния, параллельно с увеличением и уменьшением продолжительности дня, отмечаются относительные понижения характеристик сияния в апреле–мае и сентябре. Это, вероятно, в определенной мере связано с последствиями сезонной перестройки барических ситуаций и относительно частым прохождением фронтальной «повышенной» облачности. Снижение показателя суммарной продолжительности солнечного сияния в декабре–январе на 12–5 ч, фиксируемое более южной станцией Мельничное по сравнению со станцией Картун, объясняется локальными факторами. К ним относятся частое образование температурных инверсий и ограниченное вертикальное (из-за антициклонического сжатия) и горизонтальное (из-за расчленения рельефа) перемешивание воздуха. В результате часто возникает дымка, которая ограничивает прозрачность атмосферы и тем самым уменьшает число часов солнечного сияния. Соотношение показателей наблюдавшейся продолжительности солнечного сияния и возможной существенно отличается по сезонам. В теплый период оно

Таблица 1. Характеристики среднемесячной продолжительности дня и солнечного сияния

Месяц	Продолжительность дня*	Продолжительность солнечного сияния, ч		Отношение наблюдавшейся продолжительности к возможной, %			Среднее солнечное время, ч	Число дней без солнца	
		К	М	К	М	**		К	М
I	9:02	152	147	62	59	(59)	5,4	4	4
II	10:21	175	166	66	57	(63)	6,6	2	3
III	11:49	191	191	55	52	(56)	6,8	4	3
IV	13:29	173	183	46	45	(48)	7,0	5	4
V	14:54	182	198	42	43	(47)	7,1	4	3
VI	15:41	212	194	48	41	(45)	7,2	3	3
VII	15:22	200	194	45	41	(45)	7,2	3	4
VIII	14:12	200	171	48	39	(43)	6,3	4	4
IX	12:38	174	168	49	44	(48)	6,2	3	3
X	11:01	182	175	57	51	(56)	6,5	3	4
XI	9:30	145	146	57	51	(57)	5,6	4	4
XII	8:43	138	126	59	46	(54)	4,7	4	4
Год		2124	2059	51	46	(51)	6,4	43	43

* Продолжительность дня дана на 15-е число, ч: мин; К – метеостанция Картун, М – метеостанция Мельничное.

** В связи с тем что станция Мельничное расположена в днище горной долины, в скобках приведены показатели с учетом поправки на закрытость горизонта.

не превышает 42–49%, а в холодный – чаще колеблется в пределах 58–62%. Количество дней без солнца составляет 3–4%.

Среднегодовые показатели температуры воздуха мало колеблются по территории (от 0,1 °С на севере до 0,7 °С на юге), но между ее среднемесячными значениями контрасты значительны (табл. 2). Особенно они велики между отдельными месяцами в переходные сезоны (весной до 8–12 °С, осенью до 9–13 °С) и относительно небольшие зимой (3–5 °С) и летом (1–4 °С). В то же время квадратичное отклонение среднемесячных температур воздуха зимой колеблется от 2,0 до 2,6 °С, а летом – в пределах от 1 до 1,3 °С (Научно-прикладной..., 1988). Это свидетельствует о том, что температурный режим летом более устойчив.

Самые низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (от –22,9 до –24,2 °С), а самые высокие – в июле (от 19,2 до 20,3 °С). Горизонтальные градиенты температуры относительно невелики. Изменения между соседними разновысотными участками могут достигать существенных значений. Летом температуры воздуха понижаются в среднем на 0,47 °С на каждые 100 м поднятия; зимой – до 0,3 °С. Из-за развития частых температурных инверсий в котловинах и узких глубоких речных долинах значения могут повышаться. Рост среднемесячных температур воздуха весной происходит довольно быстро – от –6,7–9,0 в марте до

9,4–10,4 °С в мае. Понижение осенью происходит еще быстрее – от 11,3–11,8 °С в сентябре до –9,2–10 °С в ноябре.

Годовая и сезонная динамика среднесуточных температур достаточно хорошо иллюстрируется в табл. 3. Особенно это показательно в «обособлении» самого теплого и холодного месяца и аналогичных периодов. Здесь теплый период (среднесуточные температуры воздуха выше 0 °С) длится с 9.04 по 23.10 (всего 196), но наиболее комфортные условия (среднесуточные более 15 °С) превышают 80 дней – примерно с 14.06 по 4.09 (Справочник..., 1966б).

Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха и их среднее квадратическое отклонение, t °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Станция Глубинное, 208 м над уровнем моря												
–24,2	–19,7	–9,0	2,6	10,4	16,3	20,3	19,1	11,8	2,6	–10,0	–21,0	–0,1
2,3	2,3	2,2	1,4	1,1	1,0	0,9	1,3	1,0	1,2	2,2	2,6	0,7
Станция Мельничное, 335 м над уровнем моря												
–22,9	–18,3	–8,7	2,1	9,4	15,0	19,2	18,2	11,3	2,6	–9,2	–19,9	–0,1
2,1	2,0	2,1	1,3	1,1	1,1	1,2	1,3	1,0	1,2	1,9	2,3	0,6

Таблица 3. Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов

Среднесуточная температура воздуха, t °С	Дата	Число дней, превышающих эти пределы	Дата	Число дней, превышающих эти пределы
	Станция Сибичи		Станция Усть-Колумбе	
–25	28.01 29.12	334	–	–
–20	17.02 8.12	293	10.02 15.12	307
–15	3.03 25.02	266	28.02 3.11	274
–10	17.03 14.1	241	15.03 16.1	245
–5	29.03 3.11	218	27.03 4.11	221
0	10.04 23.10	195	9.04 23.10	196
5	28.04 7.10	161	27.04 8.10	163
10	19.05 21.09	124	22.05 20.09	120
15	11.06 4.09	84	16.06 3.09	78
20	16.07 10.08	24	–	–

Примечание. Здесь и далее прочерк означает отсутствие данных.

На изменение среднесуточных температур воздуха большое влияние оказывает облачность, определяющая состояние неба (0–2 балла – ясно; 3–7 баллов – облачно; 8–10 баллов – пасмурно). Эти изменения показательно выражаются через колебания амплитуд (табл. 4). Последние в обычно наблюдаемых обстановках облачности достигают максимальных значений в феврале – от 21,2 при ясном состоянии неба до 7,7 °С при пасмурном состоянии неба, а минимальных в августе – соответственно от 15,8 до 7,1 °С (Справочник..., 1966б). Следует подчеркнуть, что такие максимальные амплитуды характерны для местоположений замкнутых котловин и узких глубоких долин.

Таблица 4. Изменение показаний среднесуточной температуры воздуха в зависимости от облачности

Месяц	Среднесуточная температура воздуха, t °С			
	Ясно	Облачно	Пасмурно	Независимо от состояния
I	18,4	12,9	7,8	16,3
II	21,2	14,4	7,7	18,0
III	21,2	13,4	6,7	16,4
IV	18,0	12,0	6,9	13,5
V	19,8	14,0	8,4	14,8
VI	19,9	14,1	8,2	13,8
VII	17,4	12,8	7,7	12,5
VIII	15,8	11,8	7,1	11,3
IX	17,0	12,6	7,1	12,1
X	17,8	12,6	6,6	14,0
XI	16,2	11,6	7,9	13,2
XII	17,2	12,4	6,8	14,4

В пространственно-временном распределении средних минимальных температур (табл. 5) прослеживаются следующие особенности: наиболее низкие их значения, снижаясь по территории с юга на север, везде приурочены к январю (от –30,4 до –31,9 °С); относительно высокие, повышаясь в районе с юга на север, отмечаются в июле (от 13 до 14,7 °С). Это выдерживается и в показателях их годовых значений – соответственно –6,5 и –6,9 °С (Научно-прикладной..., 1988). Приведенные материалы дают представление о наиболее частом понижении температуры воздуха за сутки, фиксируемой в течение нескольких часов в предутреннее время летом и утреннее зимой, а также о более низких температурах воздуха в «замкнутых» местоположениях, по сравнению с горными склонами. Абсолютные минимумы температуры воздуха, практически не испытывая колебаний по территории, достигают в январе –49 °С, а в июле 3 °С.

Интересные особенности в описываемом районе выявляются в пространственно-временном распределении среднемаксимальных температур воздуха. Последние данные дают представление о наиболее теплой дневной (около 14–15 ч) части суток. Наиболее низкие их значения, повышаясь по территории с юга на север, везде приурочены к январю (от –14,2 до –14,1 °С); наиболее

высокие, также повышаясь в районе с юга на север, отмечаются в июле (от 26,5 до 27,2 °С). Это выдерживается повсеместно в показаниях как годовых их значений (7,8 и 8,4 °С), так и сезонно (в апреле от 9,7 до 10,5 °С; в октябре от 10,8 до 11,2 °С).

Различия в пространственно-временном распределении среднеминимальных и среднемасимальных температур воздуха в значительной мере предопределены влиянием орографического фактора. Значения абсолютных максимумов могут достигать 37–39 °С (в августе), не опускаясь даже в самые холодные месяцы ниже положительных отметок (1–3 °С в январе). В этой связи уместно отметить, что в холодный период года на всей территории возможны оттепели различной непрерывной продолжительности. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 121–122 дня (при минимальной – 98 и наибольшей – 145), что фиксируется по датам последнего и первого заморозков. Последний из них в воздухе наступает в среднем 24 мая (при разбросе дат от 9 мая до 15 июня), а первый – 23 сентября (при разбросе дат от 7 сентября до 11 октября).

Таблица 5. Пространственно-временное распределение средних, максимальных и минимальных значений температур воздуха, t °С

Месяц	Абсолютные максималь- ные	Средние максималь- ные	Средние минималь- ные	Абсолютные минималь- ные	Абсолютные максималь- ные	Средние максималь- ные	Средние минималь- ные	Абсолютные минималь- ные
	Станция Глубинное				Станция Мельничное			
I	-14,1	-14,1	-31,9	-48	3	-14,2	-30,4	-49
II	10	-9,0	-28,8	-45	11	-9,3	-27,2	-43
III	17	0,0	-17,9	-38	19	-0,6	-17,0	-39
IV	28	10,5	-4,1	-22	28	9,7	-4,1	-23
V	32	19,1	2,9	-8	33	17,8	2,5	-8
VI	34	23,8	9,7	-1	34	22,9	8,9	-1
VII	38	27,2	14,7	3	37	26,5	13,9	3
VIII	39	25,7	14,2	3	37	25,0	13,7	2
IX	31	19,5	6,4	-8	31	18,8	6,3	-8
X	27	11,2	-3,4	-22	29	10,8	-3,1	-22
XI	15	-1,7	-16,5	-39	17	-1,9	-15,2	-36
XII	7	-12,0	-28,0	-44	6	-12,1	-26,6	-44

По наблюдениям, проведенным на территории национального парка за период 2010–2017 гг., аномально холодная зима отмечалась в 2012 г., когда на протяжении января абсолютно низкие температуры со значениями ниже -40 °С держались 13 дней, минимум достигал -48 °С. В остальные дни утренние температуры не превышали -30 °С. Среднесуточные температуры января 2012 г. -27,6 °С. Сильные морозы января сопровождалась метелями, ослабление морозов наблюдалось в первой декаде февраля, когда на смену морозам пришла непродолжительная

оттепель, сменявшаяся умеренными морозами. Зима 2013 г. была менее суровой, аномальные холода с температурными минимумами ниже -30 , в отдельные дни до -40 °С отмечались в первых декадах января, последняя декада января и февраль характеризовались умеренными морозами, перемежавшимися с непродолжительными оттепелями. Среднесуточная температура февраля 2013 г. $-18,6$ °С. В зимние периоды 2014–2018 гг. фиксировались относительно умеренные морозы, обильные снега.

Температура поверхности почвы рассматривается по данным наблюдений на метеостанциях, выполненных по общепринятым методикам, на открытых незадернованных участках. Поэтому для тематической характеристики территории парка, в основном покрытой лесом, необходимо вносить соответствующие коррективы. Распределение средних месячных, максимальных и минимальных температур поверхности почвы характеризуется следующими особенностями (табл. 6, 7). Значения среднемесячных температур открытых участков (на фоне среднегодовых температур почвы, равных 1 °С) варьируют в широких пределах – от -25 – 27 °С в январе до 24 – 25 °С в июле. Средняя месячная температура поверхности почвы в зимнее время на 2 – 3 °С ниже средней месячной температуры воздуха, а в летнее время соответственно на 3 – 4 °С выше (Справочник..., 1966а, б; Научно-прикладной..., 1988).

Анализ более мелких колебаний значений нагревания и охлаждения достигается привлечением более информативных величин – средних экстремальных значений температуры почвы. При этом средняя максимальная температура характеризует в основном тепловое состояние поверхности в дневное время, а средняя минимальная – в ночное время. Так, сравнение некоторых табличных данных показывает, что летом везде характеристики средней минимальной температуры почвы и воздуха практически не отличаются ($9,0$ – $14,8$ против $8,9$ – $14,7$ °С), а зимой первые из них ниже вторых на 2 – 6 °С. Из этого ряда «выбываются» летние обстановки глубокорасчлененных участков. В условиях ночного стока холодного воздуха по склонам температуры поверхности почвы часто оказываются на 1 – 2 °С выше температур воздуха.

В датах первого и последнего заморозка на поверхности почвы, по сравнению с таковыми в воздухе, прослеживается незначительный разброс. В результате

Таблица 6. Повторяемость периодов с оттепелью различной непрерывной продолжительности и их средняя непрерывная продолжительность

Станция	Периоды непрерывной продолжительности, %					Непрерывная продолжительность периодов, дни		
	1–2	3–5	6–10	11–20	21–30	Средняя	Средняя из наибольших	Наибольшая
Усть-Колумбе	52,5	28,1	11,9	5,6	1,9	4,0	12,0	28
Картун	59,1	26,1	9,1	4,0	1,7	3,5	10,0	28
Малиново	59,7	21,3	12,8	4,9	1,3	3,6	11,0	28

Таблица 7. Сезонное изменение показаний температуры поверхности почвы, t °C

Месяц	Средняя мак- симальная	Средняя	Средняя мини- мальная	Минимальная абсолютная	Средняя мак- симальная	Средняя	Средняя мини- мальная	Минимальная абсолютная
	Станция Глубинное				Станция Мельничное			
I	-13,8	-27	-38,4	-57	-12,7	-25	-35,4	-54
II	-6,4	-23	-35,0	-51	-5,7	-20	-32,3	-47
III	2,7	-11	-24,0	-48	3,0	-10	-21,6	-42
IV	13,5	2	-6,4	-28	16,6	3	-5,5	-26
V	28,2	13	1,4	-10	28,0	13	1,6	-10
VI	37,8	20	9,3	-2	36,6	19	9,0	-2
VII	40,5	25	14,8	4	40,5	24	14,2	1
VIII	39,8	22	14,0	4	37,4	22	14,0	1
IX	29,4	4	6,8	-8	28,5	14	6,4	-11
X	18,0	4	-4,0	-31	17,1	4	-3,7	-25
XI	0,6	-10	-19,1	-44	0,7	-10	-18,5	-42
XII	-11,3	-23	-33,9	-50	-10,4	-21	-31,3	-46

средняя продолжительность безморозного периода на почве и в воздухе оказывается сравнимой (120–122 против 121–122 дней), изменяясь в среднем с 24 мая по 24 сентября.

Для годового хода относительной влажности (степени насыщения водяным паром) воздуха присущи следующие отличительные черты. На фоне примерно ровного ее распределения в течение года (в среднем 72–74%) выделяются крайние значения (минимальные – 68%, в марте–мае; максимальные – 84%, в августе–сентябре). При рассмотрении более информативных значений (величин относительной влажности в 13 ч – значений, близких к минимуму в момент наиболее интенсивного испарения; в 01 ч – значений, близких к максимуму) выявляются более интересные закономерности (табл. 8). Так, величины этой влажности в ночные часы, варьируя на наиболее высоком уровне, в годовом ходе равномерно располагаются на асимметричной выпуклой кривой от 77 в январе до 96% в августе и далее до 79% в декабре. Распределение относительной влажности в дневные часы фиксирует 2 повышения – 62–63% в декабре и январе; 62–63% в июле и августе и 2 минимума – 45–47% в марте–мае и 48% в октябре (Научно-прикладной..., 1988). Суточный ход относительной влажности воздуха наиболее резко выражен летом (максимум – ночью, минимум в 13–14 ч; суточная амплитуда составляет 10–15%). Таким образом, ход относительной влажности, испытывая колебания значительные лишь в переходные сезоны в отдельные годы, обычно отличается повышенной устойчивостью. Это подтверждается распределением числа «сухих» (с относительной влажностью до 30%) и «влажных» (с относительной влажностью равной или более 80%) дней.

Таблица 8. Сезонное изменение относительной влажности воздуха, количество дней

Месяц	Относительная влажность			
	Ниже 30%	Выше 80%	Ниже 30%	Выше 80%
	Станция Глубинное		Станция Мельничное	
I	0	2	0,1	2
II	0,9	2	0,5	2
III	6	2	4	2
IV	13	3	12	3
V	14	4	12	4
VI	3	4	3	5
VII	0,9	5	1	6
VIII	0,5	7	0,5	7
IX	4	5	3	5
X	9	6	9	4
XI	1	5	2	4
XII	0,2	4	0	4
Год	53	49	47	48

Распределение числа «влажных» дней в году напоминает кривую хода относительной влажности в ночные часы. В годовом распределении «сухих» дней выявляется два максимума (13–14 в апреле–мае и 9 в декабре) и два минимума (0–0,2 в декабре–январе и 0,5–1 в июле–августе), что согласуется с кривой хода годового распределения относительной влажности в дневное время. При этом в отдельные годы приведенное число «сухих» и «влажных» дней может значительно отклоняться от среднего многолетнего (до 10 дней).

В распределении общего годового количества атмосферных осадков в районе с юга на север отмечаются определенные колебания: станция Мельничное – 721 мм, станция Глубинное – 939 мм (табл. 9). Естественно, что непосредственно в пределах парка следует ожидать значительно меньших изменений (примерно от 800 до 850 мм), кроме аномально сухих и влажных годов. В кривой годового хода атмосферных осадков выявляется четкий максимум в августе – 130–173 мм и плохо выраженный минимум в феврале – 12–19 мм (Научно-прикладной..., 1988).

В теплый период года на рассматриваемой территории выпадает от 85 до 87% (около 700 мм) общей годовой суммы осадков, выпадающих преимущественно в жидком виде. Основная их часть приходится на лето–начало осени (примерно 120–130 мм ежемесячно), с четко выделяемым максимумом в августе (140–150 мм). Выпадение жидких осадков возможно и в холодный период (1–2 мм в марте и 1–5 мм в ноябре).

В холодный период года в районе выпадает 13–15% (около 110–120 мм) от общего количества осадков, преимущественно в твердом виде и относительно равномерно по месяцам (16–20 мм), с плохо выраженным максимумом в декабре (29 мм). Выпадение твердых осадков возможно и в переходные сезоны (от 1 до

Таблица 9. Сезонные изменения количества выпадения атмосферных осадков, мм

Месяц	Жидкие	Твердые	Смешан- ные	Общие	Жидкие	Твердые	Смешан- ные	Общие
	Станция Глубинное				Станция Мельничное			
I	0	21	0	21	0	12	0	12
II	0	18	1	19	0	12	0	12
III	1	23	6	30	0	20	2	23
IV	28	11	18	57	1	12	17	42
V	84	0	4	88	13	1	10	76
VI	124	0	0	124	65	0	0	99
VII	166	0	0	166	99	0	0	119
VIII	173	0	0	173	119	0	0	130
IX	115	0	1	116	130	0	0	100
X	49	4	18	71	100	5	18	58
XI	5	17	21	43	35	20	10	31
XII	0	29	2	31	1	18	1	19
XI-III	6	108	30	144	2	82	13	97
IV-X	739	15	41	795	561	18	45	64
Год	745	123	71	939	563	100	58	721

18 мм в апреле–мае и от 5 до 18 мм в октябре). Смешанные осадки отмечаются в течение всей весны и осени. В распределении среднесуточного количества осадков прослеживаются плавное нарастание их сумм с января (1 мм) к августу (8–11 мм), а затем плавное снижение к декабрю – 1–2 мм (табл. 10) (Научно-прикладной..., 1988).

Таблица 10. Сезонное распределение среднесуточного количества осадков, мм

Месяц												Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Станция Глубинное												
1	2	3	4	6	7	10	11	7	6	3	2	5
Станция Мельничное												
1	1	2	3	5	6	7	8	6	5	3	1	4

Среднемесячная продолжительность осадков, по данным станции Малиновка, в пределах теплого периода составляет 70 ч, а в течение холодного – 82 ч (при общей годовой продолжительности – 907 ч). Максимальные величины превышают указанные примерно в 2 раза. Максимальная интенсивность жидких осадков, судя по существующим материалам наблюдений, изменяется по различным временным интервалам в широких пределах (от 0,1 до 3,5 мм в мин.). Так, на протяжении коротких отрезков времени (до 5 мин) наибольшая их интенсивность может составлять 1,6–3,5 мм в минуту, в течение 1 ч – 1,0 мм; 24 ч – 0,1. В заключение следует

отметить, что описываемый район, учитывая данные метеостанции Раздольное, по показателям максимальной интенсивности жидких осадков контрастно выделяется среди остальных районов Приморского края.

Снежный покров в районе характеризуется следующими особенностями: средние даты его появления отмечаются 25–27 октября, а устойчивого образования от 9 до 13 ноября (табл. 11). Крайние даты при этом могут отличаться на 15–25 дней. Характерно, что формирование и разрушение снежного покрова происходит в общем равномерно. Разрушение покрова начинается в среднем с 5 по 10 апреля, а полный сход отмечается 21–25 апреля. При этом крайние даты могут отклоняться от указанных на 20–25 дней. Число дней со снежным покровом в районе колеблется от 152 до 158 дней (Научно-прикладной..., 1988).

Таблица 11. Фенологические данные состояния снежного покрова

Состояние устойчивого снежного покрова	Станция	
	Глубинное	Мельничное
Количество дней со снежным покровом	158	152
Появление	25.10	27.10
Образование	9.11	13.11
Разрушение	10.04	5.04
Сход	21.04	25.04

Увеличение мощности снежного покрова с момента его устойчивого образования и до начала марта происходит плавно, но с различной скоростью на отдельных элементах рельефа. Анализ всех имеющихся материалов по природно-климатической обстановке района позволяет отметить, что в днищах и нижних частях склонов речных долин формируются меньшие мощности снежного покрова, чем в пределах верхних частей склонов и сглаженных водораздельных поверхностей. Для характеристики первых из указанных местоположений вполне обоснованно можно использовать данные по станции Мельничное, а для вторых с известными ограничениями данные станции Глубинное (табл. 12) (Научно-прикладной..., 1988).

Плотность снежного покрова одновременно с нарастанием его мощности постепенно повышается с 0,15 до 0,19–0,20 г см⁻³. Максимальные величины его плотности отмечаются в конце марта (0,22–0,24 г см⁻³), когда в условиях возможного выпадения жидких и смешанных осадков и отмечающегося таяния сверху снежный покров «оседает» и вскоре начинает разрушаться.

Средние величины мощности снежного покрова на «приводораздельных» поверхностях могут достигать 52 см (при колебаниях от 20 до 70 см), а в днищах долин и на нижних частях склонов – 25 (при колебаниях от 5 до 67).

В формировании ветрового режима в районе четко проявляется роль орографического фактора. Особенно это сказывается на обособлении преобладающих ветров в долинах, когда их направления совпадают на каждом из отрезков долин. Поэтому данные метеостанций, расположенных в долинах, в отношении

ветровых характеристик для всего района являются в общем плане ориентировочными. Для дробных экстраполяций они непригодны и нуждаются в корректировке по метеостанциям открытых пространств.

Таблица 12. Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке на открытом месте, см

Декада	В различные месяцы						За зимний период		
	XI	XII	I	II	III	IV	Средняя	Максимальная	Минимальная
Станция Глубинное									
1	3	20	34	43	48	23	52	73	27
2	8	26	37	44	46	4			
3	13	30	40	47	41				
Станция Мельничное									
1	3	12	18	20	21	8	25	67	5
2	6	15	19	21	20	2			
3	9	16	19	22	17				

Преобладающими являются ветры западных и в меньшей мере восточных румбов, что отражает общую региональную схему атмосферной циркуляции (табл. 13). Значительно большее разнообразие в повторяемости направлений ветров отмечается по сезонам. Так, зимой на основной территории главенствуют ветры западных и северо-западных направлений, а в северо-западной части – юго-западные и западные. Весной западные и северо-западные ветры остаются преобладающими, но они дополняются ветрами восточных и юго-восточных направлений. На северо-западе парка дуют в это время юго-западные и западные ветра. В летнее время для большей части района господствующими становятся восточные ветры, но на северо-западе они несколько уступают свои позиции западным и юго-западным ветрам. Осенью наибольшая повторяемость принадлежит западным и несколько меньшая восточным ветрам (Научно-прикладной..., 1988). Наибольшая повторяемость штилей отмечается на северо-западе территории и везде в пределах выровненных водораздельных пространств.

Таблица 13. Повторяемость направления ветра и штилей, %

Месяц	Направление ветра								Штиль
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	
Станция Глубинное									
I	1	1	3	1	6	47	38	3	80
II	1	2	5	1	7	45	35	4	71
III	2	3	4	2	6	34	40	9	63
IV	5	7	9	6	10	27	28	8	57
V	5	8	13	7	12	24	24	7	54
VI	4	11	17	7	11	24	20	6	61
VII	3	9	17	9	12	26	20	4	66

Месяц	Направление ветра								Штиль
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	
VIII	3	11	17	7	11	26	19	6	69
IX	3	8	14	5	10	29	25	6	67
X	2	5	9	3	8	32	34	7	40
XI	3	3	5	2	4	37	41	5	68
XII	1	2	3	1	4	48	38	3	78
Год	3	6	10	5	9	32	29	6	67
Станция Мельничное									
I	1	1	7	2	0	2	56	31	50
II	1	2	11	2	0	2	53	29	43
III	2	3	17	4	1	2	44	27	38
IV	2	5	27	8	2	3	33	20	35
V	2	5	35	15	3	3	23	14	32
VI	2	7	43	17	3	3	15	10	36
VII	2	7	43	15	3	2	16	12	40
VIII	2	5	41	12	2	3	22	13	44
IX	2	5	35	9	2	3	27	17	45
X	1	4	27	6	1	3	38	20	42
XI	1	3	19	3	1	2	46	25	40
XII	1	2	10	2	1	2	56	26	48
Год	1	4	27	8	2	2	36	20	41

Средние годовые скорости ветра мало изменяются по территории (от 1,1 до 2,2 м с⁻¹). Незначительно от них отличаются среднемесячные скорости. В то же время количество дней с повышенными скоростями ветров сильно варьирует в зависимости от сезона (Научно-прикладной..., 1988). Такие дни крайне редко отмечаются в летние месяцы (табл. 14, 15).

Таблица 14. Сезонное изменение скорости ветра, м/с⁻¹

Месяц	Станция Глубинное		Станция Мельничное	
	Средняя месячная	Максимальная	Средняя месячная	Максимальная
I	0,7	14	2,4	20
II	1,0	13	2,6	20
III	1,4	20	2,7	20
IV	1,5	20	2,6	20
V	1,5	17	2,3	20
VI	1,0	13	1,8	20
VII	0,9	15	1,5	20
VIII	0,9	15	1,4	17
IX	1,0	12	1,6	20
X	1,1	14	2,1	20

Месяц	Станция Глубинное		Станция Мельничное	
	Средняя месячная	Максимальная	Средняя месячная	Максимальная
XI	1,1	15	2,5	20
XII	0,8	14	2,3	20
Год	1,1	20	2,2	20

Таблица 15. Сезонное изменение количества дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное значение

Месяц	Станция Глубинное		Станция Мельничное	
	Больше 8 м/с ⁻¹	Больше 15 м/с ⁻¹	Больше 8 м/с ⁻¹	Больше 15 м/с ⁻¹
I	0,6	0,1	6,9	1,0
II	1,1	0,2	7,5	1,7
III	2,1	0,1	7,5	1,6
IV	2,4	0,04	7,0	1,7
V	2,2	0,04	5,2	1,9
VI	0,2	0,04	1,5	0,3
VII	0,2	0,5	0,8	0,2
VIII	0,1	–	1,0	0,1
IX	1,0	–	2,9	0,6
X	1,0	–	5,4	1,1
XI	1,6	–	6,8	1,4
XII	0,9	–	6,7	1,1
Год	13	–	59	13

Особенности годового хода облачности, обусловленные сезонной сменой атмосферной циркуляции, прослеживаются при анализе ее среднемесячных показателей (табл. 16). Величины последних (по нижней и общей облачности) плавно возрастают от января к августу (соответственно от 1,6–4,9 до 5,6–7,9 баллов) и затем плавно снижаются в обратном направлении.

Среднегодовой показатель нижней облачности в районе составляет 3,6–3,7 баллов, а по общей равняется 6,3–6,4 (Научно-прикладной..., 1988). Ниже приводится краткая характеристика атмосферных явлений.

Туманы в рассматриваемом районе обычно радиационные и реже смешанные, а из их разновидностей – испарения, орографические и ледяные. Распределение связано, прежде всего, с контрастностью физико-географических обстановок. Они встречаются практически во все месяцы, испытывая заметные отличия в повторяемости по территории и по сезонам. Наиболее часто отмечаются туманы орографические и испарения в теплый период года (в среднем от 3 до 17 дней с туманами в месяц), с ярко выраженным максимумом в августе и сентябре. Намного реже туманы возникают в зимнее время, относимые к ледяным (в среднем, от 0,1 до 2 дней с туманом в месяц). Средняя продолжительность туманов равна 5–6 ч.

Таблица 16. Сезонные колебания нижней и общей облачности, баллы

Месяц	Станция Глубинное		Станция Мельничное	
	Общая	Нижняя	Общая	Нижняя
I	4,9	1,6	4,6	1,7
II	4,9	1,7	4,8	2,0
III	5,6	2,7	5,6	2,8
IV	6,9	3,6	6,7	3,5
V	7,4	4,0	7,4	4,1
VI	7,6	4,8	7,8	5,0
VII	7,8	5,2	7,9	5,3
VIII	7,9	5,6	7,9	5,7
IX	7,4	5,4	7,1	5,4
X	5,7	3,6	5,3	3,4
XI	5,3	2,9	5,0	3,1
XII	5,4	2,2	4,9	2,5
Год	6,4	3,6	6,3	3,7

Метели, возникающие во время сильных ветров, на протяжении всего холодного периода отмечаются ежемесячно. Число дней с метелью составляет 2–5 (максимум в феврале). Средняя продолжительность метелей составляет 4–7 ч. Как исключение редкие метели могут быть в конце октября и в начале апреля.

Грозы в районе регистрируются на протяжении всего теплого периода, наиболее часто в июне и июле (Научно-прикладной..., 1988). В эти месяцы отмечается по 6–7 дней с грозой. Их средняя продолжительность составляет 1,6–1,7 ч (максимальная 12 ч) В табл. 17 наибольшее число дней с явлениями во всех графах выбрано путем простой выборки, т.е. по разным годам из рядов наблюдений за период 1936–1980 гг. (града – 1891–1980 гг.).

Таблица 17. Динамика сезонных проявлений атмосферных явлений, количество дней

Месяц	Туман		Гроза		Метель		Град		Обледенение	
	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное
Станция Глубинное										
I	0,4	6	0	0	1	5	0	0	0	0
II	0,1	1	0	0	2	6	0	0	0,03	1
III	0,4	3	0	0	2	7	0	0	0,3	5
IV	3	8	0,4	2	0,4	2	0,1	1	0,08	1
V	5	10	2	8	0	0	0,6	3	0	0
VI	9	15	7	11	0	0	0,4	3	0	0
VII	10	19	6	10	0	0	0,02	1	0	0
VIII	13	20	4	10	0	0	0	0	0	0

Месяц	Туман		Гроза		Метель		Град		Обледенение	
	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное
IX	14	21	2	7	0	0	0,2	2	0,03	1
X	5	10	0,3	2	0,03	1	0,1	2	0,1	2
XI	0,7	3	0	0	0,8	5	0,02	1	0,05	1
XII	0,3	4	0	0	2	6	0	0	0	0
X–III	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0
IV–IX	54	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Год	61	83	22	33	8	18	1,4	4	0,6	6
Станция Мельничное										
I	0,3	3	0	0	4	11	0	0	0,1	4
II	0,1	1	0	0	5	11	0	0	0,2	3
III	0,4	3	0	0	4	10	0	0	2	9
IV	3	7	0,09	1	0,6	3	0,07	1	0,6	5
V	7	13	2	8	0	0	0,5	3	0	0
VI	12	17	7	14	0	0	0,3	2	0	0
VII	12	19	6	12	0	0	0,05	1	0	0
VIII	16	23	4	9	0		0,1	2	0	0
IX	17	23	2	5	0	0	0,02	1	0,02	1
X	6	14	0,5	3	0,2	2	0	0	0,4	4
XI	2	7	0	0	2	9	0	0	2	10
XII	0,7	4	0	0	4	10	0	0	0,8	7
X–III	10	23	0	0	0	0	0	0	0	0
IV–IX	67	88	0	0	0	0	0	0	0	0
Год	77	97	22	35	20	35	1,0	4	6	22

Град на территории выпадает редко, до нескольких раз в десятилетие, обычно в теплый период, кроме августа. При этом может регистрироваться в мае–июне (0,4–0,6), реже – в апреле и октябре (0,1). В отдельные годы это явление отмечалось в ноябре.

Обледенения в районе развиваются редко, продолжаются 0,1–0,4 дня, в марте до двух дней. Эти явления чаще наблюдаются в переходные сезоны, но возможны зимой в оттепель.

Совмещенные графики годового хода среднемесячных характеристик основных метеозаэментов (температуры воздуха, атмосферных осадков, ветра) вскрывают структуру климата и представляют собой своеобразные «климатограммы» (рис. 2). Их анализ позволяет выявить основные специфические черты климата.

Характер соотношения тепла и влаги на конкретном ветровом фоне в национальном парке отличается следующими пространственно-временными чертами общности и различия:




Рис. 2. Совмещенный график годового хода среднемесячных характеристик основных метеозаэментов (Т – температура воздуха, R – атмосферные осадки, V – скорость ветра)

а) для всей территории парка характерна общая плавность выпуклых кривых годового хода среднемесячных значений температуры воздуха и выпадающих атмосферных осадков (минимумы зимой, максимумы летом), отличается от которых выпукло-вогнутая кривая годового хода среднемесячных скоростей ветра (1 минимум в августе и 2 максимума в марте и ноябре). Экстремальные отметки на всех этих кривых в общем временном плане близки или совпадают;

б) наименьшие среднемесячные значения температуры и атмосферных осадков и наибольшие среднемесячные скорости ветра по времени своего наступления сдвинуты относительно друг друга на 1 месяц (соответственно 22,9 °С в январе; 12 мм в январе и феврале; 2,7 м/с⁻¹ в марте);

в) четко прослеживается почти полное совпадение наибольших значений среднемесячных температур воздуха (19,2 °С) и среднемесячных показателей наибольшего количества осадков (130 мм) с наименьшими величинами среднемесячных скоростей ветра (1,4 м/с⁻¹);

г) большая часть среднемесячных температур воздуха лежит выше уровня 0 °С, что указывает на преобладание в районе теплого периода;

д) амплитуды среднемесячных температур воздуха в переходные сезоны достаточно велики (10–12 °С), что подчеркивает континентальный характер климата;

е) отклонения средних максимальных и минимальных температур воздуха от его среднемесячных температур отличаются различной симметричностью в различные сезоны;

ж) преобладающее количество атмосферных осадков (624 из 721 мм) приходится на теплый период, но на фоне общего плавного повышения и дальнейшего понижения их максимум сдвинут на вторую половину лета (в августе – 130 мм);

з) распределение среднемесячных скоростей ветра в годовом ходе отличается двумя слабо выраженными максимумами (в марте и ноябре) и достаточно четким минимумом (в августе), хотя перепады между ними и невелики (около 2 м/с⁻¹, равные среднегодовым скоростям ветра).

Таким образом, на основании анализа представленных материалов климат национального парка можно охарактеризовать как континентальный с муссонными чертами.

ЛАНДШАФТЫ

Территория национального парка целиком расположена в пределах Западно-Сихотэ-Алинской провинции Приморской ландшафтно-географической страны. Особенности ее ландшафтов определяются положением на пологом склоне асимметричной морфоструктуры Сихотэ-Алиня. Реки данной территории отличаются выположенностью продольных профилей, умеренным эрозионным врезом (до 400–500 м) и значительной шириной днищ долин. В обрамлении магистральных долин наблюдаются хорошо выраженные уровни придолинного террасового рельефа с переходом в останцево-педиментный выше по склонам. От днищ долин к водоразделам в зависимости от порядка водотоков выделяются последовательно меняющиеся друг друга морфотипы рельефа – мелкогорье, низкогорье и среднегорье. В верхнем поясе каждого из морфотипов отмечается развитие выположенного рельефа с площадными и линейными корами выветривания, мощным чехлом склоновых отложений. Их структура меняется, в зависимости от крутизны склонов и состава подстилающих пород, от щебнистых суглинков до супесей суглинков и тяжелых глин. Речные долины парка отличаются повышенными мощностями четвертичных отложений, которые контролируются уклонами водотоков.

В зоне среднегорья в долинах рек IV–V порядков мощность аллювия, вскрываемого в днищах долин и имеющего в основном позднечетвертичный возраст, составляет 10–15 м. Для малых водосборных бассейнов, дренирующих обрамление магистральных долин в их среднем течении, характерна сильная заболоченность. Развитие долинных ландшафтов происходит в условиях расширения зоны аккумуляции вверх по речным долинам, о чем свидетельствуют повышение мощности аллювия и широкое распространение фурационной многоостровной поймы. На ослабление эрозионных процессов в руслах разнопорядковых рек рассматриваемой территории указывают большая ширина высокой поймы и «луговой» террасы, активная аккумуляция в руслах рек и на пойме.

Многообразие генотипов и форм рельефа определяет сложную структуру ландшафтов, отвечающую хорошо выраженной вертикальной поясности. Возникновение своеобразных лесных ландшафтов в верхнем поясе гор, где наблюдается преобладание обширных по площади выровненных водоразделов, определяется более высоким положением верхней границы леса, чем отмечено на сопредельном восточном склоне Сихотэ-Алиня (эффект «массивности гор»). Выделение ландшафтов на уровне местностей или групп урочищ производится с учетом определяющей роли рельефно-субстратной основы в формировании их структуры. Выделенные ландшафты представлены на приведенной ниже схеме (рис. 3).

I группа: ландшафты верхнего уровня рельефа (вершиннопоясовые), имеющие неодинаковую структуру и биотическую нагрузку в пределах различных вертикально-ландшафтных поясов и морфотипов рельефа. Высотные интервалы




Рис. 3. Ландшафтная схема национального парка «Удэгейская легенда»

этой группы ландшафтов на территории проектируемого парка меняются в пределах от 600–700 до 1200–1300 м. Среди них выделяются 3 типа ландшафтов:

I-1 – ландшафты верхнего уровня среднегорья (символ 1) – на высотах свыше 1100–1200 м связаны с уплощенными поверхностями отдельных останцовых массивов. Развиты в данном районе локально (г. Арму – 1300 м, г. Крутогорка – 1145 м). Для этих ландшафтов характерно ступенчатое строение рельефа с различными мезо- и микроформами. Основу субстрата образуют глыбово-щелнистые древние отмершие «каменные моря» с площадными сапролитами и линейными корами выветривания на гранитах с горными буротаежными и аллювиально-гумусовыми почвами под пихтово-еловыми зеленомошными лесами;

I-2 – ландшафты уплощенных и шатровых водоразделов (символ 2) широко распространены на данной территории. Они образуют два высотных уровня: в интервале абсолютных высот 900–1000 и 600–800 м. Эти уровни разделены ступенью с умеренно пологими и на отдельных участках крутыми склонами. По морфологии рельефа ландшафты этого типа представляют собой слабоволнистые и ступенчатые поверхности с небольшими перепадами относительных высот. В их пределах наблюдаются отдельные уплощенные останцовые вершины с относительной высотой до 120–150 м. Мягкий пологосклонный рельеф соответствует умеренному вертикальному расчленению. Достаточно четко различается субстратная основа на разных типах геолитокомплексов: на гранитах – щелнисто-глыбово-аркозовый субстрат с сапролитами и умеренно выветрелыми разностями в основании, мелкощелнисто-суглинистые и суглинисто-щелнистые накопления на осадочных породах. Для этого типа рельефа характерно различное положение уровня

грунтовых вод с выходом их на склонах и в седловинах. Почвы представлены горно-буротаежными и иллювиально-гумусовыми типами под елово-пихтовыми зеленомошными и папоротниковыми лесами и горнолесными бурыми под елово-кедрово-широколиственной растительностью. На нижней ступени (в интервале высот 600–800 м) распространены бурые горнолесные оподзоленные почвы под кедрово-широколиственным лесом;

I-3 – ландшафты гребневидных водоразделов с глубоким вертикальным расчленением и крутосклонным рельефом имеют в пределах данной территории незначительное распространение (символ 3) – в основном в обрамлении Арминского массива. Эти поверхности на высотах свыше 1000 м перекрыты щебнисто-глыбовыми накоплениями с бурыми горнолесными почвами под еловым лесом с элементами ширококолиственной растительности (на склонах южной и восточной экспозиций).

II группа: склоновые ландшафты. Заранее оговоримся, что проведение четких границ между вершинно-поясовыми и склоновыми ландшафтами в условиях умеренно-полого-склонного рельефа затруднительно. Среди них на данной территории выделяются преобладающие по площади два типа ландшафтов:

II-1 (символ 4) – ландшафты умеренно крутых, умеренно пологих и пологих склонов. Обычно они представлены поверхностями с закрытыми щебнисто-глыбовыми (редко) и щебнистыми (преобладают) накоплениями и с заполнителем в зависимости от типа горных пород от глинистых супесей до тяжелых суглинков. На них развиты елово-пихтовые зеленомошные (на высотах свыше 800 м) и кедрово-елово-широколиственные леса на горно-таежных иллювиально-гумусовых, горно-лесных и горно-лесных бурых оподзоленных почвах;

II-2 (символ 5) – ландшафты придолинных уплощенных водоразделов с различной системой склоновых поверхностей, характерных для холмисто-увалистого и останцево-педиментного морфотипов рельефа, образующего уровень с относительной высотой от 120–150 до 300–400 м над днищами разных долин. Для этих ландшафтов характерен ослабленный дренаж (особенно на осадочных породах), с чем связано формирование бурых глеевых почв под кедрово-широколиственными с обильным участием мелколиственных пород. На склонах западной и северной экспозиций отмечается развитие елово-пихтовых зеленомошных лесов с участием широколиственных пород;

II-3 (символ 7) – ландшафты высоких речных террас, придолинных шлейфов и древних конусов выноса, представляющих собой ступенчато-наклонные равнины по бортам магистральных долин, ограниченные на отдельных участках эрозионными уступами. Для этих ландшафтов характерно разнообразие литокомплексов, меняющихся от щебнисто-глинистых покровов (на наиболее древних террасах) до валунно-галечно-глинистых и глинисто-песчаных накоплений на более низких поверхностях. Разнообразие литокомплексов и режимов обводнения отвечают бурые лесистые, бурые лесные оподзоленные, бурые лесные дерново-иллювиальные почвы под дубово-широколиственными лесами (в их составе обычно представлена осина).

III группа: ландшафты водосборных воронок (цирков) и малых долин (выдел 8). Они характерны для верховий всех водотоков (независимо от порядка) и наблюдаются в пределах всех морфотипов рельефа. Малые долины чаще встречаются на бортах магистральных рек. В зависимости от морфологии рельефа, степени вертикального и горизонтального расчленения, величины гипсометрических градиентов рельефа и типов геоморфологических процессов в прошлом и характера литокомплексов выделяются следующие разновидности ландшафтов водосборных воронок и малых долин:

III-1 – ландшафты водосборных воронок в истоках горных рек среднегорья с относительно узким днищем и умеренно-крутыми прямыми и регрессионно-вогнутыми склонами с глинисто-щебнистым покровом на склонах и глыбово-щебнистым в днищах. Растительность представлена елово-пихтовыми зеленомошными и еловыми лесами с травяным покровом на бурых горнолесных и бурых лесных глеевых почвах;

III-2 – ландшафты водосборных воронок на высотах менее 1000 м с широкими днищами и умеренно-крутыми ступенчатыми склонами с суглинисто-щебнистым и щебнисто-глинистым покровом с локально заболоченными днищами и сухими склонами с елово-пихтовым, кедрово-еловым и мелколиственным лесом на горнолесных бурых оподзоленных, глеевых и дерново-иллювиальных почвах;

III-3 – ландшафты водосборных воронок и днищ долин в обрамлении магистральных долин с чехлом суглинисто-щебнистых переувлажненных отложений с бурыми лесными оподзоленными, темнобурными гумусированными лугово-болотными почвами под елово-широколиственными и пихтово-еловыми и мелколиственными лесами, болотами, луговинами и кустарниковыми пустошами.

IV группа – ландшафты днищ речных долин (символ 9), представлены несколькими разновидностями:

IV-1 – ландшафты прирусловых отмелей и поймы на разнообразных грунтах (валуны и гальки, с песком, глины, суглинки, супеси) и зачаточных почвах на наиболее низких элементах рельефа, подвергающихся регулярному затоплению в паводки. Растительность представлена ивняками, чозенниками с тополем, древесно-кустарниковыми ассоциациями с преобладанием ольхи и участием широколиственных пород. Характерные элементы этих ландшафтов – высокотравные луга, низинные болота и озера;

IV-2 – ландшафты «луговой» террасы с дерново-аллювиальными, аллювиально-болотными, лугово-бурными оподзоленными почвами на глинистых, супесчаных и песчаных грунтах под долинными елово-кедровыми, елово-пихтовыми (на высотах свыше 600 м), кедрово-елово-широколиственными лесами с участками ерниковых зарослей, травяно-моховых и осоковых болот, эпизодически подвергающихся затоплению в паводки;

IV-3 – ландшафты первой надпойменной террасы и пролювиальных шлейфов на разнообразных грунтах (валунники, галечники, пески, суглинки, глины) с бурыми лесными дерново-аллювиальными, лугово-болотными и болотными почвами

под долинными кедрово-широколиственными, елово-кедровыми, пихтово-еловыми и лиственничными лесами с разнотравно-злаковыми и злаково-осоковыми лугами, низинными и топяными болотами. В зависимости от соотношения эрозии и аккумуляции в русле и на пойме, особенностей гидрологического режима ландшафты днищ долин образуют три типа, соответствующие на схеме символу 9б;

IV-а – ландшафты участков врезания в пределах рассматриваемой территории развиты локально: представлены узкой пойменно-русловой частью и широкой надпойменной террасой;

IV-б – ландшафты на участках транзита наносов с меандрирующим руслом, сегментной поймой, обширной луговой и первой надпойменной террасами (перстративный тип);

IV-в – ландшафты на участках аккумуляции с многорукавным руслом, фурационной поймой и островной луговой террасой, старицами и старичными озерами, обширными низинными и топяными болотами в краевых частях долин.

ПОЧВЫ

Согласно почвенно-географическому районированию, территория национального парка «Удэгейская легенда» относится к Восточной буроземно-лесной области буроземов и подбелов хвойно-широколиственных и широколиственных лесов суббореального пояса; фация умеренно промерзающих почв (Добровольский и др., 2011). Рельеф территории парка разнообразен, представлен преимущественно низкогорьем и средневысотными горами. Значительные перепады высот от 200 м над уровнем моря в долине р. Большая Уссурка до наиболее высоких вершин 1330 м – г. Арму определяют наличие вертикальной высотной поясности растительности и почвенного покрова. По типу структур вертикальной поясности горная часть парка расположена в пределах Южно-Сихотэ-Алинской горной провинции (Добровольский и др., 2011). Структура почвенного покрова представляет собой сложные почвенные комбинации, которые тесно связаны с изменениями в растительности, орографии местности и с разнообразием почвообразующих пород. Выровненные участки на территории занимают небольшие площади и представляют собой эрозионно-аккумулятивные террасы речных долин.

Кедрово-широколиственные леса являются преобладающей лесной формацией на территории парка, поэтому изучение особенностей их химического состава являлось главной целью наших исследований. Под этими лесами, согласно классификации Г.И. Иванова (1976), наиболее распространенными типами почв являются горнолесные бурые и горно-таежные иллювиально-гумусовые. Горнолесные бурые почвы формируются под хвойно-широколиственными лесами и распространены на низкогорно-увалистом рельефе до высоты 800–900 м над уровнем моря. Согласно последней классификации почв России (Классификация и диагностика почв..., 2004; Полевой определитель..., 2008), их можно отнести к разным вариантам буроземов.

В пределах территории национального парка процессы почвообразования в прошлые эпохи и в настоящее время связаны с гранулометрическим и минералогическим составом подстилающих горных пород и продуктов их выветривания, которое происходило под воздействием климатических факторов и растительности. Литогенная основа сложена вулканическими (граниты, андезиты, диориты и т.п.) и осадочными (песчаники, алевролиты, сланцы) породами. Характерной особенностью почв является почти повсеместная их щебнистость, способствующая переводу поверхностного стока во внутренний.

Для получения характеристики почвенного покрова был заложен ряд разрезов в наиболее характерных для национального парка растительных сообществах. Морфологическое описание разрезов было проведено по традиционной методике (Розанов, 1983). Влажность почв определялась термовесовым способом, плотность сложения почвы и плотность сложения твердой массы – по стандартным методам для почвенных исследований (Александрова, Найденова, 1976; Вадюнина, Корчагина, 1986; Растворова, 1983). Установление гидрофизических и воздушно-

физических параметров свойств почв проводили по общепринятым методикам (Агрофизические методы..., 1966), оценивая по составленным шкалам для почв Приморья (Ознобихин и др., 1994). Элементный состав почвенных образцов и подстилки (валовой анализ почв) проводили методом энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа в формате количественного анализа в вакуумной среде с использованием государственных стандартных образцов сравнения. Данные, полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа, сравнивались с установленными кларками для почв мира по А.П. Виноградову (1957), А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас (1989) и А. Kabata-Pendias (2011).

Подсчет кларков концентрации (K_k) и рассеяния (K_r) проводили по формуле $K_k = C_i/K$ и $K_r = K/C_i$, где C_i – содержание элемента в почве, K – кларк педосферы (среднее содержание элемента в почвах мира). С помощью кларков концентрации и рассеяния были выделены геохимические ассоциации.

Почвы горных хвойно-широколиственных лесов

Субформация: кедрово-еловые леса. Кедрово-елово-тисовый лес с лиственными породами. Пробная площадь 1-2014. Разрез 1-2014Р заложен в зоне перехода от узкой надпойменной террасы ручья к склону (левый берег ключа Ковалевский; 45°47.180'с.ш., 135°19.353' в.д., высота над уровнем моря – 293 м) в реликтовом кедрово-елово-тисовом лесу с лиственными породами (Сибирина и др., 2015).

Поверхность слабо покатая, микрорельеф бугристо-ямчатый. Напочвенный покров: папоротники, таёжное мелкотравье.

О 0–2 см. Слаборазложившаяся подстилка с поверхности из листьев, остатков травянистых растений, хвои, веточек; хорошо разложившаяся в нижней части. Бурая, рыхлая, свежая.

АУ2–19 см. Серо-бурый, среднесуглинистый, хорошо оструктуренный, комковатый, в нижней части – порошисто-комковатый, слабо уплотнен, густо переплетен корнями, свежий, единично камни, переход ровный, ясный.

ВМ 19–51 см. Серо-бурый, светлее предыдущего, влажный, тяжелосуглинистый, сильнокаменистый, мелкозем между камнями, корни единично, плотный, переход постепенный.

ВС 51–60 см. Бурый, влажный, мелкозем между крупными обломками породы, тяжелосуглинистый.

Почва – бурозем типичный ненасыщенный со среднеразвитым профилем; слабоскелетный в верхней и сильноскелетный в нижней части профиля, на аллюво-делювии зеленовато-серого песчаника мелкозернистого и алевролитов от темно-серых до черных.

При детальном анализе морфологического строения почвенного профиля отмечается высокая каменистость в иллювиальной части. Образующийся при выветривании каменисто-суглинистый субстрат обладает высокой водопроницаемостью и обеспечивает свободный внутренний дренаж и наличие крупных воздушных пор. Основная масса корней древесной и травяно-кустарниковой растительности сконцентрирована в верхней 30-см толще. В нижней части гумусового горизонта

встречаются мелкие древесные угольки, что свидетельствует о том, что на данной территории когда-то были пожары.

Актальная кислотность исследуемой почвы по генетическим горизонтам имеет следующие показатели: подстилка – 5,19; наиболее кислый гумусовый горизонт – 3,92; иллювиальные горизонты – 4,22.

Наиболее важными показателями физических свойств почв являются плотность сложения, плотность твердой фазы почвы, структура и порозность. На внутрипрофильный характер изменения плотности влияет дифференциация почвенного профиля на органогенную и минеральную части.

Плотность сложения почвы, или объемная масса (ОМ), изменяется вниз по профилю (табл. 18). Наименьшие показатели плотности сложения почвы, или удельная масса (УМ), характерны для верхних генетических горизонтов, где сосредоточена основная масса корней и отмечено высокое содержание гумусовых веществ. Вниз по профилю плотность сложения почвы увеличивается. Верхнюю часть почвенного профиля можно охарактеризовать как чрезмерно рыхлую (Оздобихин и др., 1994).

Таблица 18. Физические свойства бурозема типичного под кедрово-елово-тисовым лесом

Горизонт, глубина отбора, см	ЕВ, % от массы	ОМ, г см ⁻³	УМ, г см ⁻³	МВО, % от массы	ДАВ, % от массы
АУ5–10	128,91	0,36	2,14	74,79	112,56
АУ10–15	94,38	0,40	2,20	86,22	82,83
ВМ 25–30	67,05	0,53	2,27	64,68	58,90
ВМ 30–45	52,07	0,59	2,32	63,00	47,95
ВС 55–60	31,61	–	2,61	–	–

Примечание. Здесь и далее: ЕВ – естественная влажность; ОМ – плотность сложения почвы; УМ – плотность твердой фазы почвы; МВО – максимальная водоотдача; ДАВ – диапазон активной влаги.

В почве под естественным растительным покровом кедрово-елово-тисового леса плотность твердой фазы изменяется от 2,14 до 2,61 г см⁻³. Минимальные значения показателей плотности твердой фазы характерны для верхних генетических горизонтов, что связано с высоким содержанием органических веществ в них по сравнению с иллювиальными горизонтами. Влажность почвы равномерно уменьшается с глубиной. Гумусовый горизонт в лесных почвах имеет более высокую влажность, чем иллювиальные горизонты. Это связано с лучшим структурным состоянием гумусового горизонта по сравнению с нижележащими горизонтами и, очевидно, с конденсационным увлажнением подстилки и верхнего слоя почвы под пологом леса. Показатель максимальной водоотдачи (МВО) указывает на количество воды, которое может стечь при наличии свободного стока; как правило, уменьшается вниз по профилю. Диапазон активной влаги (ДАВ) свидетельствует о количестве доступной для растений влаги: чем шире диапазон данного показателя, тем лучше условия водоснабжения для растительности.

Почвенно-гидрологические константы являются показателями, позволяющими характеризовать наличие различных форм почвенной влаги. Переходя из одного состояния в другое, вода приобретает особые свойства. Механизмы передвижения влаги в почве напрямую связаны с плотностью сложения почвы. Значения плотности и характер увлажнения почвы являются взаимообусловленными процессами. В зависимости от водного режима происходит непрерывное изменение влажности из-за перемещения воды во времени и диаметрально противоположных направлениях. В природных условиях почва проходит все стадии влагоёмкости от максимальной гигроскопичной до полной, превысив которую капельножидкая вода под действием силы тяжести стекает вниз. Характер распределения разных категорий влаги в почвенном профиле представлен в табл. 19.

Таблица 19. Гидрологические свойства бурозема типичного под кедрово-елово-тисовым лесом

Показатель	Горизонт, глубина отбора, см			
	АУ5–10	АУ10–15	ВМ 25–30	ВМ 30–45
% от сухой массы				
ПВ	210,68	188,30	137,22	122,18
КВ	172,82	136,99	94,92	75,63
НВ	135,89	102,08	72,54	59,18
ВРК	94,50	71,45	50,78	41,42
ВЗ	23,33	19,03	13,63	11,23
МГ	15,56	12,67	9,09	7,49
% от объема				
КВ	62,21	54,80	49,36	44,62
НВ	48,92	40,83	39,28	34,92
ВРК	34,02	28,58	26,40	24,44
ВЗ	8,40	7,61	7,23	6,63
МГ	5,60	5,07	4,82	4,42

Примечание. Здесь и далее ПВ – полная влагоёмкость; КВ – капиллярная влагоёмкость; НВ – наименьшая влагоёмкость; ВРК – влажность разрыва капиллярной каймы; ВЗ – влажность увядания растений; МГ – максимальная гигроскопичность.

При исследовании водных свойств почв необходима оценка критических значений влажности, при которых происходит изменение функционального состояния горизонтов почвенного профиля. Показатели максимальной гигроскопичности (МГ) характеризуют максимальное количество влаги, поглощенное почвой при полном насыщении воздуха водяными парами. С величиной МГ тесным образом связан показатель, характеризующий влажность завядания растений (ВЗ). Считается, что величина максимальной гигроскопичности, умноженная на 1,5, соответствует коэффициенту завядания растений и характеризует нижнюю границу продуктивной для растений влаги. Полная влагоёмкость (ПВ), или влагоемкость, характеризует общее количество влаги, которое вмещается в поровом

пространстве почвы. Корневые системы большинства древесных пород, особенно хвойных, находят оптимальные условия водоснабжения и дыхания в условиях диапазона легкоподвижной и легкодоступной влаги (КВ-НВ). В данном диапазоне в пространстве между почвенными частицами, кроме воды, имеется достаточное количество пор, заполненных воздухом.

Общая порозность ($P_{\text{общ}}$) меняется с глубиной соответственно изменению плотности сложения почвы в профиле; с увеличением плотности почвы уменьшается общая порозность генетических горизонтов с глубиной (табл. 20). Рассматриваемую почву можно оценить как избыточно пористую ($> 70\%$). Порозность аэрации – величина динамическая, связанная с изменением влажности. Это постоянно дополняющие друг друга величины. Для сравнения почв по их воздушным свойствам, в частности по способности к аэрации, используют характерные значения влагоемкости. Как правило, этот анализ проводят при влажности, соответствующей наименьшей влагоемкости (НВ), или при влажности почвы в период исследования (ЕВ). При высокой порозности аэрации, когда она составляет более половины общей порозности, показатель заземленного воздуха не превышает 7,5%.

Таблица 20. Показатели воздухоудержания в буроземе типичном под кедрово-елово-тисовым лесом, %

Горизонт, глубина отбора, см	$P_{\text{общ}}$	$P_{\text{аэр}}$	$P_{\text{зв}}$	Воздухоудержание при			
				$P_{\text{ЕВ}}$	$P_{\text{КВ}}$	$P_{\text{НВ}}$	$P_{\text{ВРК}}$
АУ5–10	83,17	48,92	7,33	36,76	20,96	34,25	49,15
АУ10–15	81,81	40,73	6,49	44,06	27,01	40,98	53,23
ВМ 25–30	76,65	39,28	5,40	41,11	27,29	37,37	50,35
ВМ 30–45	74,56	34,92	2,48	43,84	29,94	39,64	50,12

Примечание. Здесь и далее: $P_{\text{общ}}$ – порозность общая; $P_{\text{аэр}}$ – порозность аэрации; $P_{\text{зв}}$ – заземленный воздух; $P_{\text{НВ}}$ – порозность при наименьшей влагоемкости; $P_{\text{ЕВ}}$ – порозность при естественной влагоемкости; $P_{\text{КВ}}$ – порозность при капиллярной влагоемкости; $P_{\text{ВРК}}$ – порозность при влажности разрыва капиллярной каймы.

Экологические условия почв зависят не только от уплотнения, но и от соотношения слагающих ее фаз. В почве наблюдается преобладание объемов, занимаемых воздухоудерживающими порами, что свидетельствует о достаточно хорошей аэрированности всего почвенного профиля. Соотношения объемов разных фаз, составляющих почву, представлены в табл. 21.

Валовой химический состав почв дает представление об общем содержании отдельных оксидов и их распределении по профилю. Отмечается относительно ровное распределение оксидов кремния, серы, калия и титана (табл. 22). Для оксидов железа, алюминия и марганца характерно иллювиирование в горизонте ВМ. В нижней части профиля увеличивается содержание MgO . Подстилка по сравнению с органоминеральными горизонтами обогащена CaO , MnO , SO_2 и P_2O_5 вследствие биогенной аккумуляции.

Таблица 21. Соотношение объемов фаз в буроземе типичном под кедрово-елово-тисовым лесом

Горизонт, глубина отбора, см	Твердая	Жидкая	Газообразная
AY5–10	16,83	46,40	36,77
AY10–15	18,19	35,91	45,90
BM 25–30	23,35	34,86	41,79
BM 30–45	25,44	30,72	43,84

Таблица 22. Валовой химический состав бурозема типичного под кедрово-елово-тисовым лесом, % на сухое вещество

Элемент	Горизонт, глубина, см			
	O* 0–2	AY2–19	BM 19–51	BC 51–60
SiO ₂	13,957	60,666	60,391	63,003
Fe ₂ O ₃	1,095	3,988	5,750	5,310
Al ₂ O ₃	0,349	10,215	13,378	13,140
TiO ₂	0,179	0,989	1,024	1,040
MnO	0,244	0,060	0,085	0,082
CaO	8,142	1,035	0,663	0,633
MgO	0,328	0,655	0,861	0,914
P ₂ O ₅	1,174	0,476	0,346	0,234
K ₂ O	1,113	2,276	2,432	2,485
Na ₂ O	0,536	0,862	0,834	0,828
SO ₂	0,117	0,092	0,095	0,087

* Здесь и далее данные в подстилке приведены на золу.

Микроэлементы в количественном отношении составляют малую долю в составе почвы, но они играют важную роль в обеспечении ее плодородия. Хотя микроэлементы в основном наследуются от материнских пород, их распределение в почвенном профиле и между компонентами почвы отражает действие различных почвообразующих процессов и внешних факторов. Микроэлементы неодинаково распределяются по профилю в разных типах почв. Их перемещение в почве происходит в результате поглощения корнями растений или почвенными водами. Захваченные растительностью элементы затем возвращаются с продуктами опада. Продукты опада лесной растительности скапливаются на поверхности почвы, образуя лесную подстилку. В отличие от опада, который сохраняет определенное время первоначальную форму отмерших частей растений, подстилка состоит из органоминеральных веществ разной степени разложения и минерализации. Содержание микроэлементов в подстилке зависит от среднего химического состава преобладающей растительности, скорости разложения и трансформации отмершего растительного вещества. В ней сохраняются и часто еще больше концентрируются микроэлементы и тяжелые металлы.

Известно, что многие микроэлементы жизненно необходимы растениям, они оказывают стимулирующее действие на их рост и развитие, являются необходимыми компонентами биокатализаторов и биорегуляторов физиологических процессов. С превышением определенного уровня накопления в почвах (ПДК) они оказывают угнетающее и в некоторых случаях токсичное воздействие на растения. Оценка токсичных концентраций очень сложна и зависит от множества факторов, например, таких, как состав и свойства почвообразующих пород, реакции среды, увлажнение, периодическое промерзание и оттаивание, и др.

В районе исследования роль антропогенного фактора в накоплении микроэлементов сведена к минимуму (Гладкова и др., 1993). Содержание микроэлементов в почве главным образом обусловлено химическим составом почвообразующих пород.

Щелочные металлы 1-й группы¹ представлены рубидием (Rb), литием (Li) и цезием (Cs). Эти элементы легко вступают в химические реакции в кислой окислительной среде, легко высвобождаются из первичных минералов при выветривании.

Содержание рубидия в почвах наследуется в основном от материнских пород. Самые высокие значения Rb наблюдаются в почвах, развитых на гранитах, гнейсах и на аллювиальных отложениях. Среднее содержание рубидия в бурых лесных почвах составляет 110 мг кг⁻¹ (Ковда, Васильевская, 1958), эти цифры совпадают с данными, полученными П.В. Ивашовым (1993) для бурых лесных и горно-бурых лесных почв Приамурья. Рубидий распределяется равномерно по всему почвенному профилю (среднее количество 133,3 мг кг⁻¹); в подстилке содержится 40 мг кг⁻¹ Rb (табл. 23).

Концентрация лития в исследуемой почве ниже чувствительности прибора; цезий не обнаружен.

Щелочноземельные металлы 2-й группы включают бериллий (Be), барий (Ba) и стронций (Sr). Концентрация бериллия в исследуемой почве ниже чувствительности прибора.

Барий в земной коре концентрируется в средних и кислых магматических породах – 400–1200 мг кг⁻¹. В почвах мира содержание Ba составляет 19–2386 мг кг⁻¹ (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). В исследуемой почве барий равномерно распределен по всему профилю, в золе подстилки его концентрация более чем в два раза ниже.

Содержание стронция в почве почти в 2 раза ниже кларка (среднее содержание химического элемента), установленного для почв мира, – 350 мг кг⁻¹ (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Наименьшее его количество отмечено в структурно-метаморфическом горизонте ВМ – 120 мг кг⁻¹, наибольшее в подстилке – 360 мг кг⁻¹. В целом накопление Sr в почвах контролируется составом материнских пород и климатом. При выветривании особенно в кислой среде захватывается глинисты-

¹ Группы приводятся по длиннопериодной форме Периодической системы химических элементов, утверждённой Международным союзом теоретической и прикладной химии IUPAC.

Таблица 23. Элементный состав бурозема типичного под кедрово-елово-тисовым лесом, мг кг⁻¹ от массы

Элемент	Кларк педосферы, К	Горизонт				Среднее содержание в почве, С _i	Кларк	
		О*	АУ	ВМ	ВС		концентрации, Кк	рассеяния, Кр
Ba	500	270	580	580	590	583,3	1,17	
V	100	20	120	130	140	130	1,30	
Ga	30	10	10	10	10	10		3,00
Y	50	10	30	30	30	30		1,67
La	10	20	30	50	50	43,3	4,33	
Co	8	10	20	20	20	20	2,50	
Cu	20	80	30	10	40	26,7	1,34	
Ni	40	50	10	70	10	30		1,33
Nb	26	10	20	20	20	20		1,30
Rb	68	40	140	130	130	133,3	1,96	
Pb	10	80	50	30	30	36,7	3,67	
S	200	470	370	380	350	366,7	1,83	
Sc	11,7	50	10	10	10	10		1,17
Sr	350	360	160	120	130	136,7		2,56
F	320	350	330	320	320	323,3	1,01	
Cr	200	80	90	90	90	90		2,22
Zn	50	460	130	100	90	106,7	2,13	
Zr	300	100	260	240	нчп**	166,7		1,80

Примечание. К – кларк педосферы (среднее содержание элементов в почвах мира) приводится по А.П. Виноградову (1957), А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас (1989), А. Kabata-Pendias (2011).

* Данные в подстилке, мг кг⁻¹ на золу; **нчп – ниже чувствительности прибора.

ми минералами и связывается органическим веществом. Геохимические и биохимические свойства стронция более близки к свойствам кальция.

Переходные металлы включают такие элементы, как скандий (Sc), иттрий (Y), медь (Cu), цинк (Zn), кобальт (Co), никель (Ni), молибден (Mo), ниобий (Nb), лантан (La), хром (Cr) и др.

Скандий и иттрий относятся к 3-й группе Периодической системы вместе с лантаноидами и актиноидами. Содержание скандия определяется главным образом материнской породой. Кларк Sc в почвах мира – 11,7 мг кг⁻¹ (Kabata-Pendias, 2011). Повышенные концентрации отмечены для почв, развитых на гранитах и вулканических породах. Наименьшие концентрации установлены в легких песчаных почвах. В почвенном профиле бурозема скандий распределен относительно однородно, в среднем 10 мг кг⁻¹, что близко к кларку.

Иттрий – довольно распространенный элемент в земной коре, химически и геохимически близкий к лантаноидам (Перельман, 1989), его содержание в разных типах пород приблизительно одинаковое. Содержание Y в буроземе ниже кларка

(30 мг кг⁻¹ содержится в минеральных горизонтах и 10 мг кг⁻¹ в подстилке), который составляет 50 мг кг⁻¹ (Виноградов, 1957)².

Лантан – редкоземельный элемент из группы лантаноидов. Несмотря на использование современных приборов, данных о природных особенностях распространения лантаноидов мало. Концентрации лантана в разных породах варьирует от 2 до 150 мг кг⁻¹. Сведения по содержанию лантана в почвах малочисленны. Более детально изучалась распространенность лантана в почвах США, где среднее содержание элемента – 47 мг кг⁻¹ (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). В буроземе наблюдается увеличение накопления лантана с глубиной от 30 до 50 мг кг⁻¹; в золе подстилки содержание элемента снижается до 20 мг кг⁻¹.

Четвертую группу Периодической системы представляет цирконий (Zr). В почвах является слабоподвижным элементом. Концентрация Zr в профиле бурозема ниже кларка (100–260 мг кг⁻¹), который составляет 350 мг кг⁻¹ (Виноградов, 1957).

В 5-ю группу входят ванадий (V) и ниобий. Ванадий содержится в количестве 120–140 мг кг⁻¹, что несколько выше значений, приводимых в почвах мира (100 мг кг⁻¹). Концентрация V в золе подстилки невелика – 20 мг кг⁻¹. В земной коре содержится в основных породах и сланцах в количестве 100–200 мг кг⁻¹.

Содержание ниобия в разных типах горных пород лежит в интервале 15–60 мг кг⁻¹ (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Концентрация ниобия в почвенном профиле бурозема не изменяется по горизонтам и составляет 20 мг кг⁻¹, в золе подстилки – 10 мг кг⁻¹.

Шестая группа включает хром и молибден. А.И. Перельман (1989) относит хром к малоподвижным элементам. В геохимических процессах биосферы Cr разновалентен, чаще преобладают трехвалентные соединения. Мигрирует хром в форме взвесей. Содержание хрома в почвах наследуется от материнских пород. Уровни концентрации Cr в разных породах имеют широкий диапазон значений. Среднее содержание хрома в буроземе – 90 мг кг⁻¹, что почти в два раза меньше кларка для почв мира. Содержание элемента в золе подстилки составляет 80 мг кг⁻¹.

Концентрация молибдена в буроземе типичном ниже чувствительности прибора.

Кобальт представляет 9-ю группу Периодической системы, а никель 10-ю. Со накапливается в ультраосновных породах – 100–200 мг кг⁻¹, меньше его в кислых – 1–15 мг кг⁻¹ и осадочных породах – 0,1–20 мг кг⁻¹ (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Содержание Со в почве превышает в 2,5 раза величину мирового кларка – 8 мг кг⁻¹ (Виноградов, 1957) и составляет 20 мг кг⁻¹. Лесная подстилка содержит 10 мг кг⁻¹ кобальта.

Содержание никеля в почвенных горизонтах варьирует от 10 до 70 мг кг⁻¹. Он (Ni) входит в состав первичных минералов и легко выветривается в кислой окислительной среде. Минимальное количество элемента отмечается в гумусовом горизонте, максимальное в иллювиальном горизонте. В переходном к материнской

² Кларки, которые у А.П. Виноградова даются в процентах, нами переведены в мг кг⁻¹.

породе горизонте содержание никеля резко уменьшается. Среднее накопление элемента в почве составляет 47 мг кг^{-1} , что близко к величине кларка – 40 мг кг^{-1} (Виноградов, 1957). В золе подстилки содержится $50 \text{ мг кг}^{-1} \text{Ni}$.

Медь включена в 11-ю группу. Соединения этого элемента образуют большое число минералов, из которых более всего распространены сульфиды. Медь – ярко выраженный биофил. Растения активно поглощают её соединения, а затем возвращают с опадом, способствуя аккумуляции элемента в почве. В исследуемой почве медь по почвенному профилю распределяется неравномерно. Среднее содержание Cu в минеральных горизонтах в полтора раза выше кларка для почв и составляет – 30 мг кг^{-1} . В подстилке аккумулируется до $80 \text{ мг кг}^{-1} \text{Cu}$.

В 12-ю группу входит цинк. Подвижность цинка в почвах контролируют процессы комплексообразования, адсорбции и осаждения. В кислых условиях двухвалентные ионы цинка более подвижны и цинк может выноситься за пределы профиля. Органическое вещество связывает этот элемент в устойчивые формы, вследствие чего наблюдается его аккумуляция в подстилке. Кларк Zn в почвах мира – 50 мг кг^{-1} (Виноградов, 1957). Среднее содержание цинка в поверхностных слоях почв различных стран изменяется в пределах $17\text{--}125 \text{ мг кг}^{-1}$. Эти значения могут рассматриваться как фоновые (Kabata-Pendias, 2011). В России ПДК для Zn составляет 100 мг кг^{-1} (Большаков и др., 2004). В исследуемой почве цинк обнаруживается во всех почвенных горизонтах, его среднее содержание в два раза выше кларка (Виноградов, 1957); в подстилке аккумулируется $460 \text{ мг кг}^{-1} \text{Zn}$.

К 13-й группе Периодической системы и к легким металлам относится галлий (Ga). По всему почвенному профилю наблюдается его низкое содержание – 10 мг кг^{-1} (в 3 раза меньше кларка).

Свинец (Pb) – элемент 14-й группы, относится к постпереходным металлам. Естественное содержание свинца в почвах наследуется от материнских пород. Из-за масштабного загрязнения среды свинцом трудно отделить данные фоновых уровней от данных, связанных с загрязнением. Свинец обнаруживается во всех горизонтах почвенного профиля. Наибольшая его аккумуляция наблюдается в подстилке и гумусовом горизонте, соответственно 80 и 50 мг кг^{-1} . В минеральных горизонтах концентрация снижается до 30 мг кг^{-1} , значительно превышая кларк – 10 мг кг^{-1} (Виноградов, 1957).

Сера (S) – элемент 16-й группы, относится к неметаллам. Важный биоэлемент, который широко распространен в земной коре и биосфере. Встречается в свободном (самородная сера) и связанном виде; входит в состав многих минералов. Сера в почвах находится в двух формах: минеральной и органической. В состав органических соединений входит основная часть почвенной серы. В исследуемой почве количество серы превышает в $1,75\text{--}2,35$ раза средний показатель для почв мира.

Фтор (F) – элемент 17-й группы Периодической системы, который является самым активным химическим неметаллом; галоген, важный биоэлемент. Его больше в кислых изверженных породах – 800 мг кг^{-1} , чем в основных – 370 мг кг^{-1} и особенно ультраосновных – 100 мг кг^{-1} (Перельман, 1989). Содержание фтора в почвах

определяется его содержанием в материнских породах. Среднее содержание F в исследуемой почве – 320 мг кг⁻¹, что соответствует кларку.

Таким образом, вследствие элементарных почвообразовательных процессов в буроземе типичном под кедрово-елово-тисовым лесом происходит перераспределение микроэлементов: накопление в серогумусовом горизонте Rb, F, Zn, Zr и Pb. В минеральных горизонтах наблюдаются равномерное распределение Ga, Ba, Y, Co, Nb, Rb, Sc, F и иллювиирование La и Ni. Наибольшая аккумуляция Zn, Cu, S, Sc, Sr, F и Pb характерна для подстилки.

Ранжирование микроэлементов в почве показало, что одни элементы накапливаются в почвенном профиле, а другие, наоборот, рассеиваются. Расчет кларков концентрации и кларков рассеяния в буроземе типичном (табл. 23) выявил аккумуляцию Zr, La, Pb, Co, Zn, Rb, S, V, Ba и снижение Ga, Sr, Cr, Y, Ni, Nb, Sc; содержание F близко к кларку педосферы.

Ассоциация накапливающихся элементов представлена следующим образом:

La_(4,33) – Pb_(3,67) – Co_(2,50) – Zn_(2,13) – Rb_(1,96) – S_(1,83) – Cu_(1,34) – V_(1,30) – Ba_(1,17).

К рассеивающимся элементам относятся: Sc_(1,17) – Nb_(1,30) – Ni_(1,33) – Y_(1,67) – Zr_(1,80) – Cr_(2,22) – Sr_(2,56) – Ga_(3,00).

Формация: кедрово-широколиственные леса. Кедрово-широколиственный лес с тисом. 07.07. 2016. Разрез 1-2016Р заложен в нижней трети пологого склона (левый берег ключа Ковалевский, 45°78.664' с.ш., 135°32.510' в.д., высота над уровнем моря – 306 м). Поверхность слабопокатая, микрорельеф бугристо-ямчатый, на отдельных участках ровный. В напочвенном покрове в основном папоротники, в подросте – клен, кедр и дуб, кустарники представлены чубушником, свободнойгодником, из лиан повсеместно встречаются лимонник и актинидия.

О 0–2 см. Слаборазложившаяся подстилка – с поверхности из листьев, остатков травянистых растений, хвои, веточек; хорошо разложившаяся в нижней части (труха). Бурая, рыхлая, свежая, корни.

АУ 2–7 см. Темно-бурый, среднесуглинистый, хорошо оструктуренный, комковатый, слабо уплотнен, густо переплетен корнями, свежий.

АУе 7–18 см. Серо-бурый, среднесуглинистый, крупнокомковатый, слабо уплотнен, корни, единично камни, свежий; переход ровный.

ВМ 18–48 см. Желтовато-бурый, легкосуглинистый, комковатый, свежий, уплотнен, корни, в нижней части камни.

ВС 48–60 см. Желтовато-бурый, среднесуглинистый, мелкокомковатый, мелкозем в основном, между острых обломков камней зеленоватого цвета, свежий, корни единично.

Почва – бурозем слабоподзоленный со среднеразвитым профилем; слабоскелетный в верхней и сильноскелетный в нижней части профиля; на песчанике мелкозернистом зеленовато-сером.

При детальном анализе морфологического строения почвенного профиля отмечается высокая каменистость в иллювиальной части. Образующийся при выветривании каменисто-суглинистый субстрат обладает высокой водопроницаемостью и обеспечивает свободный внутренний дренаж и наличие крупных воздушных

пор. Основная масса корней древесной и травяно-кустарниковой растительности сконцентрирована в гумусовом горизонте; в иллювиальной части профиля корни единичны.

Актуальная кислотность исследуемой почвы по генетическим горизонтам: О – 5,42; АУ – 5,96; ВМ – 5,20; ВС – 4,49. Основные физические показатели свойств почвы представлены в табл. 24.

Таблица 24. Физические свойства бурозема слабоподзоленного под кедрово-широколиственным лесом с тисом

Горизонт, мощность, см	ЕВ, % от массы	ОМ, г см ⁻³	УМ, г см ⁻³	МВО, % от массы	ДАВ, % от массы
АУ 2–7	74,79	0,50	2,16	73,27	61,18
АУе 7–18	58,11	0,66	2,26	56,45	36,64
ВМ 18–48	39,00	0,76	2,54	39,81	35,46
ВС 48–60	35,38	–	2,72	–	–

Плотность твердой фазы и плотность сложения почвы вниз по профилю равномерно увеличиваются (табл. 24). Плотность бурозема слабоподзоленного выше по сравнению с буроземом типичным (табл. 18, 24). Показатели естественной влажности и максимальной водоотдачи ниже, чем в профиле бурозема типичного; значительно уже диапазон активной влаги.

Гидрологический профиль разных категорий влаги в почве аналогичен с характеристиками предыдущего разреза. Абсолютные показатели всех гидрологических констант значительно ниже и приведены в табл. 25.

Таблица 25. Гидрологические свойства бурозема слабоподзоленного под кедрово-широколиственным лесом с тисом

Горизонт, глубина отбора, см	ПВ	КВ	НВ	ВЗ	МГ	ПВ	КВ	НВ	ВЗ	МГ
	% от сухой массы					% от объема				
АУ 2–7	152,25	100,00	78,98	17,80	11,80	76,12	50,00	39,43	8,90	5,90
АУе 7–18	103,20	53,41	46,75	10,11	6,74	68,10	35,25	30,35	6,67	4,45
ВМ 18–48	83,56	53,00	43,75	8,30	5,93	63,50	40,28	33,25	6,31	4,51

Верхняя полуметровая толща почвы (табл. 26) имеет высокие показатели порозности (76,88–70,07%) и оценивается как избыточная. Обусловлено это большим количеством корней и наличием крупных воздушных пор. Порозность аэрации менее 50% от общей порозности. Объем заземленного воздуха в органогенном горизонте незначительный – 0,73–2,69% и средний в иллювиальном – 6,57%.

Результаты валового химического анализа почвы (табл. 27) указывают на небольшую элюво-иллювиальную дифференциацию в профильном распределении SiO₂ и R₂O₃. Наибольшее накопление кремнезема наблюдается в горизонте АУе. Дифференциация TiO₂, MgO и K₂O по профилю слабо выражена. Наблюдается биологическая аккумуляция в верхнем горизонте P₂O₅, MnO и CaO.

Таблица 26. Показатели воздухоудерживания в буроземе слабоподзоленном под кедрово-широколиственным лесом с тисом

Горизонт, глубина отбора, см	П _{общ}	П _{аэр}	П _{зв}	Воздухоудерживание при			
				П _{ЕВ}	П _{КВ}	П _{НВ}	П _{ВРК}
АУ 2–7	76,85	33,43	0,73	42,47	29,85	37,42	49,21
АУе 7–18	70,79	30,35	2,69	32,44	36,54	40,44	49,19
ВМ 18–48	70,07	33,25	6,57	40,43	29,76	36,82	46,80

Таблица 27. Валовой состав бурозема слабоподзоленного под кедрово-широколиственным лесом с тисом, % на сухое вещество

Оксид	Горизонт, глубина, см			
	АУ2–7	АУе 7–18	ВМ 18–48	ВС 48–55
SiO ₂	59,119	69,782	66,392	61,732
Fe ₂ O ₃	3,749	3,955	4,556	5,374
Al ₂ O ₃	8,993	11,259	12,472	14,204
TiO ₂	0,963	1,085	1,030	0,999
MnO	0,113	0,079	0,072	0,069
CaO	1,696	0,762	0,598	0,587
MgO	0,709	0,706	0,779	0,859
P ₂ O ₅	0,228	0,098	0,081	0,138
K ₂ O	2,087	2,123	2,207	2,352
Na ₂ O	0,860	0,632	0,870	0,728

Содержание и характер распределения микроэлементов в буроземе слабоподзоленном приводятся в табл. 28. В почвенном профиле происходит перераспределение микроэлементов: накопление в гумусовом горизонте Sr, Sc, Rb, Ni, Cu и Pb; равномерное распределение Ga, Y, Mo, Cs и иллювирирование La, Ba, Cr и Zn в органо-минеральных горизонтах. Органо-минеральные горизонты имеют высокое (выше кларковых) содержание V, Co, La, Cu, Zn, Rb, Ba, Pb, а Cr, Ga, Sc, Zr, Sr, Y и Nb – низкое (меньше кларковых). Расчет кларков концентрации и кларков рассеяния в буроземе типичном выявил аккумуляцию Co, La, Mo, Pb, Zn, Rb, V, Ba и снижение Zr, Sc, Nb, Ni, Y, Cs, Sr, Cr, Ga.

Ассоциация накапливающихся элементов представлена следующим образом: Co_(5,02) – La_(4,71) – Mo_(2,45) – Pb_(2,0) – Rb_(1,88) – Zn_(1,54) – Cu_(1,2) – Ba_(1,15) – V_(1,08). К рассеивающимся элементам относятся: Zr_(1,17) Sc_(1,24) – Nb_(1,49) – Ni_(1,57) – Y_(1,61) – Cs_(1,61) Sr_(2,38) – Cr_(2,4) – Ga_(3,41).

Приковка 1. Местоположение: свежий разнокустарниковый кедровник с желтой березой и тисом на высоте 280 м над уровнем моря на выровненном

Таблица 28. Элементный состав бурозема слабоподзоленного под кедрово-широколиственным лесом с тисом, мг кг⁻¹ от массы

Элемент	Горизонт, мощность, см				Среднее содержание в почве, C _i	Кларк	
	AY 2–7	AYe 7–18	BM 18–48	BC 48–55		концентрации Кк	рассеяния Кр
Ba	544	594	591	565	573,5	1,15	
V	95	111	117	109	108,0	1,08	
Ga	9	8	9	9	8,8		3,41
Y	32	30	30	32	31,0		1,61
La	42,7	45,5	48,2	52,0	47,1	4,71	
Co	44	43	40	34	40,2	5,02	
Cu	27	18	23	28	24,0	1,20	
Mo	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,45	
Ni	36	28	20	18	25,5		1,57
Nb	17,6	16,6	17,5	17,7	17,4		1,49
Rb	143	116,9	116,7	133,6	127,6	1,88	
Pb	33	23	15	9	20,0	2,00	
Sc	16,3	7,9	7,1	6,1	9,4		1,24
Sr	200	145	130	112	146,8		2,38
Cr	81	73	91	89	83,5		2,40
Zn	76	72	76	84	77,0	1,54	
Zr	253	283	262	229	256,8		1,17
Cs	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		1,61

Примечание. Концентрация Li ниже чувствительности прибора.

гребне вдоль ключа Ковалевский. Напочвенный покров представлен папоротниками, осоками и разнотравьем, проективное покрытие 25–30%.

0–2 см. Слаборазложившаяся подстилка, состоящая в основном из листовного опада и хвои кедра, в нижней части труха, бурая, свежая, рыхлая, дождевые черви, корни, переход ясный, резкий.

AY2–8 см. Черно-серый, крупнокомковатый, в нижней части комковатый, свежий, среднесуглинистый, в нижней части горизонта опесчаненный суглинок, слабо уплотнен, корни крупные и мелкие, переход ясный.

BM 8–15 см. Буро-коричневый, светлее предыдущего, мелкокомковатый, свежий, в нижней части влажный, уплотнен, опесчаненный суглинок, корни крупные, слюда, переход ясный.

BC 15–30 см. Желтовато-бурый, порошистый, свежий, плотный, дресва, камни, корни.

Почва – бурозем типичный со среднеразвитым профилем; слабоскелетный в верхней и сильноскелетный в нижней части профиля; на элювии материнских пород.

Данные валового химического анализа бурозема под кедровником с желтой березой и тисом (табл. 29) показывают, что содержание SiO₂ вниз по профилю постепенно увеличивается. Небольшое иллювирувание Fe₂O₃, Al₂O₃ и TiO₂ наблюдается в горизонте BM. Наибольшее содержание оксидов MnO, CaO и P₂O₅

Таблица 29. Валовой состав бурозема типичного под кедровником с желтой березой и тисом, % на сухое вещество

Оксид	Горизонт, глубина, см				
	O*0–2	O**0–2	AУ2–8	ВМ 8–15	BC15–30
SiO ₂	21,879	28,016	53,409	60,106	62,946
Fe ₂ O ₃	1,623	1,945	4,224	5,286	4,574
Al ₂ O ₃	2,974	2,914	8,648	12,031	11,830
TiO ₂	0,239	0,311	0,788	0,970	0,929
MnO	0,851	0,922	0,119	0,083	0,094
CaO	30,771	26,033	0,766	0,566	0,476
MgO	6,451	3,350	0,409	0,575	0,692
P ₂ O ₅	8,621	6,615	0,254	0,202	0,174
K ₂ O	3,024	2,682	1,917	2,086	1,996
Na ₂ O	0,861	0,749	0,911	0,853	0,935

Здесь и в табл. 30 * – зольный состав подстилки, где преобладает лиственный опад, ** – зольный состав подстилки, где преобладает опад хвойных пород (кедр, тис).

характерно для гумусового горизонта, с глубиной их концентрация уменьшается. Оксиды K₂O и Na₂O в почвенном профиле распределяются равномерно с небольшими колебаниями в иллювиальном горизонте ВМ. В зольном составе подстилки с преобладанием лиственного опада больше оксидов кальция, магния, фосфора, калия и натрия, а в составе подстилки с хвойным опадом преобладают оксиды кремния, железа, титана и марганца.

В лиственном опаде наблюдается аккумуляция F, S, Zn, Sr и Pb (табл. 30). Хвойный опад обогащен V, Cr, Co, Ni, Cu. Независимо от состава подстилки в ней аккумулируются Sr, Zn, Cu, Ni, F и S. В серогумусовом горизонте АУ накапливаются Rb, Pb, F и Sr. С глубиной количество Zr, Cr, Zn и Ba увеличивается. Концентрация Sc, Ga, La, Nb не изменяется по профилю.

Таким образом, в буроземе типичном под кедровником с желтой березой и тисом происходит слабое перераспределение микроэлементов по профилю. В органо-минеральных горизонтах наблюдаются равномерное распределение Sc, Co, Ga, La, Nb и незначительное иллювиирование Ba, V, Cu, Zr и Zn. Расчет кларков концентрации и кларков рассеяния (табл. 30) выявил аккумуляцию Co, La, Pb, Zn, Rb, V, Ba, Cs, Cu, S и снижение следующих химических элементов: Zr, Sc, Nb, Ni, Y, Sr, Cr, Ga и F.

Ассоциация накапливающихся элементов представлена следующим образом:
 La_(4,00) Co_(3,75) – Pb_(3,0) – S_(1,95) – Zn_(1,54) Rb_(1,52) – Cu_(1,50) – Cs_(1,12) – V_(1,10) – Ba_(1,09) ·
 К рассеивающимся элементам относятся: Sc_(1,17) – Zr_(1,21) – Nb_(1,30) – Y_(1,87) – Cr_(2,22) –
 Ni_(2,40) – Ga_(3,00) – Sr_(3,62) ·

Таблица 30. Элементный состав бурозема типичного под кедровником с желтой березой и тисом, мг кг⁻¹ от массы

Элемент	Горизонт, глубина, см					Среднее в почве, C _i	Кларк	
	О 0–2*	О 0–2**	АУ2–8	ВМ 8–15	ВС 15–30		концентрации, Кк	рассеяния, Кр
F	350	280	340	270	240	283,3		1,13
S	660	390	350	420	400	390,0	1,95	
Sc	10	10	10	10	10	10,0		1,17
V	10	110	100	120	110	110,0	1,10	
Cr	87	90	90	80	100	90,0		2,22
Co	6	30	30	30	30	30,0	3,75	
Ni	33	41	20	10	20	16,7		2,40
Cu	70	75	30	40	20	30,0	1,50	
Zn	1075	750	80	90	100	9,0	1,80	
Ga	но	но	10	10	10	10,0		3,00
Rb	50	50	110	100	100	103,3	1,52	
Sr	680	520	110	90	90	96,7		3,62
Y	11	15	30	30	20	26,7		1,87
Zr	160	140	230	250	260	246,7		1,21
Nb	10	11	20	20	20	20,0		1,30
Cs	но	но	6,1	нчп	5,2	5,6	1,12	
Ba	305	305	510	560	560	543,3	1,09	
Pb	42	29	40	20	30	30,0	3,00	
La	но	но	40	40	40	40,0	4,00	

Примечание. Содержание Мо ниже чувствительности прибора; но не определялось.

Курумы

На территории парка встречаются каменные осыпи – хаотические нагромождения каменных глыб разного размера. Часть таких каменных потоков лишена растительности или же с фрагментами растительного покрова. В литературе они известны под разными названиями: каменная река, каменный поток, каменная осыпь или курумы. В горных районах это явление имеет широкое распространение. При заполнении воздушных полостей мелкоземом курум превращается в каменистую почву. В литературе их называют грубоскелетными, литогенными, первичными, курумоземами, неполнопрофильными, подвешенными и пр. Упоминание о почвах на курумах Сихотэ-Алиня встречается у многих исследователей, но детальных исследований по морфологии, химизму, процессам формирования немного (Ильина и др., 1991; Грачева, 2012; и др.).

В монографии «Почвообразование в горах Сихотэ-Алиня» Л.О. Карпачевским (2012) приведены полные исследования почв курумов. В ней он детально рассматривает особенности почвообразования на курумах в Сихотэ-Алинском заповеднике, приводит схему эволюции почв курумов и данные химического состава

почвенных горизонтов и пород. Формирование почвенного покрова на курумах он связывает с двумя процессами: выветриванием камней, составляющих тело курума, и заполнением пространства между камнями аллохтонным материалом (аэральные отложения, делювий). Поселение высших растений приводит к формированию курумной почвы. В пустотах между камнями проходят корни древесной и кустарниковой растительности. Общий вид почвы и набор генетических горизонтов зависят от этапа зарастания курума. Национальный парк территориально соседствует с Сихотэ-Алинским заповедником, и можно предположить, что процессы формирования курумных почв имеют близкое сходство.

Описание курума. Николаев ключ (левый борт, $45^{\circ}47.716'$ с.ш., $135^{\circ}25.554'$ в.д., 470–490 м над уровнем моря, западный склон, лещинный кедровник с липой и дубом). Курум состоит из крупных и более мелких камней. На поверхности почвы камни покрыты зелеными мхами и подстилкой. Пространство между каменистыми глыбами заполнено органогенным материалом на глубину 30–50 см. Внутри курумов имеются воздушные полости. На отдельных участках отмечается выход внутрипочвенных вод на поверхность. Почвы курумов относятся к почвам буроземного ряда и на обследованной территории встречаются нередко.

Чаще всего на курумах разрастаются папоротники, в том числе редкие – листовник японский и кониограмма средняя.

Почвы дубовых лесов

Дуб монгольский отличается высокой экологической пластичностью и произрастает на различных почвах. Под дубовыми лесами чаще встречаются сильносkeletalные буроземы (часто с выходом на дневную поверхность горных пород). В связи с суглинисто-щебнистым составом почвы под дубняками на разных склонах не испытывают переувлажнения. Они характеризуются наличием на поверхности маломощной подстилки (1–3 см), которая вследствие интенсивных биологических процессов быстро минерализуется. Часто подстилка на крутых склонах сохраняется фрагментарно; после частых палов, наблюдаемых в дубняках, подстилка заменяется органоперегнойными остатками, которые зарастают осоками. На поверхности подстилки длительное время сохраняются опавшие дубовые листья. Темноокрашенный гумусовый горизонт АУ мощностью 3–4 см сменяется структурно-метаморфическим горизонтом ВМ мощностью 10–20 см, переходящим постепенно в щебнисто-каменистую материнскую породу.

Прикопка 2. Правый берег р. Большая Уссурка, севернее КПП «Корейский», нижняя часть южного склона, 230–290 м, $45^{\circ}45.163'$ с.ш., $135^{\circ}22.010'$ в.д. Дубняк леспедецевый. На поверхности крупные обломки породы.

О 0–1 см. Прерывистая подстилка из листьев дуба и лиственных пород. Бурая слабо-разложившаяся, рыхлая, сухая.

АУ1–3 см. Темно-серый, мелкокомковатый, легкосуглинистый, слабо уплотнен, сухой, корни.

ВМ 3–20 см. Буровато-желтый, порошистый, легкосуглинистый, плотный, свежий, мелкая дресва, корни.

ВС 20–35 см. Щебнисто-каменистый, мелкозем буровато-желтый, сухой.

Почва – бурозем типичный, насыщенный со слабо развитым профилем; сильноскелетный.

Почвы долинных лесов

Равнинные участки на территории национального парка занимают небольшие площади и представляют собой эрозионно-аккумулятивные террасы речных долин. Особенности литологического состава и гидрофизические характеристики пойменных почв в долине р. Большая Уссурка рассмотрены в монографии А.В. Назаркиной (2008).

Для почв речных пойм характерны мозаичность и пестрота почвенного покрова, обусловленные меандрированием речного русла, миграцией различных частей поймы и разнокачественностью речного аллювия. Почвы, формирующиеся под кедрово-широколиственными лесами в долине р. Большая Уссурка, имеют хорошо сформированный профиль. Отличительной особенностью морфологического строения бурых лесных пойменных почв является наличие маломощной лесной подстилки, представленной опадом из хвои кедра и лиственных пород. Под лесной подстилкой залегает хорошо структурированный гумусоаккумулятивный горизонт с комковато-зернистой или порошисто-комковатой структурой, под которым залегает серия иллювиальных горизонтов, переходящих в супесчано-каменистый или суглинистый аллювий. Близкое залегание почвенно-грунтовых вод обуславливает наличие восстановительных процессов. Процессы оглеения охватывают преимущественно нижнюю часть профиля в течение вегетационного периода.

Формация: кедрово-широколиственные леса. Влажный долинный кедровник. 26.06.2014. Правый берег р. Большая Уссурка, ключ Кордонный (Щучий омут), надпойменная терраса, 268 м над уровнем моря, 45°45.000' с.ш., 135°29.236' в.д., влажный кедровник долинный с ильмом и ясенем разнокустарниковый папоротниково-разнотравный. Рельеф равнинный, бугристо-ямчатый, рядом просматриваются промоины и старицы. В напочвенном покрове представлены папоротники и разнотравье, проективное покрытие 80–90%.

О 0–4 см. Слабо разложившаяся в верхней части, состоящая в основном из хвои кедра; в нижней части труха, бурая, свежая, рыхлая, корни, черви; переход ясный, резкий.

АУ4–13 см. Коричнево-бурый, комковатый, в нижней части пороховатый, свежий, среднесуглинистый, в нижней части горизонта опесчаненный суглинок, слабо уплотнен, корни крупные и мелкие; переход ясный.

ВМ 13–35 см. Буро-коричневый, темнее предыдущего, мелкокомковатый, свежий, в нижней части влажный, уплотнен, опесчаненный суглинок, корни крупные, слюда, переход ясный.

ВМg 35–65 см. Буро-коричневый, светлее предыдущего, влажный, сырой в нижней части, непрочнокомковатый, заиленная супесь, плотный, корни единично, мелкие ржавые стяжения, слабооглеен.

BCg 65–75 см. Более опесчанен, в горизонте окатанные камни, сырой, илистые прослойки, ржавые стяжения, слабое оглеение, плотный.

Почва – бурозем слабоглееватый, слабонасыщенный на аллювиальных отложениях со среднеразвитым профилем, слабоскелетный в верхней и среднескелетный в нижней части профиля.

Под лесной подстилкой залегает хорошо структурированный гумусово-аккумулятивный горизонт, который сменяется иллювиальными горизонтами, постепенно переходящими на глубине 65–75 см к супесчано-песчаному аллювию. При детальном анализе морфологического строения почвенного профиля отмечаются опесчаненность и оглеенность иллювиальных горизонтов. Основная масса корней древесной и травяно-кустарниковой растительности сконцентрирована в верхней части почвенного профиля. Почвы формируются при близком стоянии почвенно-грунтовых вод. Водный режим неустойчив. В периоды с высоким паводком и большим количеством осадков нарушается оптимизация водно-воздушного режима.

Характер распределения актуальной кислотности по профилю выглядит следующим образом: О – 5,27; АУ – 4,94; ВМ – 4,12; ВМg – 4,51.

Плотность сложения почвы изменяется вниз по профилю (табл. 31). Наименьшие показатели плотности сложения почвы отмечены в верхних горизонтах, где сосредоточены основной объем корней и высокое содержание гумусовых веществ. Вниз по профилю плотность сложения почвы увеличивается, достигая максимальных значений в нижней части почвенного профиля. Под долинным кедровником плотность твердой фазы изменяется от 2,46 до 2,79 г см⁻³. Минимальные значения плотности твердой фазы характерны для гумусового горизонта, что объясняется повышенным содержанием органических веществ по сравнению с горизонтами ВМ1 и ВМ2g.

Влажность почвы равномерно уменьшается с глубиной. Наиболее увлажнен верхний гумусовый горизонт под густой травянистой растительностью. Показатели максимальной водоотдачи низкие, что характерно для почв супесчаного состава. Диапазон активной влаги в верхнем гумусовом горизонте – 52,12% в иллювиальных горизонтах снижается в два раза.

Характер распределения разных категорий влаги в почвенном профиле представлен в табл. 32. С глубиной уменьшаются все показатели гидрологических констант. Самые высокие свойственны верхнему гумусовому горизонту.

Таблица 31. Физические свойства бурозема слабоглееватого под влажным кедровником долинным с ильмом и ясенем

Горизонт, глубина, см	ЕВ, % от массы	ОМ, г см ⁻³	УМ, г см ⁻³	МВО, % от массы	ДАВ, % от массы
АУ4–13	48,71	0,70	2,46	33,08	51,12
ВМ 13–35	24,84	1,17	2,67	19,58	24,77
ВМg 35–65	26,33	1,23	2,64	9,72	22,98
BCg 65–75	24,55	1,38	2,79	6,21	23,43

Таблица 32. Гидрологические свойства бурозема слабоглеватого под влажным кедровником долинным с ильмом и ясенем

Показатель	Горизонт, глубина, см			
	АУ4–13	ВМ 13–35	ВМg 35–65	ВСg 65–75
% от сухой массы				
ПВ	91,95	47,83	35,74	30,86
КВ	72,70	40,28	31,51	29,44
НВ	58,87	28,25	26,02	24,65
ВЗ	11,62	5,22	4,56	1,83
МГ	7,75	3,48	3,04	1,22
% от объема				
ПВ	64,35	50,75	43,71	42,59
КВ	51,12	38,88	38,57	40,62
НВ	41,43	31,49	31,84	34,02
ВЗ	8,13	6,06	5,61	2,52
МГ	5,42	4,04	3,74	1,68

Почвы обладают хорошими фильтрационными свойствами, имеют опесчаненный среднесуглинистый гранулометрический состав, комковатую структуру в верхней части профиля. В маловодные годы влагоёмкость всего почвенного профиля лежит в диапазоне оптимального водоснабжения. При подтоплении увеличивается влажность всего почвенного профиля, особенно его нижней части, о чем свидетельствуют следы оглеения и ржавые стяжения в профиле.

В почве долинного кедровника общая пористость варьирует по профилю от избыточной – 71,54% до хорошей – 50,53% (табл. 33). Наибольшие значения общей пористости характерны для верхних слоев почвы. По мере продвижения вниз по профилю общая пористость снижается, достигая своих минимальных значений. Поры аэрации занимают почти половину порового пространства. Количество заземленного воздуха варьирует от 7,19 до 10,23%.

Таблица 33. Показатели воздухосодержания в буроземе слабоглеватом под влажным кедровником долинным с ильмом и ясенем, %

Горизонт, глубина, см	П _{общ}	П _{аэр}	П _{зв}	Воздухосодержание при			
				П _{ЕВ}	П _{КВ}	П _{НВ}	П _{ВРК}
АУ4–13	71,54	41,43	7,19	37,24	20,42	30,11	42,53
ВМ 13–35	60,98	31,49	10,23	34,25	22,10	29,49	38,94
ВМg 35–65	53,40	31,84	9,69	21,19	14,83	21,56	31,12
ВСg 65–75	50,53	34,02	7,94	16,65	9,91	16,51	26,72

В валовом распределении оксидов заметна аккумуляция MnO, CaO, MgO, P₂O₅, TiO₂ и Fe₂O₃ в гумусовом горизонте (табл. 34). Вниз по профилю отмечается увеличение количества SiO₂. В горизонте ВМg наблюдается слабое накопление оксидов алюминия и калия.

Таблица 34. Валовой химический состав бурозема слабоглееватого под влажным кедровником долинным с ильмом и ясенем, % на сухое вещество

Оксид	Горизонт, глубина, см			
	O* 0–4	AУ4–13	BMg 13–65	BCg 65–75
SiO ₂	27,518	57,610	66,984	66,997
Fe ₂ O ₃	3,360	4,468	3,890	3,513
Al ₂ O ₃	3,473	11,523	13,236	12,060
TiO ₂	0,389	0,641	0,567	0,577
MnO	0,253	0,168	0,101	0,076
CaO	4,237	1,354	0,612	0,608
MgO	0,437	0,977	0,751	0,850
P ₂ O ₅	0,661	0,230	0,161	0,107
K ₂ O	1,530	2,351	2,431	2,400
Na ₂ O	0,731	0,811	0,866	0,851

Распределение микроэлементов в буроземе исследуемого леса представлено в табл. 35. В опаде наблюдается аккумуляция S, Sc, Ni, Zn, Sr и Pb. В горизонте АУ накапливаются Co, Zn, Rb, Sr, Ba. С глубиной снижается содержание таких элементов, как F, Co, Rb, Ba и Pb, а количество Cu, V и S увеличивается. Концентрация Ga, Nb не изменяется по профилю.

Ассоциация накапливающихся элементов представлена следующим образом: Pb_(2,57) – Co_(1,96) – S_(1,92) – Zn_(1,73) – Cu_(1,48) – Rb_(1,47) – Sc_(1,14). К рассеивающимся элементам относятся: Nb_(0,77) – Ba_(1,18) – Zr_(1,22) – Ni_(1,54) – Y_(1,74) – Cr_(2,28) – Sr_(2,39) – Ga_(3,00) – V_(8,85).

Таким образом, в буроземе слабоглееватом под влажным кедровником долинным происходит незначительное перераспределение микроэлементов по профилю. Расчет кларков концентрации и кларков рассеяния (табл. 35) выявил аккумуляцию Co, Pb, Zn, Rb, Sc, Cu, S и снижение V, Zr, Ba, Nb, Ni, Y, Sr, Cr, Ga; содержание F близко к кларку педосферы.

Влажный долинный кедровник. 10.07.2016. Разрез 2–2016Р заложен в излучине рек Большая Уссурка и Арму (Тенникова база), 45°45.847' с.ш., 135°28.325' в.д., 248 м над уровнем моря.

О 0–3 см. Слаборазложившаяся подстилка с поверхности из листьев, остатков травянистых растений, хвои, веточек, хорошо разложившаяся в нижней части (труха). Бурая, рыхлая, свежая, корни.

АН 3–7 см. Бурый, хорошо разложившийся, перегнойный, мажущийся, рыхлый, свежий, корни.

AУ7–24 см. Коричнево-черный, среднесуглинистый, комковатый, слабо уплотнен, свежий, много корней, переход ясный, ровный.

Таблица 35. Элементный состав бурозема слабоглееватого под влажным кедровником долинным с ильмом и ясенем, мг кг⁻¹ от массы

Элемент	Горизонт, глубина, см				Среднее в почве, С _i	Кларк	
	О* 0–4	АУ4–13	ВМg 13–65	ВСg 65–75		концентрации, Кк	рассеяния, Кр
F	280	360	320	310	330	1,03	
S	480	370	390	390	383,3	1,92	
Sc	20	20	10	10	13,3	1,14	
V	12	11	10	13	11,3		8,85
Cr	98	88	88	87	87,7		2,28
Co	13	18	16	13	15,7	1,96	
Ni	42	16	38	24	26		1,54
Cu	26	31	26	32	29,7	1,48	
Zn	182	117	76	67	86,7	1,73	
Ga	10	10	10	10	10		3,00
Rb	100	110	100	90	100	1,47	
Sr	230	170	130	140	146,7		2,39
Y	27	30	29	27	28,7		1,74
Zr	170	230	260	250	246,7		1,22
Nb	20	20	20	20	20		0,77
Ba	350	444	414	414	424		1,18
Pb	34	27	26	24	25,7	2,57	

Примечание. Концентрации La, Li; Be; V; Mo – ниже чувствительности прибора.

ВМ 24–47 см. Темно-коричнево-бурый, легкосуглинистый, крупнокомковатый, свежий, уплотнен, единично окатанная галька черного цвета, корни, переход ровный.

ВМg 47–60 см. Коричнево-бурый с легким сизым оттенком, среднесуглинистый, крупнокомковатый на гранях металлический блеск, влажный, единично окатанные камни, корни, переход ясный.

ВСg 60–80 см. Коричнево-бурый с сизым оттенком, светлее предыдущего, тяжелосуглинистый; при скатывании ощущается тонкий песок, бесструктурный, свежий; единично окатанные камни.

Почва – бурозем темногумусовый слабоглееватый на аллювиальных отложениях с глубоко развитым профилем, слабоскелетный.

Почва имеет глубокий профиль. Четко выделяются следующие генетические горизонты: подстилка – грубогумусная подстилка с высокой степенью трансформации органического вещества (ближе к перегнойному) – темногумусовый – иллювиальный и переходный. Весь почвенный профиль покрашен органикой. Нижняя часть почвенного профиля носит следы периодического переувлажнения в виде сизых оттенков и ржавых стяжений.

Основные физические величины представлены в табл. 36–38. Важным показателем является объемная масса почв, так как характеризует плотность сложения почв. Плотность почвы оказывает существенное влияние на основные физические показатели, такие как содержание и подвижность влаги, порозность, аэрация и пр.

Таблица 36. Физические свойства бурозема темногумусового слабоглееватого под влажным долинным кедровником с ильмом

Горизонт, глубина, см	ЕВ, % от массы	ОМ, г см ⁻³	УМ, г см ⁻³	МВО, % от массы	ДАВ, % от массы
АН 3–7	42,49	0,61	2,55	66,39	31,71
AU7–24	31,24	0,58	2,30	54,92	35,24
BM 24–47	34,62	0,80	2,45	47,84	33,69
BMg 47–60	45,00	0,84	2,71	23,44	33,22
BCg 60–80	24,51	0,86	2,70	18,37	25,74

Таблица 37. Гидрологические свойства бурозема темногумусового слабоглееватого под влажным долинным кедровником с ильмом

Показатель	Горизонт, глубина, см				
	АН 3–7	AU7–24	BM 24–47	BMg 47–60	BCg 60–80
% от сухой массы					
ПВ	116,63	101,36	92,56	65,62	51,32
КВ	57,67	55,26	51,40	51,16	40,68
НВ	50,24	46,44	44,72	42,18	32,95
ВЗ	18,53	11,20	11,03	8,96	7,21
МГ	12,37	7,47	7,35	5,97	4,81
% от объема					
ПВ	71,14	58,79	74,05	55,12	44,13
КВ	35,18	32,05	41,12	42,97	34,95
НВ	30,65	26,94	35,77	35,43	28,34
ВЗ	11,30	6,50	8,82	7,53	6,20
МГ	7,55	4,33	5,88	5,01	4,14

Таблица 38. Показатели воздухоудержания бурозема темногумусового слабоглееватого под влажным долинным кедровником с ильмом, %

Горизонт, глубина, см	П _{общ}	П _{возд}	П _{зв}	Воздухоудержание при			
				П _{ЕВ}	П _{КВ}	П _{НВ}	П _{ВПК}
АН 3–7	76,07	30,65	4,93	50,15	40,89	45,42	54,62
AU7–24	74,78	26,94	15,99	56,66	42,73	47,84	42,28
BM 24–47	67,87	35,88	н.о.	40,17	26,75	32,10	36,57
BMg 47–60	69,00	35,43	13,88	31,20	26,03	33,57	39,47
BCg 60–80	68,18	28,34	24,05	47,10	33,23	39,84	45,12

В исследуемой почве перегнойный горизонт имеет несколько большие показатели ОМ и УМ по сравнению с темногумусовым горизонтом.

Далее, в почве вниз по генетическим горизонтам показатели объемной и удельной массы увеличиваются. В соответствии с этими величинами изменяется и общая порозность почв, уменьшаясь с глубиной.

Характер распределения актуальной кислотности по профилю выглядит следующим образом: АН – 5,10; АУ – 4,65; ВМ – 4,98; ВМg – 4,65; ВСg – 4,95.

Гидрологические свойства почвы отражены в табл. 37. Отмечается равномерное снижение всех количественных показателей в процентном выражении от сухой массы. В объемном выражении выявляются различия между горизонтом АО и АУ.

Данные валового химического анализа мелкозема показывают увеличение оксидов кремнезема, магния, натрия, фосфора с глубиной. Распределение оксидов железа уменьшается вниз по профилю (табл. 39). Кальций выщелачивается из органогенной толщи. Относительно ровное распределение по профилю отмечается для оксидов алюминия, титана, марганца и калия.

Таблица 39. Валовой химический состав бурозема темногумусового глееватого под влажным долинным кедровником с ильмом, % на сухое вещество

Оксид	Горизонт, глубина, см			
	AУ7–24	ВМ 24–47	ВМg 47–60	ВCg 60–80
SiO ₂	61,847	62,126	62,904	65,172
Fe ₂ O ₃	4,741	4,768	4,570	4,323
Al ₂ O ₃	13,004	13,581	13,796	13,657
TiO ₂	0,742	0,708	0,698	0,699
MnO	0,101	0,097	0,103	0,106
CaO	0,838	0,591	0,590	0,608
MgO	0,900	0,993	0,882	0,987
P ₂ O ₅	0,166	0,220	0,241	0,263
K ₂ O	2,453	2,557	2,624	2,689
Na ₂ O	0,655	0,651	0,881	0,761

Содержание и характер распределения микроэлементов и тяжелых металлов в буроземе темном глееватом приведены в табл. 40. В буроземе темногумусовом глееватом под влажным долинным кедровником с ильмом вниз по профилю снижается содержание Ва, Ga, La. Элюво-иллювиальное распределение характерно для Y, Cu, Ni, Nb, Pb, Cr, Zn и Zr. Расчет кларков концентрации и кларков рассеяния в буроземе типичном (табл. 40) выявил аккумуляцию La, Pb, Mo, Cu, Co, Zn, Rb и снижение Ba, V, Ga, Sr, Cr, Y, Ni, Nb, Sc, Zr.

Ассоциация накапливающихся элементов представлена следующим образом: Co_(4,92) – La_(4,44) – Pb_(2,86) – Mo_(2,44) – Zn_(2,39) – Rb_(1,96) – Cu_(1,68). К рассеивающимся

Таблица 40. Элементный состав бурозема темногумусового глееватого под влажным долинным кедровником с ильмом, мг кг⁻¹ от массы

Элемент	Горизонт, глубина, см				Среднее в почве, С _i	Кларк	
	AU7–24	BM 24–47	BMg 47–60	BCg 60–80		концентра- ции, Кк	рассеяния, Кр
Ba	474	464	462	455	463,75		1,08
V	68,4	64,4	66,9	75,8	68,88		1,45
Ga	9,0	9,1	8,1	8,0	8,55		3,51
Y	31,6	34,3	35,0	34,0	33,72		1,48
La	46,0	43,9	44,4	43,1	44,35	4,44	
Co	38,1	38,3	39,5	41,6	39,38	4,92	
Cu	31,6	54,9	23,6	24,4	33,62	1,68	
Mo	2,6	2,6	2,6	2,9	2,68	2,44	
Ni	24,0	30,1	25,3	28,4	26,95		1,48
Nb	15,2	16,7	15,4	15,6	15,72		1,65
Rb	135,8	126,6	136,4	134,5	133,32	1,96	
Pb	29,0	31,9	33,1	20,3	28,58	2,86	
Sc	9,9	6,6	7,2	7,0	7,68		1,52
Sr	169,7	161,0	173,7	167,4	167,95		2,08
Cr	84,7	88,4	74,9	86,1	83,52		2,39
Zn	112,0	122,0	110,2	134,4	119,65	2,39	
Zr	223,5	259,1	217,3	227,6	231,88		1,29
Cs	3,0	2,9	3,1	3,1	3,02		1,65

элементам относятся: Ba_(1,08) – Zr_(1,29) – V_(1,45) – Ni_(1,48) – Y_(1,48) – Sc_(1,52) – Nb_(1,65) – Cs_(1,65) – Sr_(2,08) – Cr_(2,39) – Ga_(3,51).

Таким образом, под горными хвойно-широколиственными лесами национального парка «Удэгейская легенда» выделены буроземы (типичные, слабоподзоленные, слабogleеватые) и почвы буроземного ряда на курумах. Под долинными кедрово-широколиственными лесами описаны буроземы глееватые и буроземы темные глееватые.

Почвы горных лесов формируются на сильнощебнистом суглинисто-глинистом бескарбонатном элюво-делювии осадочных и магматических пород.

Под кедрово-еловыми и кедрово-широколиственными лесами плотность твердой фазы меняется от 2,14 до 2,72 г см⁻³ – в горных и от 2,46 до 2,79 г см⁻³ – в долинных почвах. Плотность сложения наименьшая в горных почвах – 0,36–0,76 и более высокая в долинных – 0,70–0,86 г см⁻³.

Диапазон активной влаги, свидетельствующий о количестве доступной для растений влаги, шире под горными лесами (112,56–35,46% от массы) и значительно уже под долинными лесами (51,12–22,98% от массы), где почвы обладают хорошими фильтрационными свойствами и имеют опесчаненный среднесуглинистый гранулометрический состав.

Валовой химический состав показывает довольно равномерное содержание оксидов в почвенном профиле. Элюво-иллювиальная дифференциация в профильном распределении SiO_2 и R_2O_3 свидетельствует о слабых процессах оподзоливания (горные почвы) и глееобразования (долинные почвы).

Содержание микроэлементов обусловлено главным образом составом почвообразующих пород. В почвенном профиле горных кедрово-широколиственных и кедрово-еловых лесов накапливаются такие элементы, как лантан, кобальт, свинец, сера, рубидий, цинк, медь, ванадий и барий. К рассеивающимся элементам относятся скандий, ниобий, цирконий, никель, иттрий, хром, стронций и галлий.

Для долинных буроземов слабоглееватых характерно накопление свинца, кобальта, серы, цинка, меди, скандия, рубидия (и лантана в буроземе темном). Для таких элементов, как ниобий, барий, цирконий, никель, иттрий, хром, стронций, галлий и ванадий, характерно рассеяние.

Высокие концентрации микроэлементов в почвах связаны с проявлением рудных химических аномалий, полученные данные могут считаться естественным фоном для данной территории.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Основу аннотированного списка сосудистых растений национального парка «Удэгейская легенда» составляет работа И.К. Шишкина «Материалы к флоре бассейна реки Имана», опубликованная в 1930 г. Он первым подробно описал флору бассейна р. Большая Уссурка, включая северо-западную часть территории национального парка (район к северо-востоку от с. Дальний Кут, включая ключ Островной). Для территории, прилегающей к национальному парку или входящей в его состав, И.К. Шишкин указал 455 видов сосудистых растений.

Нами также были учтены материалы А.И. Куренцова (1935), П.В. Крестова (1993а, б) и данные ряда авторов, вошедшие в коллективную сводку «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985–1996).

Продолжив ботанические исследования в парке, а также изучив гербарные образцы, хранящиеся в Дальневосточном региональном гербарии (VLA), мы составили современный конспект его флоры. Список аннотирован русским и латинским названием вида и его таксономическим положением, библиографией о первой находке растения на исследуемой территории, указанием экологической приуроченности, встречаемости, жизненной формы каждого вида.

Приведенные семейства расположены согласно системе, принятой в региональной сводке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока». Т. 1–8 (1985–1996), роды и виды расположены в алфавитном порядке. При составлении списка учтены дополнения и изменения к вышеназванному изданию (Флора российского Дальнего Востока..., 2006), а также работа А.Е. Кожевникова и З.В. Кожевниковой «Таксономический состав и особенности природной флоры Приморского края» (2014). Названия и написание авторов сосудистых растений приведены в соответствии с IPNI (The International Plant names Index, <https://www.ipni.org>).

Распространение видов чаще всего приводится по бассейнам ключей, ручьев и притоков р. Большая Уссурка, реже по населенным пунктам или урочищам (рис. 4).

Указаны виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации (2008), Приморского края (2008) и Красный список МСОП (Международного союза охраны природы – The IUCN Red List of Threatened Species).

Виды, приведенные по литературным данным и нами не встреченные, отмечены звездочкой (*). Тире перед названием вида указывает на то, что нахождение данного вида на территории парка ставится под сомнение.

В тексте дополнительно приняты следующие сокращения: контрольно-пропускной пункт – КПП; Красная книга Российской Федерации (2008) – КК РФ; Красная книга Приморского края (2008) – КК ПК; Красный список МСОП – КС МСОП.



Рис. 4. Карта-схема бассейна р. Большая Уссурка (территория национального парка): А – водораздел Большая Уссурка – Ковалевский ключ; В – Ковалевский ключ; С – Островной ключ (руч. Островной ключ 1-й); D – Левый Михайловский ключ; E – КПП 1 «Корейский»; F – Широкий ключ; G – Николаев ключ; Н – Яков ключ; I – междуречье Арму и Большая Уссурка (Тенникова база); J – Кордонный ключ (Чистый, или Щучий затон); K – руч. Пасечный; L – водораздел Пасечный ключ – р. Лесовозная; M – р. Лесовозная; N – Никиткин ключ; O – р. Малая Пихтовка; P – урочище Ороchonский Бог (р. Арму); Q – Лаулинский прижим; T – Трофимов ключ

Сем. 1. БАРАНЦОВЫЕ – HUPERZIACEAE

Род 1. Баранец – *Huperzia* Bernh.

Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. (как *Lycopodium serratum* Thunb.: Шишкин, 1930). – **Б. пильчатый.** Водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Ороchonский Бог, руч. Пасечный, междуречье Арму и Большой Уссурки, р. Малая Пихтовка; кедрово-еловые, кедрово-лиственничные леса. Относительно редко. Многолетник.

Сем. 2. ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIACEAE

Род 1. Плаун – *Lycopodium* L.

Lycopodium annotinum L.: Шишкин, 1930. – **П. годичный**. Ключи: Ковалевский, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Арму, руч. Пасечный; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Нередко. Многолетник.

Lycopodium obscurum L.: Шишкин, 1930. – **П. темный**. Ключи: Ковалевский, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, урочище Орочонский Бог; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Нередко. Многолетник.

Сем. 3. ПЛАУНКОВЫЕ – SELAGINELLACEAE

Род 1. Плаунок – *Selaginella* P. Beauv.

Selaginella borealis (Kaulf.) Spring – **П. северный**. КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим; скалы над р. Большая Уссурка. Редко. Многолетник.

Selaginella rupestris (L.) Spring – **П. наскальный**. КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим, урочище Орочонский Бог; скалы над р. Большая Уссурка. Нередко. Многолетник.

Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring (как *Selaginella involvens* (Sw.) Spring: Шишкин, 1930) – **П. тамарисковый**. КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим, урочище Орочонский Бог; скалы над р. Большая Уссурка. Часто. Многолетник.

Сем. 4. ХВОЦОВЫЕ – EQUISETACEAE

Род 1. Хвощ – *Equisetum* L.

Equisetum arvense L.: Шишкин, 1930 – **Х. полевой**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, берега ручьев, сырые луга. Относительно часто. Многолетник.

Equisetum fluviatile L. (*E. limosum* L.: Шишкин, 1930) – **Х. речной**. р. Малая Пихтовка; берега водоемов, болота. Относительно редко. Многолетник.

Equisetum hyemale L.: Шишкин, 1930 – **Х. зимующий**. Ключи: Ковалевский, Островной, Никиткин, Николаев, Яков, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Орочонский Бог; междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Лесовозная; берега ручьев, ключей. Часто, иногда в массе. Многолетник.

Equisetum pratense L.: Шишкин, 1930 – **Х. луговой**. Ключи: Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский», реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные лиственные леса, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Equisetum sylvaticum L.: Шишкин, 1930 – **Х. лесной**. Ключи: Никиткин, Островной, Широкий; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; кустарниковые заросли, долинные лиственные леса. Нередко. Многолетник.

Сем. 5. **ЧИСТОУСТОВЫЕ – OSMUNDACEAE**

Род 1. **Чистоустник – Osmundastrum** C. Presl

Osmundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa (как *Osmunda cinnatomea* L.: Шишкин, 1930) – **Ч. азиатский**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; дубняки, ясеневики, кустарниковые заросли, окраины лиственничников. Часто. Нередко образует заросли. Многолетник.

Сем. 6. **ГЕМИОНИТИДИЕВЫЕ – HEMIIONITIDACEAE**

Род 1. **Кониограмма – Coniogramme** Fée

Coniogramme intermedia Hieron. (как *C. fraxinea* Fée: Шишкин, 1930) – **К. средняя**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Трофимов; кедрово-еловые, кедрово-широколиственные леса (курумники). Нередко, иногда образует заросли. Многолетник. Включен в КК ПК.

Сем. 7. **СИНОПТЕРИСОВЫЕ – SINOPTERIDACEAE**

Род 1. **Алевритоптерис – Aleuritopteris** Fée

Aleuritopteris argentea* (S.G. Gmel.) Fée (как *Cheilanthes argentea* (S.G. Gmel.) Kunze: Шишкин, 1930) – **А. серебристый. С. Дальний Кут; по трещинам скалистых обрывов. Редко. Многолетник. Включен в КК ПК.

Сем. 8. **АДИАНТОВЫЕ – ADIANTACEAE**

Род 1. **Адиантум – Adiantum** L.

Adiantum pedatum L.: Шишкин, 1930 – **А. стоповидный**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, лиственные леса. Часто. Многолетник.

Сем. 9. **МНОГОНОЖКОВЫЕ – POLYPODIACEAE**

Род 1. **Чешуекучник – Lepisorus** (J. Smith) Ching

Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching – **Ч. уссурийский**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; скалы. Редко. Многолетник.

Род 2. **Многоножка – Polypodium** L.

Polypodium sibiricum Sipliv. – **М. сибирская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной; КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим; кедрово-широколиственные леса, каменистые склоны, тенистые скалы. Часто. Многолетник.

– *Polypodium vulgare* L.: Шишкин, 1930. – **М. обыкновенная**. Скалы. Редко. Многолетник.

Род 3. **Пиррозия** – *Pyrrhosia* Mirb.

Pyrrhosia petiolosa* (Christ) Ching (как *Cyclophorus lingua* Desv.: Шишкин, 1930) – **П. длинночерешковая. С. Дальний Кут; карнизы скал, обрывающиеся к р. Большая Уссурка. Редко. Многолетник. Внесен в КК РФ и КК ПК.

Сем. 10. **ДЕННШТЕДТИЕВЫЕ** – DENNSTAEDTIACEAE

Род 1. **Коптидиптерис** – *Coptidipteris* Nakai et Momose

Coptidipteris wilfordii (Moore) Nakai et Momose (как *Microlepia wilfordii* T. Moore: Шишкин, 1930) – **К. Вильфорда**. Ключи: Николаев, Широкий; скалы по берегу р. Большая Уссурка, выходы горных пород. Редко. Многолетник.

Род 2. **Деннштедтия** – *Dennstaedtia* Bernh.

Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett. ex Miq. (как *Microlepia hirsuta*: Шишкин, 1930) – **Д. волосистая. Островной ключ; скалы. Редко. Многолетник.

Сем. 11. **ПОДЧЕШУЙНИКОВЫЕ** – HYPOLEPIDACEAE

Род 1. **Орляк** – *Pteridium* Scop.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn: Шишкин, 1930 – **О. обыкновенный**. Ключи: Ковалевский, Островной; КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; смешанные леса, дубняки, лецинные заросли. Часто. Многолетник.

Сем. 12. **КОСТЕНЦОВЫЕ** – ASPLENIACEAE

Род 1. **Костенец** – *Asplenium* L.

Asplenium incisum Thunb. – **К. вырезной**. Николаев ключ; скалы, каменистые осыпи. Очень редко. Многолетник. Включен в КК ПК.

Asplenium tenuicaule Hayata: Цвелев, 1991 (с. 44, рис. 13) – **К. тонкостебельный**. Островной ключ, КПП 1 «Корейский»; скалы, каменистые осыпи. Редко. Многолетник.

Род 2. **Кривокучник** – *Camptosorus* Link

Camptosorus sibiricus* Rupr.: Шишкин, 1930 – **К. сибирский. Островной ключ, с. Дальний Кут; скалистые обнажения. Редко. Многолетник.

Род 3. **Листовник** – *Phyllitis* Hill

Phyllitis japonica Kom. (как *Asplenium scolopendrium* L. subsp. *japonicum* (Kom.) Rasbach, Reichst. et Viane: Гладкова, Сибирина, 2016) – **Л. японский**. Николаев ключ, правый борт; кедрово-елово-желтоберезово-дубовый влажный кониограммовый лес. Очень редко. Многолетник. Включен в КК ПК.

Сем. 13. **ЩИТОВНИКОВЫЕ** – DRYOPTERIDACEAE

Род 1. **Щитовник** – *Dryopteris* Adans.

Dryopteris crassirhizoma Nakai (как *D. buschiana* Fomin: Крестов, 1993а, б) – **Щ. толстокорневищный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный; реки: Малая

Пихтовка, Лесовозная; урочище Ороchonский Бог; кедрово-еловые леса. Часто. Многолетник.

– *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray: Шишкин, 1930 – **Щ. широкий**. Пихтово-еловые, кедрово-широколиственные леса. Многолетник. Согласно А.И. Шмакову (1999), этот вид и нижеприведенный в Приморском крае не встречаются.

– *Dryopteris felix-mas* (L.) Schott.: Шишкин, 1930 – **Щ. мужской**. Хвойные и смешанные леса. Многолетник.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy (как *Dryopteris austriaca* (Jacq.) Woyn. ex Schinz et Thell.: Крестов, 1993б) – **Щ. расширенный**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный; реки: Малая Пихтовка, Лесовозная; урочище Ороchonский Бог; кедрово-широколиственные, елово-кедровые леса. Нередко. Многолетник.

Dryopteris fragrans (L.) Schott: Шишкин, 1930 – **Щ. пахучий**. Островной ключ, КПП 1 «Корейский»; скалы, каменистые россыпи. Нередко. Многолетник.

Dryopteris goeringiana (Kunze) Koidz. (как *D. wladivostokensis* V. Fedtsch.: Шишкин, 1930) – **Щ. Геринга**. Ключи: Трофимов, Яков; кедрово-широколиственные, реже лиственные леса. Редко. Многолетник.

Dryopteris sichotensis Kom. (как *D. coreano-montana* Nakai: Крестов, 1993б) – **Щ. сихотэ-алинский**. Ковалевский ключ, водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ; кедрово-еловые леса. Нередко. Многолетник.

Род 2. **Лепторумора – Leptorumohra** (H. Ito) H. Ito

Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvelev (как *Dryopteris amurensis* Christ: Шишкин, 1930) – **Л. амурская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка, урочище Ороchonский Бог; хвойно-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 3. **Многорядник – Polystichum** Roth

Polystichum braunii (Spenn.) Fée: Шишкин, 1930 – **М. Брауна**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels: Шишкин, 1930 – **М. укореняющийся. Сырые скалистые обрывы к р. Большая Уссурка; с. Дальний Кут. Редко. Многолетник.

Сем. 14. **ОНОКЛЕЕВЫЕ – ONOCLEACEAE**

Род 1. **Страусник – Matteuccia** Todaro

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro: Шишкин, 1930 – **С. обыкновенный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, Яков; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка, междуречье Арму – Большая Уссурка; урочище Ороchonский Бог, руч. Пасечный; долинные кедрово-широколиственные леса. Часто, местами образует заросли. Многолетник.

Род 2. **Оноклея – Onoclea L.**

Onoclea sensibilis L.: Шишкин, 1930 – **О. чувствительная**. Ключи: Кордонный, Островной; руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка, урочище Орочонский Бог; долинные лиственные, кедрово-широколиственные леса, сырые луга. Часто. Многолетник.

Сем. 15. **КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ – ATHYRIACEAE**

Род 1. **Кочедыжник – Athyrium Roth**

Athyrium filix-femina (L.) Roth: Шишкин, 1930 – **К. женский**. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; лиственные, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Athyrium monomachi Kom. – **К. Мономаха**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, междуречье Арму – Большая Уссурка; долинные кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Athyrium sinense Rupr. (как *A. rubripes* (Kom.) Kom.: Крестов, 1993б) – **К. китайский**. Ключи: Левый Михайловский, Ковалевский, Островной, Трофимов, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный; реки: Малая Пихтовка, Лесовозная; лиственные, кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 2. **Корноптерис – Cornopteris Nakai**

Cornopteris crenulatoserrulata (Makino) Nakai (как *Phegopteris austroussuriensis* Kom.: Шишкин, 1930) – **К. городчато-пильчатый**. Ключи: Ковалевский, Островной, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка; реки Малая Пихтовка, Лесовозная; урочище Орочонский Бог; кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 3. **Орлячок – Diplazium Sw.**

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata (как *Athyrium crenatum* Rupr.: Шишкин, 1930) – **О. сибирский**. Ключи: Ковалевский, Островной, Трофимов, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Часто. Многолетник.

Род 4. **Голокучник – Gymnocarpium Newm.**

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – **Г. обыкновенный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, р. Лесовозная; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса, дубняки, каменистые склоны. Часто. Многолетник.

Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. (как *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newm.: Крестов, 1993а) – **Г. иезский**. КПП 1 «Корейский», дубняки, каменистые склоны. Редко. Многолетник.

Род 5. Лунокучник – *Lunathyrium* Koidz.

Lunathyrium pycnosorum (Christ) Koidz. (как *Athyrium acrostichoides* Diels.: Шишкин, 1930) – **Л. густосорусовый**. Ключи: Ковалевский, Островной, Николаев, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, между речье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, урочище Ороchonский Бог; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Часто. Многолетник.

Род 6. Ложнопузырник – *Pseudocystopteris* Ching

Pseudocystopteris spinulosa (Maxim.) Ching (как *Athyrium spinulosum* Christ: Шишкин, 1930) – **Л. игольчатый**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса, дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 7. Корневищник – *Rhizomatopteris* Khokhr.

Rhizomatopteris sudetica (A. Braun et Milde) Khokhr. – **К. судетский**. Трофимов ключ; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Сем. 16. ВУДСИЕВЫЕ – WOODSIACEAE

Род 1. Протовудсия – *Protowoodsia* Ching

Protowoodsia manchuriensis (Hook.) Ching – **П. маньчжурская**. КПП 1 «Корейский», затененные скалистые обнажения. Редко. Многолетник.

Род 2. Вудсия – *Woodsia* R. Br.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.: Шишкин, 1930 – **В. эльбская**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; скистые обнажения, осыпи. Довольно часто. Многолетник.

Woodsia polystichoides D. Eat.: Шишкин, 1930 – **В. многорядниковая**. Ключи: Островной, Широкий; урочище Ороchonский Бог, скалы. Довольно часто. Многолетник.

Woodsia subcordata Turcz.: Цвелев, 1991 (рис. 28, с. 84) – **В. полусердцевидная**. Ключ Островной, р. Большая Уссурка; скалы. Редко. Многолетник.

Сем. 17. ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ – THELYPTERIDACEAE

Род 1. Параптелиптерис – *Parathelypteris* (H. Ito) Ching

Parathelypteris nipponica (Franch. et Sav.) Ching – **П. японский**. Пасечный руч., р. Малая Пихтовка; долинны кедрово-широколиственные леса, сырые луга, болота, по берегам водоемов. Нередко. Многолетник.

Род 2. Буковник – *Phegopteris* (C. Presl) Fée

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. (как *Ph. polypodiodes* Fée: Шишкин, 1930) – **Б. обыкновенный**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 3. **Телиптерис – *Thelypteris* Schmid.**

Thelypteris thelypteroides (Michx.) Holub (как *Dryopteris thelypteris* (L.) A. Gray: Шишкин, 1930) – **Т. телиптерисовидный**. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; сырые луга, болота, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Сем. 18. **СОСНОВЫЕ – PINACEAE**

Род 1. **Пихта – *Abies* Mill.**

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.: Шишкин, 1930 – **П. почкочешуйная**, или **белокорая**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Островной, Николаев, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка; руч. Пасечный; урочище Ороchonский Бог, кедрово-широколиственные, пихтово-еловые леса. Часто. Лесообразователь. Дерево. Включена в КС МСОП.

Род 2. **Лиственница – *Larix* Mill.**

Larix cajanderi Mayr. (*L. dahurica* subsp. *cajanderi* (Mayr) Nikolin) – **Л. Каяндера**. Ключи: Николаев, Островной, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; речные долины, кедрово-лиственничники. Редко. Лесообразователь. Дерево.

– *Larix gmelinii* (Rupr.) Kuzen.: Крестов, 1993б (как *L. dahurica* Turcz. ex Trautv.: Шишкин, 1930) – **Л. Гмелина**. Ключ Островной; речные долины, кедрово-лиственничные леса. Нечасто. Дерево. Для Приморского края этот вид не приводится (Кожевников, Кожевникова, 2014).

Род 3. **Ель – *Picea* A. Dietr.**

Picea ajanensis Fisch. et Carrière: Шишкин, 1930 (= *P. jezoensis* (Siebold et Zuss.) Carrière). – **Е. аянская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка, урочище Ороchonский Бог; кедрово-широколиственные, пихтово-еловые, кедрово-еловые леса. Нередко. Лесообразователь. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Picea koraiensis Nakai: Крестов, 1993б – **Е. корейская**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной; долинные хвойно-широколиственные леса. Редко. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Picea obovata* Ledeb.: Шишкин, 1930 – **Е. сибирская. Ключ Островной, с. Дальний Кут; долинные хвойно-широколиственные леса. Редко. Дерево.

Род 4. **Сосна – *Pinus* L.**

Pinus koraiensis Siebold et Zuss.: Шишкин, 1930 – **С. корейская**, или **кедр корейский**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка, урочище Ороchonский Бог; речные долины, горные склоны, кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса, кедр-дубняки. Часто. Основной лесообразователь. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Сем. 19. **ТИСОВЫЕ – TAXACEAE**

Род 1. **Тис – Taxus L.**

Taxus cuspidata Siebold et Zucc.: Крестов, 1993б – **Т. остроконечный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, урочище Орочонский Бог; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Часто. Дерево. Вид включен в КК РФ, КК ПК и КС МСОП.

Сем. 20. **ЛИМОННИКОВЫЕ – SCHISANDRACEAE**

Род 1. **Лимонник – Schisandra Michx.**

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.: Шишкин, 1930 – **Л. китайский**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, между-речье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный; р. Малая Пихтовка; урочище Орочонский Бог; кедрово-широколиственные, лиственные леса. Часто. Многолетник. Лиана.

Сем. 21. **ХЛОРАНТОВЫЕ – CHLORANTHACEAE**

Род 1. **Хлорант – Chloranthus Sw.**

Chloranthus japonicus Siebold: Шишкин, 1930 – **Х. японский**. Ключи: Ковалевский, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский»; дубняки, лиственные, смешанные леса, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Сем. 22. **КУВШИНКОВЫЕ – NYMPHAEACEAE**

Род 1. **Кувшинка – Nymphaea L.**

Nymphaea tetragona* Georgi: Шишкин, 1930 – **К. четырёхгранная. Ключ Островной, с. Дальний Кут; водоемы со стоячей водой. Редко. Многолетник.

Сем. 23. **ЛУНОСЕМЯННИКОВЫЕ – MENISPERMACEAE**

Род 1. **Луносемянник – Menispermum L.**

Menispermum dauricum DC.: Шишкин, 1930 – **Л. даурский**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной; междуречье Арму – Большая Уссурка, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинны лиственные и кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник. Лиана.

Сем. 24. **БАРБАРИСОВЫЕ – BERBERIDACEAE**

Род 1. **Барбарис – Berberis L.**

Berberis amurensis Rupr.: Шишкин, 1930 – **Б. амурский**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка,

руч. Пасечный; кедрово-широколиственные, широколиственные леса. Часто. Кустарник.

Род 2. Стеблелист – *Caulophyllum* Michx.

Caulophyllum robustum Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. мощный**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, широколиственные леса, по долинам ключей. Нередко. Многолетник.

Род 3. Косоплодник – *Plagiorhegma* Maxim.

Plagiorhegma dubia Maxim. (как *Jeffersonia dubia* (Maxim.) Benth. et Hook.f. Baker et Moore: Шишкин, 1930) – **К. сомнительный**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Относительно часто. Многолетник.

Сем. 25. ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE

Род 1. Борец, или аконит, – *Aconitum* L.

– *Aconitum barbatum* Pers: Шишкин, 1930 – **Б. бородатый**. Ключ Островной, с. Дальний Кут; кустарниковые заросли. Редко. Многолетник. Для Приморского края этот вид не приводится (Кожевников, Кожевникова, 2014).

Aconitum desoulavyi* Kom.: Луферов, Стародубцев, 1995 (рис. 12, с. 49) – **Б. Десулави. Левобережье р. Большая Уссурка; каменистые склоны, опушки. Редко. Многолетник.

Aconitum macrorhynchum Turcz. ex Ledeb.: Шишкин, 1930 – **Б. крупноносый**. Пасечный руч; луга, болота. Нередко. Многолетник.

Aconitum sczukinii Turcz. (как *A. arcuatum* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Б. Щукина**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Трофимов, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный, р. Лесовозная, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; кедрово-еловые леса, надпойменные террасы. Часто. Многолетник.

Aconitum stoloniferum Worosch.: Луферов, Стародубцев, 1995 (рис. 14, с. 57) – **Б. столононосный**. Междуречье Арму – Большая Уссурка; хвойно-широколиственные, лиственные леса, речные долины. Относительно редко. Многолетник.

Aconitum volubile Pall. ex Koelle: Шишкин, 1930 – **Б. вьющийся**. Ключ Широкий; кустарниковые заросли, берега ручьев. Относительно редко. Многолетник.

Род 2. Воронец – *Actaea* L.

Actaea acuminata Wall.: Шишкин, 1930 – **В. приостренный**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Actaea erythrocarpa Fisch. – **В. красноплодный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев; р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Род 3. **Ветровник – Anemonidium** (Spach) Holub

Anemonidium dichotomum* (L.) Holub (как *Anemone dichotoma* L.: Куренцов, 1935) – **В. вильчатый. С. Дерсу; сухие разнотравные луга. Редко. Многолетник.

Род 4. **Ветровочник – Anemonoides** Mill.

Anemonoides amurensis (Korsh.) Holub – **В. амурский**. Ключи: Ковалевский, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Anemonoides extremiorientalis (Starod.) Starod. (как *A. umbrosa* С.А. Мей.: Крестов, 1993а) – **В. дальневосточный**. Ключи: Ковалевский, Островной; КПП 1 «Корейский»; дубняки. Часто. Многолетник.

Anemonoides udensis (Trautv. et С.А. Мей.) Holub (как *Anemone udensis* Trautv. et С.А. Мей.: Шишкин, 1930) – **В. удский**. Ключи: Ковалевский, Николаев, КПП 1 «Корейский»; междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Лесовозная; кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 5. **Водосбор – Aquilegia** L.

Aquilegia oxysepala Trautv. et С.А. Мей.: Шишкин, 1930 – **В. острочашечный**. Ключи: Ковалевский, Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский»; долинные листовые леса, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 6. **Арсеньевия – Arsenjevia** Starod.

Arsenjevia glabrata (Maxim.) Starod. (как *Anemone baikalensis* Turcz.: Шишкин, 1930) – **А. гладкая**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Яков ключ; руч. Пасечный; долинные листовые и кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 7. **Княжик – Atragene** L.

Atragene ochotensis Pall. – **К. охотский**, руч. Пасечный, кедрово-еловые леса, каменистые обнажения. Редко. Многолетник. Лиана.

Род 8. **Шелковник, или водяной лютик, – Batrachium** (DC.) S.F. Gray

Batrachium eradicatum Laest. ex Nyman – **Ш. неукореняющийся**. Ключ Островной; озера, водоемы. Нередко. Многолетник.

Род 9. **Калужница – Caltha** L.

Caltha membranacea Schipcz. – **К. перепончатая**. Ключ Кордонный, руч. Пасечный; долинный кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Caltha palustris L.: Шишкин, 1930 – **К. болотная**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, руч. Пасечный, р. Лесовозная; травяно-осоковые болота, долинные листовые леса. Часто. Многолетник.

Род 10. **Желтоцвет – Chrysocyathus** Falconer

Chrysocyathus amurensis (Regel et Radde) Holub (*Adonis amurensis* Regel et Radde) – **Ж. амурский, или адонис амурский**. Ключи: Ковалевский, Островной,

Яков; КПП 1 «Корейский»; дубняки, древесные заросли, скальные обнажения. Редко. Многолетник.

Род 11. **Клопогон** – *Cimicifuga* L.

Cimicifuga dahurica Huth: Шишкин, 1930 – **К. даурский**. Ключ Островной, дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Cimicifuga simplex Wormsk. ex DC.: Шишкин, 1930 – **К. простой**. ключи: Ковалевский, Широкий; дубняки, долинные кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 12. **Ломонос** – *Clematis* L.

Clematis brevicaudata DC.: Шишкин, 1930 – **Л. короткохвостный**. Ключи: Островной, Широкий, урочище Ороchonский Бог; кустарниковые заросли, галечниковые отложения. Редко. Многолетник. Лиана.

Clematis fusca Turcz.: Шишкин, 1930 – **Л. бурый**. Ключи: Кордонный, Островной, КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник. Лиана.

Clematis mandshurica Rupr.: Шишкин, 1930 – **Л. маньчжурский**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», р. Лесовозная; дубняки, кустарниковые заросли, скалистые обнажения. Часто. Лиана.

Род 13. **Живокость** – *Delphinium* L.

Delphinium maackianum Regel: Шишкин, 1930 – **Ж. Маака**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; скалистые обнажения, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 14. **Энемион** – *Enemion* Raf.

Enemion raddeanum Regel – **Э. Радде**. Ключи: Ковалевский, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, Щучий затон, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 15. **Шибатерантис** – *Eranthis* Salisb.

Eranthis stellata Maxim. – **Ш. звездчатый**, или **весенник звездчатый**. Ключи: Ковалевский, Яков; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Род 16. **Лютик** – *Ranunculus* L.

Ranunculus chinensis Bunge: Шишкин, 1930 – **Л. китайский**. КПП 1 «Корейский», антропогенные местообитания, речные наносы, луга. Редко. Многолетник.

Ranunculus japonicus Thunb.: Шишкин, 1930 – **Л. японский**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные и сырые луга, антропогенные местообитания. Относительно часто. Многолетник.

Ranunculus repens L.: Шишкин, 1930 – **Л. ползучий**. Ключи: Кордонный, Широкий, Яков; урочище Ороchonский Бог; кустарниковые заросли, сырые луга. Часто. Многолетник.

Род 17. **Василистник – *Thalictrum* L.**

Thalictrum contortum L. – **В. скрученный.** Ключ Кордонный, КПП 1 «Корейский»; дубняки, ясенево-ольховые леса, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Thalictrum filamentosum Maxim.: Шишкин, 1930 – **В. нитчатый.** Ключи: Ковалевский, Михайловский, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Ороchonский Бог, руч. Пасечный; междуречье Арму – Большая Уссурка, реки Малая Пихтовка, Лесовозная; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса, дубняки. Относительно часто. Многолетник.

Thalictrum minus L.: Шишкин, 1930 – **В. малый.** КПП 1 «Корейский», бассейн р. Лесовозная; пойменные и суходольные луга, долинные лиственные леса, кустарниковые заросли, скалистые обнажения. Нередко. Многолетник.

Thalictrum ussuriense Lufegov (*T. simplex* auct.) (как *T. simplex* L.: Шишкин, 1930) – **В. уссурийский.** Ключ Островной; луга. Часто. Многолетник.

Род 18. **Купальница – *Trollius* L.**

Trollius ledebourii Bunge: Шишкин, 1930 – **К. Ледебуря.** КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; дубняки, сырые луга. Нередко. Многолетник.

Сем. 26. **ДЫМЯНКОВЫЕ – FUMARIACEAE**

Род 1. **Хохлатка – *Corydalis* Vent.**

Corydalis ambigua Cham. et Schltl.: Шишкин, 1930 – **Х. сомнительная.** Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Corydalis gigantea Trautv. et S.A. Mey. – **Х. гигантская.** р. Лесовозная; долинные хвойно-широколиственные леса, берега водотоков. Нередко, образует заросли. Массово встречается на прилегающей к парку территории (р. Заманиха). Многолетник.

Corydalis ochotensis Turcz.: Шишкин, 1930 – **Х. охотская.** Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», р. Арму; долинные лиственные леса, берега ручьев. Нередко. Многолетник.

Corydalis remota Fisch. – **Х. расставленная.** Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; долинные лиственные леса, галечниковые отложения. Редко. Многолетник.

Corydalis repens Mandl et Muehd. – **Х. ползучая.** р. Лесовозная; долинные кедрово-широколиственные, широколиственные леса. Относительно редко. Многолетник.

Corydalis speciosa Maxim. – **Х. прекрасная.** Ключи: Островной, Широкий, КПП 1 «Корейский», реки Малая Пихтовка, Лесовозная; скалистые склоны, галечниковые отложения, дороги. Нередко. Двулетник.

Сем. 27. **МАКОВЫЕ – PAPAVERACEAE**

Род 1. **Чистотел – *Chelidonium* L.**

Chelidonium asiaticum (Hara) Krachulkova (как *C. majus* L.: Шишкин, 1930) – **Ч. азиатский.** Ключи: Ковалевский, Кордонный, Островной, Трофимов, Широкий;

урочище Орочонский Бог; руч. Пасечный; междуречье Арму – Большая Уссурка, Лаулинский прижим, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; лиственные и хвойно-широколиственные леса. Нередко. Двулетник.

Род 2. **Лесной мак** – *Hylomecon* Maxim.

Hylomecon vernalis Maxim. (как *H. japonica* (Thunb.) Prantl: Шишкин, 1930) – **Л. м. весенний**. Ключи: Ковалевский, Островной, Николаев, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса, дубняки. Часто. Многолетник.

Род 3. **Мак** – *Papaver* L.

Papaver amurense (N. Busch) Tolm. – **М. амурский**. Долина р. Большая Уссурка; галечниковые отложения. Редко. Многолетник.

Сем. 28. **ИЛЬМОВЫЕ, или ВЯЗОВЫЕ, – ULMACEAE**

Род 1. **Ильм** – *Ulmus* L.

Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.: Шишкин, 1930 – **И. японский, или долинный**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной; КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, реки Арму, Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные кедрово-широколиственные, ясенево-ильмовые леса, берега ручьев. Относительно часто. Лесообразователь. Дерево.

Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr (как *U. heterophylla* Mayr: Шишкин, 1930) – **И. горный, или лопастный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, широколиственные леса. Нередко. Дерево.

Сем. 29. **КРАПИВОВЫЕ – URTICACEAE**

Род 1. **Постенница** – *Parietaria* L.

Parietaria micrantha Ledeb. (как *P. debilis* var. *micrantha* Wedd.: Шишкин, 1930) – **П. мелкоцветная**. Ключ Широкий; скалистые обнажения. Редко. Однолетник.

Род 2. **Пилея** – *Pilea* Lindl.

Pilea mongolica Wedd. (как *P. pumila* A. Gray: Шишкин, 1930) – **П. монгольская**. Ключи: Кордонный, Широкий, междуречье Арму – Большая Уссурка; кустарниковые заросли, берега ручьев, сырые леса. Относительно часто. Однолетник.

Род 3. **Крапива** – *Urtica* L.

Urtica angustifolia Fisch.: Шишкин, 1930 – **К. узколистная**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Орочонский Бог, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные лиственные, хвойно-широколиственные леса, берега ручьев и ключей. Относительно часто. Многолетник.

Urtica laetevirens Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. светло-зеленая**. Ключи: Кордонный, Островной, Широкий; р. Лесовозная; кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Сем. 30. **БУКОВЫЕ – FAGACEAE**

Род 1. **Дуб – Quercus L.**

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.: Шишкин, 1930 – **Д. монгольский**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный; реки Арму, Малая Пихтовка, Лесовозная; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Лесообразователь. Дерево.

Сем. 31. **БЕРЕЗОВЫЕ – BETULACEAE**

Род 1. **Ольха – Alnus Mill.**

Alnus hirsuta Turcz.: Шишкин, 1930 – **О. волосистая**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной; КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный; смешанные леса, ольшанники, берега рек. Нередко. Лесообразователь. Дерево.

Род 2. **Береза – Betula L.**

Betula costata Trautv.: Шишкин, 1930 – **Б. ребристая**, или **желтая**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный; кедрово-широколиственные леса. Довольно часто. Лесообразователь. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Betula dahurica Pall.: Шишкин, 1930 – **Б. даурская**. КПП 1 «Корейский», ключ Островной; дубняки, дубово-черноберезовые, смешанные леса. Часто. Лесообразователь. Дерево.

Betula lanata (Regel) V.N. Vassil. (как *B. ermanii* Cham.: Шишкин, 1930) – **Б. шерстистая**. Ключи: Островной, Трофимов, в верхнем поясе гор, пихтово-еловые, каменноберезовые леса. Нередко. Лесообразователь. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Betula ovalifolia Rupr.: Шишкин, 1930 – **Б. овальнолистная**. Пасечный ручей; сырые разнотравные луга, заболоченные берега. Редко. Кустарник.

Betula platyphylla Sukaczew (как *B. mandshurica* (Regel) Nakai: Шишкин, 1930) – **Б. плосколистная**. Ключи: Ковалевский, Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог, руч. Пасечный; белоберезовые и смешанные леса. Часто. Лесообразователь. Дерево.

Род 3. **Лещина – Corylus L.**

Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.: Шишкин, 1930 – **Л. разнолистная**. Островной ключ, КПП 1 «Корейский»; дубняки, дубово-черноберезовые леса, луга. Часто. Кустарник.

Corylus mandshurica Maxim.: Шишкин, 1930 – **Л. маньчжурская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский, урочище Орочонский Бог, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; дубняки, смешанные и лиственные леса, кустарниковые заросли. Относительно часто. Кустарник.

Сем. 32. **ОРЕХОВЫЕ – JUGLANDACEAE**

Род 1. **Орех – Juglans L.**

Juglans mandshurica Maxim.: Шишкин, 1930 – **О. маньчжурский**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», с. Дерсу, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный; долинные кедрово-широколиственные и лиственные леса, вдоль дорог. Относительно часто. Дерево.

Сем. 33. **ГВОЗДИКОВЫЕ – CARYOPHYLLACEAE**

Род 1. **Ясколка – Cerastium L.**

Cerastium holosteoides* Fries (как *C. vulgatum* L.: Шишкин, 1930) – **Я. дернистая. Островной ключ, антропогенные местообитания, обочины дорог. Часто. Однолетник. Заносный вид.

Cerastium pauciflorum Stev. ex Ser. (как *C. pilosum* var. *amurense* Regel: Шишкин, 1930) – **Я. малоцветковая**. Островной ключ, КПП 1 «Корейский»; дубняки, заросли кустарников. Часто. Многолетник.

Род 2. **Гвоздика – Dianthus L.**

Dianthus chinensis L.: Шишкин, 1930 – **Г. китайская**. Островной ключ, Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, каменистые россыпи. Нередко. Многолетник.

Род 3. **Бахромчатолепестник – Fimbripetalum (Turcz.) Ikonn.**

Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. (как *Stellaria radians* L.: Шишкин, 1930) – **Б. лучистый**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Островной, Яков; КПП 1 «Корейский»; руч. Пасечный, кустарниковые заросли, по берегам рек. Часто. Многолетник.

Род 4. **Качим – Gypsophila L.**

Gypsophila pacifica Kom. – **К. тихоокеанский**. Островной ключ, КПП 1 «Корейский»; каменистые осыпи. Редко. Многолетник.

Род 5. **Зорька – Lychnis L.**

Lychnis fulgens Fisch.: Шишкин, 1930 – **З. сверкающая**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, луга, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 6. **Мерингия – Moehringia L.**

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl: Шишкин, 1930 – **М. бокоцветная**. Ключи: Никиткин, Николаев, Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 7. Новоуссурия – *Neoussuria* Tzvel.

Neoussuria firma (Siebold et Zucc.) Tzvel. (как *Silene firma* Siebold et Zucc.: Шишкин, 1930) – **Н. крепкая, или смолевка крепкая**. КПП 1 «Корейский», Островной ключ; дубняки, кустарниковые заросли. скалистые обнажения. Редко. Двухлетник.

Род 8. Песколюбочка – *Psammophiliella* Ikonn.

Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn.: Павлова, Безделева, 1996 (рис. 28, с. 97) – **П. постенная. С. Дальний Кут, с. Дерсу, антропогенные местообитания. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 9. Звездчаточка – *Pseudostellaria* Pax

Pseudostellaria sylvatica (Maxim.) Pax (как *Krascheninnikowia sylvatica* Maxim.: Шишкин, 1930) – **З. лесная**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной; междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные и лиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 10. Смолёвка – *Silene* L.

Silene foliosa Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. олиственная**. КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим, урочище Ороchonский Бог, ключ Островной, скалистые обнажения. Часто. Многолетник.

Silene repens* Patr.: Шишкин, 1930 – **С. ползучая. Островной ключ; кустарниковые заросли, каменистые местообитания. Редко. Многолетник.

Род 11. Торица – *Spergula* L.

Spergula arvensis* L.: Павлова, Безделева, 1996 (рис. 7, с. 31) – **Т. полевая. С. Дерсу; антропогенные местообитания. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 12. Звездчатка – *Stellaria* L.

Stellaria bungeana Fenzl. – **З. Бунге**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; реки Малая Пихтовка, Лесовозная; долинные кедрово-широколиственные леса, дубняки. Нередко. Многолетник.

Stellaria graminea L.: – **З. злаковидная**. С. Дерсу, антропогенные местообитания. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Stellaria filicaulis Makino (как *S. jaluana* Nakai: Шишкин, 1930) – **З. тонкостебельная**. Ключи: Никиткин, Николаев, Островной, Широкий; болота, сырые и суходольные луга. Относительно редко. Многолетник.

Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. – **З. длиннолистная**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; КПП 1 «Корейский»; кустарниковые прибрежные заросли. Нередко. Многолетник.

Stellaria media (L.) Vill. – **З. средняя, или мокрица**. С. Дерсу; антропогенные местообитания, луга, у дорог. Относительно часто. Однолетник. Заносный вид.

Сем. 34. **МАРЕВЫЕ – CHENOPODIACEAE**

Род 1. **Безвкусица – Axyris L.**

Axyris amaranthoides L.: Шишкин, 1930 – **Б. ширицевидная**. Островной ключ; антропогенные местообитания, речные галечниковые наносы. Редко. Однолетник.

Род 2. **Марь – Chenopodium L.**

Chenopodium album L.: Шишкин, 1930 – **М. белая**. КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог; дубняки, антропогенные местообитания, приречные галечники. Редко. Однолетник.

Сем. 35. **СПОРЫШОВЫЕ – POLYGONACEAE**

Род 1. **Щавель – Acetosa Mill.**

Acetosa pratensis Mill. (как *Rumex acetosa* L.: Шишкин, 1930) – **Щ. луговой**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу, руч. Пасечный; кустарниковые заросли, суходольные и сырые луга, обочины дорог. Нередко. Многолетник.

Род 2. **Хилокаликс – Chylocalyx Hassk. et Miq.**

Chylocalyx perfoliatus* (L.) Hassk. ex Miq. (как *Polygonum perfoliatum* L.: Шишкин, 1930) – **Х. пронзеннолистный. Ключ Островной; долинные кустарниковые заросли, по берегам ручьев, у скалистых обнажений, антропогенные местообитания. Относительно редко. Однолетник.

Род 3. **Горец – Persicaria Mill.**

Persicaria hydropiper* (L.) Spach (как *Polygonum hydropiper* L.: Шишкин, 1930) – **Г. перечный. Островной ключ, с. Дальний Кут; антропогенные местообитания. Относительно редко. Однолетник.

Persicaria lapathifolia* (L.) S.F. Gray (как *Polygonum tomentosum* Schrank: Шишкин, 1930) – **Г. развесистый. Островной ключ, с. Дальний Кут; антропогенные местообитания, речные наносы, вдоль дорог. Часто. Однолетник.

Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. (как *Polygonum posumbu* Buch.-Ham. ex D. Don: Шишкин, 1930) – **Г. длиннощетиновый**. Островной ключ, с. Дальний Кут; приречные кустарниковые заросли. Редко. Однолетник.

Род 4. **Спорыш – Polygonum L.**

Polygonum aviculare L.: Шишкин, 1930 – **С. птичий**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; антропогенные местообитания, дороги. Относительно часто. Однолетник.

Род 5. **Щавельник – Rumex L.**

Rumex crispus L. – **Щ. курчавый**. КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог; антропогенные местообитания. Относительно редко. Двулетник.

Rumex patientia* L.: Цвелев, 1989 (рис. 11, с. 34) – **Щ. шпинатный. С. Дерсу; антропогенные местообитания. Нередко. Многолетник.

Род 6. **Колючестебельник – Truellum Houtt.**

Truellum sagittatum (L.) Soják (как *Polygonum sagittatum* L.: Шишкин, 1930) – **К. стрелолистный**. Островной ключ; по берегам рек и ручьев, сырым лугам, у болот. Часто. Однолетник.

Truellum thunbergii (Siebold et Zucc.) Soják (как *Polygonum thunbergii* Siebold et Zucc.: Шишкин, 1930) – **К. Тунберга**. Ключи: Кордонный, Широкий; урочище Орочонский Бог; руч. Пасечный; антропогенные местообитания, долинные листовенные и кедрово-широколиственные леса, сырые луга, берега ручьев, озер. Очень часто. Однолетник.

Сем. 36. **ПИОНОВЫЕ – PAEONIACEAE**

Род 1. **Пион – Paeonia L.**

Paeonia lactiflora Pall. (как *P. albiflora* Pall.: Шишкин, 1930) – **П. молочнов-ветковый**. КПП 1 «Корейский», ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли, луга. Редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ и КК ПК.

Paeonia obovata Maxim.: Шишкин, 1930 – **П. обратнойцевидный**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, р. Лесовозная; дубняки, кедрово-еловые, кедрово-широколиственные леса. Относительно редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ и КК ПК.

Сем. 37. **ЗВЕРОБОЕВЫЕ – HYPERICACEAE**

Род 1. **Звербой – Hypericum L.**

Hypericum ascyron L.: Шишкин, 1930 – **З. большой**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Островной, руч. Пасечный; суходольные и сырые луга, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Hypericum attenuatum* Choisy: Куренцов, 1935 – **З. оттянутый. По берегу р. Большая Уссурка; каменистые склоны. Редко. Многолетник.

Род 2. **Трехжелезник – Triadenum Raf.**

Triadenum japonicum (Bl.) Makino: Шишкин, 1930 – **Т. японский**. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; болота, берега стариц, сырые луга. Редко. Многолетник.

Сем. 38. **ФИАЛКОВЫЕ – VIOLACEAE**

Род 1. **Фиалка – Viola L.**

Viola acuminata Ledeb. (как *V. acuminata* var. *austro-ussuriensis* (W. Becker) Kitag.: Шишкин, 1930) – **Ф. приостренная**. Ключи: Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский», р. Лесовозная; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Viola amurica W. Becker – **Ф. амурская**. Островной ключ; сырые луга, берега ручьев. Относительно редко. Многолетник.

Viola brachysepala Maxim. – **Ф. короткочашелистиковая**. Островной ключ; дубняки. Редко. Многолетник.

Viola collina Besser: Шишкин, 1930 – **Ф. холмовая**. Островной ключ; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Viola epipsiloides Á. Löve et D. Löve. – **Ф. сверху-голенькая**. Островной ключ; по берегам рек и ручьев. Редко. Многолетник.

Viola mandshurica W. Becker – **Ф. маньчжурская**. Ключи: Никиткин, Островной, КПП 1 «Корейский», дубняки, антропогенные местообитания, луга. Нередко. Многолетник.

Viola patrinii Ging.: Шишкин, 1930 – **Ф. Патрэна**. КПП 1 «Корейский», сырые и суходольные луга, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Viola sacchalinesis H. Boissieu: Шишкин, 1930 – **Ф. сахалинская**. р. Малая Пихтовка; лиственные и кедрово-широколиственные леса, щебнистые и каменистые склоны. Редко. Многолетник.

Viola selkirkii Pursh ex Goldie: Шишкин, 1930 – **Ф. Селькирка**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Viola verecunda A. Gray: Шишкин, 1930 – **Ф. скромная**. Островной ключ; болота, берега ручьев. Относительно часто. Многолетник.

Сем. 39. ТЫКВОВЫЕ – CUCURBITACEAE

Род 1. Схизопепон – *Schizopepon* Maxim.

Schizopepon bryoniifolius Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. бриониелистный**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Николаев, Островной, Широкий; междуречье Арму – Большая Уссурка, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Однолетник.

Сем. 40. КАПУСТОВЫЕ – BRASSICACEAE

Род 1. Резуха – *Arabis* L.

Arabis pendula L.: Шишкин, 1930 – **Р. понижающая**. Урочище Ороchonский Бог; дубняки, антропогенные местообитания. Редко. Многолетник.

Arabis sagittata (Bertol.) DC. (как *A. hirsuta* Scop.: Шишкин, 1930) – **Р. стреловидная**. Островной ключ; антропогенные местообитания. Редко. Многолетник.

Род 2. Сурепка – *Barbarea* R. Fr.

Barbarea orthoceras Ledeb.: Шишкин, 1930 – **С. пряморогая**. Урочище Ороchonский Бог, КПП 1 «Корейский», Широкий ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, галечниковые отложения, у дорог. Редко. Двулетник.

Род 3. Капуста – *Brassica* L.

Brassica juncea* (L.) Czern.: Шишкин, 1930 – **К. сизая. Ключ Островной, с. Дальний Кут; антропогенные местообитания. Относительно редко. Двулетник. Заносный вид.

Род 4. Пастушья сумка – *Capsella* Medic.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.: Шишкин, 1930 – **П. с. обыкновенная**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; антропогенные местообитания, вдоль дорог. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 5. Сердечник – *Cardamine* L.

Cardamine leucantha (Tausch.) O.E. Schulz: Шишкин, 1930 – **С. белоцветковый**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Островной, Трофимов, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая

Уссурка, руч. Пасечный; реки Малая Пихтовка, Лесовозная; долинные кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Cardamine macrophylla Willd.: Шишкин, 1930 – **С. крупнолистный**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков, р. Малая Пихтовка; по берегам горных ручьев. Нередко. Многолетник.

Cardamine prorepens Fisch. – **С. ползучий**. Ключи: Ковалевский, Островной; по берегу р. Большая Уссурка, руч. Пасечный, берега горных ручьев и рек. Нередко. Многолетник.

Cardamine regeliana Miq.: Шишкин, 1930 – **С. Регеля**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Яков; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; берега рек, ключей и ручьев. Нечасто. Многолетник.

Род 6. **Конрингия** – *Conringia* (Heist.) Pers.

Conringia orientalis (L.) Dumort. – **К. восточная**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, луга. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 7. **Донтостемон** – *Dontostemon* Andrz. ex С.А. Меу.

Dontostemon dentatus (Bunge) С.А. Меу. ex Ledeb.: Шишкин, 1930 – **Д. зубчатый**. КПП 1 «Корейский»; сухие скалы. Редко. Однолетник или двулетник.

Dontostemon hispidus Maxim.: Шишкин, 1930 – **Д. волосистый**. КПП 1 «Корейский», сухие скалы, галечники. Редко. Однолетник.

Род 8. **Крупка** – *Draba* L.

Draba nemorosa L.: Шишкин, 1930 – **К. дубравная**. КПП 1 «Корейский»; антропогенно измененные участки, речные отложения. Нередко. Однолетник.

Род 9. **Жерушник** – *Rorippa* Scop.

Rorippa palustris (L.) Besser (как *Nasturtium palustre* DC.: Шишкин, 1930) – **Ж. болотный**. Ключ Островной, с. Дальний Кут; антропогенные местообитания, обочины дорог, сырые луга, берега водоемов. Нередко. Многолетник.

Род 10. **Вяжечка** – *Turritis* (Tourn.) L.

Turritis glabra L. – **В. голая**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, луга. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Сем. 41. **ИВОВЫЕ** – SALICACEAE

Род 1. **Кореянка** – *Chosenia* Nakai

Chosenia arbutifolia (Pall.) A.K. Skvortsov (как *C. macrolepis* (Turcz.) Kom.: Шишкин, 1930) – **К. земляничколистная**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; по берегам р. Большая Уссурка; речные отложения. Часто образует чистые древостои. Лесообразователь. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Род 2. **Тополь** – *Populus* L.

Populus koreana Rehd. – **Т. корейский**. Ключи: Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский»; долинные лиственные леса. Часто. Дерево.

Populus maximowiczii A. Henry: Шишкин, 1930 – **Т. Максимовича**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Широкий, Яков; КПП 1 «Корейский»; реки: Арму, Малая Пихтовка; урочище Ороchonский Бог; берега рек, долинные лиственные леса. Относительно часто. Дерево.

Populus tremula L.: Шишкин, 1930 – **Т. дрожащий, или осина**. Водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, ключи: Ковалевский, Островной, Яков; Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; урочище Ороchonский Бог, долинные лиственные и смешанные леса, речные долины. Часто. Лесообразователь. Дерево.

Род 3. **Ива – Salix L.**

Salix brachypoda (Trautv. et C.A. Mey.) Kom. (как *S. repens* L.: Шишкин, 1930) – **И. коротконожковая**. Ключ Островной; сырые луга и леса, окраины болот. Часто. Кустарник.

Salix caprea L.: Шишкин, 1930 – **И. козья**. Ключи: Ковалевский, Островной; КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка, р. Лесовозная; кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли, антропогенные местообитания, опушки дубняков. Нередко. Кустарник.

Salix gracilistyla Miq. – **И. тонкостолбиковая**. Ключи: Никиткин, Николаев, Островной, Широкий; антропогенные местообитания, берега ручьев, ключей. Нередко. Кустарник.

Salix myrtilloides L.: Шишкин, 1930 – **И. черничная**. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; болота, сырые луга. Нередко. Кустарник.

Salix pierotii Miq. – **И. Пьеро**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог; ивняки, сырые и суходольные луга. Нередко. Дерево.

Salix rorida Laksch.: Шишкин, 1930 – **И. росистая**. Ключ Островной, окрестности кордона «Корейский»; берега ручьев, антропогенные местообитания. Нередко. Дерево.

Salix schwerinii E. Wolf – **И. Шверина**. Ключи: Островной, Широкий, урочище Ороchonский Бог, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Лесовозная; берега ручьев, антропогенные местообитания. Нередко. Кустарник.

Salix taraiensis Kimura – **И. тарайкинская**. КПП 1 «Корейский»; опушки дубняков, кустарниковые заросли, антропогенные местообитания. Относительно редко. Дерево.

Сем. 42. АКТИНИДИЕВЫЕ – ACTINIDIACEAE

Род 1. **Актинидия – Actinidia Lindl.**

Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim.: Шишкин, 1930 – **А. коломикта**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ; руч. Пасечный; реки Малая Пихтовка, Лесовозная; урочище Ороchonский Бог; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Нередко. Лиана.

Сем. 43. ВЕРЕСКОВЫЕ – ERICACEAE

Род 1. **Болотный мирт – Chamaedaphne Moench**

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench: Шишкин, 1930 – **Б. м. чашечный**. С. Дальний Кут, ключ Островной, р. Малая Пихтовка; болота, редколесья. Редко. Кустарник или кустарничек.

Род 2. Багульник – *Ledum* L.

Ledum hypoleucum Kom.: Шишкин, 1930 – **Б. подбел.** Ключи: Николаев, Островной, с. Дальний Кут, р. Малая Пихтовка; долинные лиственничники, смешанные леса. Редко. Кустарник.

Ledum palustre L.: Шишкин, 1930 – **Б. болотный.** Ключ Островной, р. Малая Пихтовка, болота. Редко. Кустарничек.

Род 3. Бокоцветка – *Orthilia* Raf.

Orthilia secunda (L.) House: Крестов, 1993б – **Б. однобокая.** Ключ Ковалевский, р. Арму, кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Редко. Полукустарничек. Многолетник.

Род 4. Клюква – *Oxycoccus* Hill

Oxycoccus palustris Pers.: Шишкин, 1930 – **К. болотная.** Ключи: Островной, Ягодный (бассейн Арму), с. Дальний Кут, р. Малая Пихтовка; лиственничники, болота. Редко. Кустарничек.

Род 5. Грушанка – *Pyrola* L.

Pyrola minor* L.: Крестов, 1993б – **Г. малая. Бассейн р. Большая Уссурка, кедр-дубняки. Редко. Многолетник.

Pyrola renifolia Maxim. – **Г. почколистная.** р. Малая Пихтовка; пихтово-еловые леса. Редко. Многолетник.

Pyrola rotundifolia L. – **Г. круглолистная.** Ключ Никиткин, КПП 1 «Корейский»; дубняки, осыпи. Редко. Многолетник.

Pyrola japonica Klenze ex Alef. (как *P. subaphylla* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Г. японская,** КПП 1 «Корейский»; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Род 6. Брусника – *Rhodococcum* (Rupr.) Avrorin

Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin (как *Vaccinium vitis-idaea* L.: Шишкин, 1930) – **Б. обыкновенная,** с. Дальний Кут, ключи: Островной, Николаев, р. Малая Пихтовка; лиственничники, кедрово-лиственничные, кедрово-еловые леса. Редко. Кустарничек.

Род 7. Рододендрон – *Rhododendron* L.

Rhododendron mucronulatum Turcz. (как *R. dauricum* subsp. *mucronulatum* (Turcz.) Vorosch.: Шишкин, 1930) – **Р. остроконечный.** Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, Лаулинский прижим, ключ Островной; каменистые гребни дубняков, кедр-дубняков. Нередко. Кустарник.

Rhododendron mucronulatum* subsp. *sichotense* (Pojark.) A.P. Khokhr. (как *R. sichotense* Pojark.: Крестов, 1993а) – **Р. сихотинский. Ключ Николаев; лиственничники, каменистые осыпи. Редко. Кустарник.

Род 8. Голубика – *Vaccinium* L.

Vaccinium uliginosum L. – **Г. болотная,** или **гонобобель.** Р. Малая Пихтовка; мари, болота. Редко. Кустарник.

Сем. 44. ПЕРВОЦВЕТОВЫЕ – PRIMULACEAE

Род 1. Проломник – *Androsace* L.

Androsace filiformis Retz.: Шишкин, 1930 – **П. нитевидный**. Ключи: Никиткин, Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, вдоль дорог. Нередко. Однолетник.

Род 2. Вербейник – *Lysimachia* L.

Lysimachia clethroides Duby: Шишкин, 1930 – **В. ландышевый**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Lysimachia davurica Ledeb.: Шишкин, 1930 – **В. даурский**. КПП 1 «Корейский», ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 3. Наумбургия, или кизляк, – *Naumburgia* Moench

Naumburgia thyrsoflora (L.) Rchb.: Шишкин, 1930 – **Н. кистецветковая**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов; КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; лиственничники, окраины болот, берега ручьев, ключей, рек. Очень часто. Многолетник.

Род 4. Седмичник – *Trientalis* L.

Trientalis europaea L.: Шишкин, 1930 – **С. европейский**. Ключи: Никиткин, Островной, Яков, водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; кедрово-еловые, кедрово-лиственничные леса. Относительно часто. Многолетник.

Сем. 45. ЛИПОВЫЕ – TILIACEAE

Род 1. Липа – *Tilia* L.

Tilia amurensis Rupr.: Шишкин, 1930 – **Л. амурская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Островной, Николаев, Трофимов, Яков; КПП 1 «Корейский», междуречье Арму и Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; дубняки, липняки, кедрово-широколиственные леса. Часто. Лесообразователь. Дерево.

Tilia mandshurica Rupr.: Шишкин, 1930 – **Л. маньчжурская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Островной; КПП 1 «Корейский», реки Арму, Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Встречается реже, чем предыдущий вид. Дерево.

Tilia taquetii С.К. Schneid. – **Л. Таке**. Ключи: Левый Михайловский, Островной; КПП 1 «Корейский»; реки Арму, Малая Пихтовка; дубняки, липняки, кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Часто. Дерево.

Сем. 46. МОЛОЧАЕВЫЕ – EUPHORBIACEAE

Род 1. Акалифа – *Acalypha* L.

Acalypha australis* L.: Шишкин, 1930 – **А. южная, с. Дальний Кут, ключ Островной; антропогенные местообитания. Редко. Однолетник.

Род 2. Молочай – *Euphorbia* L.

Euphorbia discolor Ledeb. – **М. двуцветный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Euphorbia esula* L.: Шишкин, 1930 – **М. острый. Ключ Островной, с. Дальний Кут; скалистые обнажения, речные наносы. Редко. Многолетник.

Euphorbia lucorum Rupr. ex Maxim.: Шишкин, 1930 – **М. роцовой**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки. Относительно часто. Многолетник.

Euphorbia taquetii H. Lév. et Vaniot – **М. Такэ**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Сем. 47. ГОРТЕНЗИЕВЫЕ – HYDRANGEACEAE

Род 1. Чубушник – *Philadelphus* L.

Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.: Шишкин, 1930 – **Ч. тонколистный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ; урочище Ороchonский Бог; руч. Пасечный; реки: Арму, Малая Пихтовка, Лесовозная; хвойно-широколиственные леса. Часто. Кустарник.

Сем. 48. КАМНЕЛОМКОВЫЕ – SAXIFRAGACEAE

Род 1. Астильбе – *Astilbe* Buch.-Ham. ex D. Don

Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav.: Шишкин, 1930 – **А. китайская**. Ключ Островной, долинные лиственные леса, кустарниковые заросли, сырые луга. Часто. Многолетник.

Род 2. Бадан – *Bergenia* Moench

Bergenia pacifica Kom.: Крестов, 1993а – **Б. тихоокеанский**. Ключ Николаев; кедрово-еловые, кедрово-лиственничные леса, выходы скальных пород. Очень редко. Многолетник. Вид включен в КК ПК.

Род 3. Селезёночник – *Chrysosplenium* L.

Chrysosplenium flagelliferum F. Schmidt: Шишкин, 1930 – **С. усатый**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, р. Малая Пихтовка; долинные лиственные леса, берега ручьев. Относительно часто. Многолетник.

Chrysosplenium ramosum Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. ветвистый**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; КПП 1 «Корейский»; руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные лиственные и кедрово-широколиственные леса, берега ручьев, ключей. Относительно часто. Многолетник.

Chrysosplenium pilosum Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. волосистый**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий; междуречье Арму – Большая Уссурка, Широкий, р. Малая Пихтовка; долинные лиственные леса, берега ручьев. Относительно часто. Многолетник.

Chrysosplenium sibiricum (Ser.) A.P. Khokhr. – **С. сибирский**. Ключи: Ковалевский, Островной; берега ручьев, долинные леса. Редко. Многолетник.

Род 4. Мителла – *Mitella* L.

Mitella nuda L.: Шишкин, 1930 – **М. голая**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка,

реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, лиственные леса. Нередко. Многолетник.

Сем. 49. **ТОЛСТЯНКОВЫЕ – CRASSULACEAE**

Род 1. **Живучник**, или **очиток**, – **Aizopsis** Grulich

Aizopsis aizoon (L.) Grulich (как *Sedum aizoon* L.: Шишкин, 1930) – **Ж. живучий**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Aizopsis middendorffiana (Maxim.) Grulich (как *Sedum middendorffianum* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Ж. Миддендорфа**. Урочище Орочонский Бог, Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский», скалы и каменные россыпи, обращенные к р. Большая Уссурка. Часто. Многолетник.

Aizopsis selskiana* (Regel et Maack) Grulich (как *Sedum selskianum* Regel et Maack: Куренцов, 1935) – **Ж. Сельского. Бассейн р. Большая Уссурка; каменные обнажения. Нередко. Многолетник.

Род 2. **Очитник** – **Hylotelephium** H. Ohba

Hylotelephium pallescens (Freyn) H. Ohba – **О. бледнеющий**. Пасечный руч., р. Малая Пихтовка; луга, лиственничные леса, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Hylotelephium triphyllum* (Haw.) Holub (как *Sedum telephium* L.: Шишкин, 1930) – **О. трехлистный. Ключ Островной; луга. Редко. Многолетник.

Hylotelephium viviparum (Maxim.) H. Ohba: Шишкин, 1930 – **О. живородящий**. КПП 1 «Корейский», дубняки, крупнокаменистые осыпи и скальные выходы. Относительно редко. Многолетник.

Род 3. **Горноколосник** – **Orostachys** Fisch.

Orostachys spinosa (L.) Sweet (как *Cotyledon spinosa* L.: Шишкин, 1930) – **Г. колючий**. Ключ Широкий, скалы и скалистые обнажения. Редко. Многолетник.

Orostachys malacophylla* (Pall.) Fisch. (как *Cotyledon malacophylla* Pall.: Шишкин, 1930) – **Г. мягколистный. Ключ Островной; скалы. Редко. Многолетник.

Сем. 50. **КРЫЖОВНИКОВЫЕ – GROSSULARIACEAE**

Род 1. **Крыжовник** – **Grossularia** Mill.

Grossularia burejensis (F. Schmidt) Berger – **К. буреинский**. Ключи: Широкий, Яков; урочище Орочонский Бог, р. Лесовозная; долинные хвойно-широколиственные леса. Часто. Кустарник.

Род 2. **Смородина** – **Ribes** L.

– *Ribes latifolium* Jancz.: Шишкин, 1930 – **С. широколистная**. Ключ Островной, смешанные леса предгорий, у сырых скал. Редко. Кустарник. Для Приморского края этот вид не приводится (Кожевников, Кожевникова, 2014).

Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom.: Шишкин, 1930 – **С. маньчжурская**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, Яков; КПП 1 «Корейский»; урочище Орочонский Бог;

руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Нередко. Кустарник.

Ribes maximoviczianum Kom.: Шишкин, 1930 – С. Максимовича. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, урочище Ороchonский Бог; р. Малая Пихтовка; руч. Пасечный; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Нередко. Кустарник.

Ribes palczewskii (Jancz.) Rojark. – С. Пальчевского. Ковалевский ключ; Пасечный ручей, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Редко. Кустарник.

Ribes pallidiflorum Rojark.: – С. бледноцветковая. Ключи: Кордонный, Яков, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; долинные кедрово-широколиственные леса. Нередко. Кустарник.

Ribes triste Pall. – С. печальная. Р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Редко. Кустарник.

Сем. 51. БЕЛОЗОРОВЫЕ – PARNASSIACEAE

Род 1. Белозор – *Parnassia* L.

Parnassia palustris L.: Шишкин, 1930 – Б. болотный. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; сырые лиственничники, сырые кустарниковые заросли, разнотравные луга, придорожные канавы. Нередко. Многолетник.

Сем. 52. РОСЯНКОВЫЕ – DROSERACEAE

Род 1. Росянка – *Drosera* L.

Drosera rotundifolia L.: Шишкин, 1930 – Р. круглолистная, с. Дальний Кут, ключ Островной, р. Малая Пихтовка; болота, берега ручьев. Рассеянно. Многолетник.

Сем. 53. РОЗОВЫЕ – ROSACEAE

Род 1. Репяшок – *Agrimonia* L.

Agrimonia viscidula Bunge (как *A. pilosa* Ledeb. var. *viscidula* Bunge: Шишкин 1930; как *A. striata* Michx.: Сибирина и др., 2015) – Р. мелкобороздчатый. КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог, Ковалевский ключ; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные луга. Относительно часто. Многолетник.

Род 2. Волжанка – *Aruncus* Adans.

Aruncus dioicus (Walt.) Fern. (как *A. silvester* Kostel.: Шишкин, 1930; как *A. asiaticus* Rojark.: Крестов, 19936) – В. двудомная. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; урочище Ороchonский Бог, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 3. Сабельник – *Comarum* L.

**Comarum palustre* L.: Шишкин, 1930 – С. болотный. Ключ Островной, болота. Редко. Полукустарничек.

Род 4. Боярышник – *Crataegus* L.

Crataegus maximowiczii С.К. Schneid.: Шишкин, 1930 – **Б. Максимовича**. Ключ Кордонный, КПП 1 «Корейский»; долинныи лиственный лес, берега ручьев, антропогенные местообитания. Редко. Дерево.

Род 5. Лабазник – *Filipendula* Mill.

Filipendula glaberrima Nakai (как *F. glabra* (Maxim.) Nakai: Шишкин, 1930) – **Л. гладчайший**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Трофимов; урочище Орочонский Бог; реки Малая Пихтовка, Арму; долинныи кедрово-широколиственный лес, кустарниковые заросли, суходольные и сырые луга. Нередко. Многолетник.

Filipendula palmata (Pall.) Maxim.: Шишкин, 1930 – **Л. дланевидный**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Николаев; КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, урочище Орочонский Бог, руч. Пасечный, р. Лесовозная; дубняки, долинныи лиственный лес, кустарниковые заросли, суходольные и сырые луга. Очень часто. Многолетник.

Род 6. Земляника – *Fragaria* L.

Fragaria orientalis Losinsk.: Шишкин, 1930 – **З. восточная**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, вдоль дорог, у сухих скал. Относительно часто. Многолетник.

Род 7. Гравилат – *Geum* L.

Geum aleppicum Jacq.: Шишкин, 1930 – **Г. алеппский**. Урочище Орочонский Бог; ясеневники, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 8. Яблоня – *Malus* Mill.

Malus baccata (L.) Borkh. (как *M. sibirica* Borkh.: Шишкин, 1930) – **Я. ягодная**. КПП 1 «Корейский»; долинныи лиственный лес, скалы вдоль р. Большая Уссурка, кустарниковые заросли. Часто. Дерево.

Malus mandshurica (Maxim.) Kom.: Куренцов, 1935 – **Я. маньчжурская**. Урочище Орочонский Бог; дубняки, берега ручьев. Нередко. Дерево.

Род 9. Черемуха – *Padus* Mill.

Padus avium Mill. (как *P. rasemosa* Lam.: Шишкин, 1930) – **Ч. обыкновенная**. Водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, междуречье Арму – Большая Уссурка; долинныи лиственный лес, кустарниковые заросли. Относительно часто. Дерево.

Padus maackii (Rupr.) Kom.: Шишкин, 1930 – **Ч. Маака**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Яков; урочище Орочонский Бог, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственный лес. Нередко. Дерево.

Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov (как *Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom.: Шишкин, 1930) – **Ч. Максимовича**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ; долинныи кедрово-широколиственный лес. Нередко. Дерево.

Род 10. Лапчатка – *Potentilla* L.

Potentilla argentea L. – **Л. серебристая**, КПП 1 «Корейский»; вдоль дорог, антропогенные местообитания. Редко. Многолетник. Заносный вид.

Potentilla centigrana Maxim.: Шишкин, 1930 – **Л. стозернышковая**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, р. Малая Пихтовка; КПП 1 «Корейский»; долинные лиственные леса, берега ручьев, вдоль дорог, антропогенные местообитания. Относительно часто. Многолетник.

Potentilla fragarioides L.: Шишкин, 1930 – **Л. земляниковидная**. КПП 1 «Корейский», ключ Островной, урочище Ороchonский Бог; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Potentilla freyniana Wornn.: Шишкин, 1930 – **Л. Фрейна**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, луга, обочины дорог. Редко. Многолетник.

Potentilla norvegica L. – **Л. норвежская**. КПП 1 «Корейский»; луга, обочины дорог. Редко. Двулетник. Заносный вид.

Род 11. **Шиповник, или Роза, – Rosa L.**

Rosa acicularis Lindl.: Шишкин, 1930 – **Ш. иглистый**. КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог; леса. Редко. Кустарник.

Rosa amblyotis С.А. Меу. – **Ш. тупоушковый**. Реки: Арму, Лесовозная; долинные леса, каменистые склоны. Нередко. Кустарник.

Rosa davurica Pall.: Шишкин, 1930 – **Ш. даурский**. Ключ Никиткин, Островной, КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; дубняки, кустарниковые заросли, луга, обочины дорог. Часто. Кустарник.

Род 12. **Рубус – Rubus L.**

Rubus crataegifolius Bunge: Шишкин, 1930 – **Р. боярышниковлистный**, или **малина**. Ключи: Ковалевский, Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Полукустарник.

Rubus matsumuranus Н. Lev. et Vaniot (как *R. melanolasius* (Dieck ex Focke) Kom.: Шишкин, 1930) – **Р. Мацумуры**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог; реки Малая Пихтовка, Арму; кедрово-широколиственные леса предгорий. Редко. Многолетник. Полукустарник.

Rubus sachalinensis var. *komarovii* Bondarenko ex Korovina (как *R. komarovii* Nakai: Крестов, 1993а) – **Р. Комарова**. Р. Большая Уссурка; каменистые осыпи, поймы ручьев. Редко. Полукустарник.

Род 13. **Кровохлебка – Sanguisorba L.**

Sanguisorba officinalis L. (как *S. glandulosa* Kom.: Шишкин, 1930) – **К. аптечная**. Ключи: Ковалевский, Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, суходольные луга, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda: Якубов и др., 1996 (рис. 63, с. 229) – **К. мелкоцветковая**. Урочище Ороchonский Бог, р. Малая Пихтовка; болота, сырые и суходольные луга. Многолетник.

Sanguisorba tenuifolia* Fisch. ex Link: Куренцов, 1935 – **К. тонколистная, долина р. Большая Уссурка; сырые луга. Редко. Многолетник.

Род 14. **Рябинник – Sorbaria (Ser.) A. Braun**

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun: Шишкин, 1930 – **Р. рябинолистный**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; КПП 1

«Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный; урочище Орочонский Бог, реки: Арму, Малая Пихтовка, Лесовозная; долинные лиственные леса, заросли кустарников, вдоль дорог. Часто. Кустарник.

Род 15. **Рябина – Sorbus L.**

Sorbus pochuanensis Hedl. (как *S. amurensis* Koehne: Шишкин, 1930) – **Р. похуашаньская**, или **амурская**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Яков; Лаулинский прижим, урочище Орочонский Бог, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные, кедрово-лиственничные леса. Нередко. Дерево.

Род 16. **Таволга, или спирея, – Spiraea L.**

Spiraea betulifolia* Pall.: Якубов и др., 1996 (рис. 36, с. 130) – **Т. березолистная. Пихтово-еловые леса, каменистые склоны, поймы рек. Редко. Кустарник.

Spiraea media Schmidt: Шишкин, 1930 – **Т. средняя**. Ключи: Островной, Широкий, Яков; КПП 1 «Корейский»; скалистые обнажения, кедрово-широколиственные леса. Нередко. Кустарник.

Spiraea salicifolia L.: Шишкин, 1930 – **Т. иволистная**. Ключи: Островной, Трофимов; КПП 1 «Корейский», с. Дерсу, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; берега ручьев, сырые и суходольные луга. Нередко. Кустарник.

Род 17. **Вальдштейния – Waldsteinia Willd.**

Waldsteinia maximowicziana (Juz. ex Teppner) Probst. (как *W. ternata* (Steph.) Fritsch: Крестов, 1993б) – **В. Максимовича**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Яков, р. Малая Пихтовка, кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Сем. 54. **БОБОВЫЕ – FABACEAE**

Род 1. **Амфикарпея – Amphicarpea Ell.**

Amphicarpea japonica (Oliv.) V. Fedtsch. (как *Falcata japonica* Kom.: Шишкин, 1930) – **А. японская**. КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Однолетник.

Род 2. **Астрагал – Astragalus L.**

Astragalus uliginosus L.: Шишкин, 1930 – **А. топяной**. Ключ Островной, сырые луга, антропогенные местообитания. Редко. Многолетник.

Род 3. **Куммеровия – Kummerowia Schindl.**

Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino – **К. прилистниковая**. КПП 1 «Корейский», антропогенные местообитания, берега рек, обочины дорог. Относительно редко. Однолетник.

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.: Шишкин, 1930 – **К. полосатая**. КПП 1 «Корейский», антропогенные местообитания. Относительно редко. Однолетник.

Род 4. **Чина – Lathyrus L.**

Lathyrus davidii Hance – **Ч. Дэвида**. КПП 1 «Корейский», дубняки, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.: Шишкин, 1930 – **Ч. приземистая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Lathyrus komarovii Ohwi (как *L. alatus* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Ч. Комарова**, ключ Островной, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, дубняки, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Lathyrus pilosus Cham. (как *L. palustris* var. *pilosus* Cham.: Шишкин, 1930) – **Ч. волосистая**. Урочище Орочонский Бог, сырые луга, окраины болот. Редко. Многолетник.

Род 5. Леспедеца – *Lespedeza* Michx.

Lespedeza bicolor Turcz.: Шишкин, 1930 – **Л. двуцветная**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим, дубняк, кустарниковые заросли у скалистых обнажений. Часто, нередко образует заросли. Кустарник.

Род 6. Люпинастер – *Lupinaster* Fabr.

Lupinaster pentaphyllus Moench (как *Trifolium lupinaster* L.: Шишкин, 1930) – **Л. пятилистный**, или **клевер люпиновидный**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; луга, лиственные леса, антропогенные местообитания. Часто. Многолетник.

Род 7. Маакия – *Maackia* Maxim. et Rupr.

Maackia amurensis Rupr.: Шишкин, 1930 – **М. амурская**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные, кедрово-лиственничные леса, кустарниковые заросли. Относительно редко. Дерево. Вид включен в КС МСОП.

Род 8. Подокарпиум – *Podocarpium* (Benth.) Y.C. Yang et P.H. Huang

Podocarpium mandshuricum (Maxim.) Czerep. (как *Desmodium podocarpum* var. *mandshuricum* Maxim.: Шишкин, 1930) – **П. Маньчжурский**, или **десмодиум маньчжурский**. Междуречье Арму – Большая Уссурка; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Род 9. Клевер – *Trifolium* L.

Trifolium hybridum L. – **К. гибридный**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; сырые луга, по берегам рек, антропогенные местообитания. Относительно редко. Многолетник. Заносный вид.

Trifolium pratense L.: Шишкин, 1930 – **К. луговой**, или **красный**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; поля, антропогенные местообитания. Очень часто. Многолетник. Заносный вид.

Trifolium repens L.: Шишкин, 1930 – **К. ползучий**, или **белый**. КПП 1 «Корейский», ключ Никиткин; антропогенные местообитания, поля, вдоль дорог. Часто. Многолетник. Заносный вид.

Род 10. Горошек – *Vicia* L.

Vicia amoena Fisch.: Шишкин, 1930 – **Г. приятный**, ключ Островной; суходольные и сырые луга, кустарниковые заросли, реже – дубняки. Относительно часто. Многолетник.

Vicia amurensis Oett. (как *V. ussuriensis* Oett.: Шишкин, 1930) – **Г. амурский**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, антропогенные местообитания. Часто. Многолетник.

Vicia cracca L.: Шишкин, 1930 – **Г. мышинный**. КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог; дубняки, кустарниковые заросли, антропогенные местообитания. Относительно часто. Многолетник.

Vicia pseudorobus Fisch. et C.A. Mey.: Шишкин, 1930 – **Г. ложносочевичный**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Vicia ramuliflora (Maxim.) Ohwi – **Г. разветвленный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, ясеневники, кедрово-широколиственные леса. Относительно часто. Многолетник.

Vicia unijuga* A. Vg.: Шишкин, 1930 – **Г. однопарный. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim.: Шишкин, 1930 – **Г. жилковый**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Сем. 55. ДЕРБЕННИКОВЫЕ – LYTHRACEAE

Род 1. Дербенник – *Lythrum* L.

Lythrum salicaria L.: Шишкин, 1930 – **Д. ивовый**. Ключ Островной; сырые и суходольные луга, антропогенные местообитания. Часто. Многолетник.

Сем. 56. ОСЛИННИКОВЫЕ – ONAGRACEAE

Род 1. Иван-чай – *Chamaenerion* Ség.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.: Шишкин, 1930 – **И.-ч. узколиственный**. Ключи: Никиткин, Островной, р. Арму; вдоль дорог. Редко. Многолетник.

Род 2. Двулепестник – *Circaea* L.

Circaea alpina L.: Шишкин, 1930 – **Д. альпийский**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Трофимов; междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка, р. Лесовозная; долинны кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Circaea lutetiana L. (как *C. lutetiana* subsp. *quadrisulcata* (Maxim.) Asch. et Magnus: Шишкин, 1930) – **Д. парижский**. Ключ Островной, междуречье Арму – Большая Уссурка; долинны кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Род 3. Кипрей – *Epilobium* L.

Epilobium palustre* L. Шишкин, 1930 – **К. болотный. Ключ Островной; болота, сырые луга. Нередко. Многолетник.

Род 4. Энотера – *Oenothera* L.

Oenothera depressa Greene – **Э. прижатая**. КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог; галечники, обочины дорог, антропогенные местообитания. Редко. Двулетник.

Сем. 57. **РОГУЛЬНИКОВЫЕ – TRAPAЕАЕ**

Род 1. **Рогульник – Трапа L.**

Trapa pseudoincisa* Nakai: Цвелев, 1995 (рис. 67, с. 240) – **Р. ложно-выемчатолистный. Бассейн р. Большая Уссурка; водоемы. Редко. Однолетник.

Сем. 58. **РУТОВЫЕ – RUTACEAE**

Род 1. **Ясенец – Dictamnus L.**

Dictamnus dasycarpus Turcz.: Шишкин, 1930 – **Я. пушистоплодный**. Водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 2. **Бархат – Phellodendron Rupr.**

Phellodendron amurense Rupr.: Шишкин, 1930 – **Б. амурский**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной; КПП 1 «Корейский», водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса, ясеневики, кустарниковые заросли. Относительно часто. Дерево.

Сем. 59. **КЛЕНОВЫЕ – ACERACEAE**

Род 1. **Клён – Acer L.**

Acer barbinerve Maxim. – **К. бородатый**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский; р. Арму; урочище Орочонский Бог; кедрово-еловые, кедрово-широколиственные леса. Относительно редко. Крупный кустарник.

Acer ginnala Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. гиннала**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; долинные лиственные леса, вдоль дорог. Нередко. Кустарник.

Acer mono Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. мелколистный**, или **моно**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; урочище Орочонский Бог; руч. Пасечный, реки Малая Пихтовка, Лесовозная, лиственные и кедрово-широколиственные леса. Часто. Дерево.

Acer tegmentosum Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. зеленокорый**, или «**клён-липа**». Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, реки Малая Пихтовка, Лесовозная; урочище Орочонский Бог, кедрово-широколиственные леса. Нередко. Дерево.

Acer ukurunduense Trautv. et S.A. Mey.: Шишкин, 1930 – **К. укурунду**, или **желтый**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, реки Малая Пихтовка, Лесовозная; урочище Орочонский Бог; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Нередко. Куст или небольшое дерево.

Сем. 60. **КИСЛИЦЕВЫЕ – OXALIDACEAE**

Род 1. **Кислица – Oxalis L.**

Oxalis acetosella L.: Шишкин, 1930 – **К. обыкновенная**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-еловые леса. Нередко. Многолетник.

Сем. 61. **ГЕРАНЕВЫЕ – GERANIACEAE**

Род 1. **Герань – Geranium L.**

Geranium dahuricum DC.: Шишкин, 1930 – **Г. даурская**. Ключ Островной, с. Дерсу; кустарниковые заросли, разнотравные луга. Нередко. Многолетник.

Geranium eriostemon Fisch.: Шишкин, 1930 – **Г. волосистотычинковая**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Geranium maximowiczii Regel et Maack: Шишкин, 1930 – **Г. Максимовича**. Ключ Островной, междуречье Арму – Большая Уссурка; долинные кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Geranium sibiricum L.: Шишкин, 1930 – **Г. сибирская**. Ключи: Ковалевский, Широкий; антропогенные местообитания, вдоль дорог. Относительно редко. Многолетник.

Geranium wlassovianum Fisch. ex Link: Шишкин 1930 – **Г. Власова**. Ключи: Островной, Широкий, Малая Пихтовка; дубняки, сырые луга, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Geranium wilfordii Maxim. – **Г. Уильфорда**. Ключ Кордонный; ясеневники, берега ручьев. Относительно редко. Многолетник.

Сем. 62. **БАЛЬЗАМИНОВЫЕ – BALSAMINACEAE**

Род 1. **Недотрога – Impatiens L.**

Impatiens furcillata Hemsley: Шишкин, 1930. – **Н. вильчатая**. Ключи: Никиткин, Николаев, Широкий, Яков; ясеневники, берега ручьев. Относительно часто. Однолетник.

Impatiens noli-tangere L.: Шишкин, 1930. – **Н. обыкновенная**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Широкий; междуречье Арму – Большая Уссурка, урочище Орочонский Бог, руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные лиственные и кедрово-широколиственные леса, берега ручьев. Часто. Однолетник.

Сем. 63. **КИЗИЛОВЫЕ – CORNACEAE**

Род 1. **Дерен – Chamaepericlymenum Hill**

Chamaepericlymenum canadense (L.) Asch. et Graebn.: Крестов, 1993а – **Д. канадский**. Ключ Ковалевский, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; кедрово-еловые леса. Нередко. Полукустарничек.

Род 2. **Свидина – Swida Opiz**

Swida alba (L.) Opiz (как *Cornus tatarica* Mill.: Шишкин, 1930) – **С. белая**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Островной; КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; долинные леса, берега рек и ключей. Часто. Кустарник.

Сем. 64. АРАЛИЕВЫЕ – ARALIACEAE

Род 1. Аралия – *Aralia* L.

Aralia elata (Miq.) Seem. (как *A. mandshurica* Rupr. et Maxim.: Шишкин, 1930) – **А. высокая**, или **маньчжурская**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Ороchonский Бог, р. Малая Пихтовка; дубняки, кустарниковые заросли, лесные прогалины и старые волока. Нередко. Кустарник или небольшое дерево.

Род 2. Свободнягодник – *Eleutherococcus* Maxim.

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. колючий**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский»; междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Арму, р. Малая Пихтовка; урочище Ороchonский Бог; долинны хвойно-широколиственные леса. Нередко. Кустарник.

Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu (как *Acanthopanax sessiliflorum* Seem.: Шишкин, 1930) – **С. сидяцветковый**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; долинны лиственные леса, кустарниковые заросли. Нередко. Кустарник.

Род 3. Женьшень – *Panax* L.

Panax ginseng* С.А. Мей.: Шишкин, 1930 – **Ж. настоящий. Ключи: Ковалевский, Кондратов, Левый Михайловский, Николаев, Островной; Лаулинский прижим; кедрово-широколиственные, дубово-липовые леса. Очень редко. Многолетник. Вид внесен в КК РФ и КК ПК.

Сем. 65. СЕЛЬДЕРЕЕВЫЕ – APIACEAE

Род 1. Дудник – *Angelica* L.

Angelica anomala Ave-Lall.: Шишкин, 1930 – **Д. необычный**. Ключ Островной; речные долины. Редко. Двулетник.

Angelica cincta H. Boissieu – **Д. окаймленный**. Ключи: Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму и Большая Уссурка; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинны лиственные леса, дубняки, кустарниковые заросли, вдоль дорог. Очень часто. Двулетник.

Angelica czernaevia (Fisch. et С.А. Мей.) Kitag. (как *Angelica laevigata* (Turcz.) Franch.: Шишкин, 1930) – **Д. Черняева**. Ключ Островной; разнотравные луга, кустарниковые заросли. Редко. Двулетник.

Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.: Шишкин, 1930 – **Д. даурский**. Ключ Широкий, руч. Пасечный, урочище Ороchonский Бог; долинны лиственные леса, кустарниковые заросли. Редко. Двулетник.

Род 2. Купырь – *Anthriscus* Pers.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (как *A. nemorosa* Spreng.: Шишкин, 1930) – **К. лесной**. Ключи: Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, р. Малая Пихтовка;

долинные лиственные и хвойно-широколиственные леса, тополевики, чозенники, ясеневики. Часто. Двулетник.

Род 3. **Володушка – *Vupleurum* L.**

Vupleurum longiradiatum Turcz.: Шишкин, 1930 – **В. длинноручевая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 4. **Вех – *Cicuta* L.**

Cicuta virosa L.: Шишкин, 1930 – **В. ядовитый**. Ключ Островной; урочище Орочонский Бог; болота, берега водоемов. Нередко. Многолетник.

Род 5. **Борщевик – *Heracleum* L.**

Heracleum dissectum Ledeb. (как *H. barbatum* Ledeb.: Шишкин, 1930) – **Б. расчеченный**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные леса, обочины дорог, кустарниковые заросли. Часто. Двулетник.

Род 6. **Китагавия – *Kitagawia* M. Pimen.**

Kitagawia terebinthacea (Fisch. ex Spreng.) M. Pimen. (как *Peucedanum terebinthaceum* Fisch.: Шишкин, 1930) – **К. терпентиновая**. Окрестности кордона «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, каменистые местообитания. Редко. Многолетник.

Род 7. **Хвостосемянница – *Osmorhiza* Raf.**

Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. (как *O. amurensis* F. Schmidt ex Maxim.: Шишкин, 1930) – **Х. остистая**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Нередко. Многолетник.

Род 8. **Маточник, или дудник, – *Ostericum* Hoffm.**

Ostericum maximowiczii (F. Schmidt ex Maxim.) Kitag. (как *Angelica maximowiczii* Benth.: Шишкин, 1930) – **М. Максимовича**. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; болота, сырые луга, ясеневики. Нередко. Многолетник.

Ostericum viridiflorum (Turcz.) Kitag. (как *Angelica viridiflora* Maxim.: Шишкин, 1930) – **М. зеленоцветковый**. Ключ Островной; сырые разнотравные луга, лесные опушки. Относительно редко. Многолетник.

Род 9. **Реброплодник – *Pleurospermum* Hoffm.**

Pleurospermum uralense Hoffm. (как *P. camtschaticum* Hoffm.: Шишкин, 1930) – **Р. уральский**. Ключи: Островной, Яков; КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим, междуречье Арму и Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 10. **Подлесник – *Sanicula* L.**

Sanicula rubriflora F. Schmidt: Шишкин, 1930 – **П. красноцветковый**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Островной, Яков; руч. Пасечный; ясеневики, дубняки, сырые луга. Нередко. Многолетник.

Род 11. **Жабрица – Seseli L.**

Seseli seseloides (Turcz.) M. Hiroe (как *Libanotis seseloides* Turcz.: Шишкин, 1930) – **Ж. жабрицевидная**. Ключи: Островной, Широкий, междуречье Арму – Большая Уссурка, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, каменистые местообитания, галечниковые наносы. Часто. Многолетник.

Род 12. **Поручейник – Sium L.**

Sium suave Walt. (как *S. cicutifolium* Gmel.: Шишкин, 1930) – **П. приятный**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Островной, Яков, Широкий; руч. Пасечный; междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; болота, берега водоемов, галечниковые отложения. Часто. Многолетник.

Сем. 66. **ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ, или БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ,
– CELASTRACEAE**

Род 1. **Древогубец – Celastrus L.**

Celastrus flagellaris Rupr.: Шишкин, 1930 – **Д. плетевобразный**. Ключ Трофимов, междуречье Арму – Большая Уссурка; долинны кедровники, кедрово-широколиственные леса. Лиана. Редко. Многолетник.

Род 2. **Бересклет – Euonymus L.**

Euonymus sacrosancta* Koidz. (как *E. alata* (Thunb.) Siebold: Шишкин, 1930) – **Б. священный. Лиственные леса, кустарниковые заросли. Редко. Кустарник.

Euonymus maackii Rupr.: Шишкин, 1930 – **Б. Маака**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно редко. Кустарник.

Euonymus macroptera Rupr.: Шишкин, 1930 – **Б. большекрылый**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка, кедрово-еловые леса. Нередко. Кустарник.

Euonymus pauciflora Maxim.: Шишкин, 1930 – **Б. малоцветковый**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Островной, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, р. Малая Пихтовка, р. Арму, урочище Орочонский Бог; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Кустарник.

Сем. 67. **САНТАЛОВЫЕ – SANTALACEAE**

Род 1. **Ленец – Thesium L.**

Thesium chinense Turcz.: Кожевников, 1995 (рис. 70, с. 251) – **Л. китайский**. Ключ Островной, с. Дерсу; суходольные луга, реже – дубняки. Редко. Многолетник.

Сем. 68. **ОМЕЛОВЫЕ – VISCACEAE**

Род 1. **Омела – Viscum L.**

Viscum coloratum (Kom.) Nakai – **О. окрашенная**. Междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Лесовозная; долинны лиственные леса. Редко. Полукустарник.

Сем. 69. КРУШИНОВЫЕ – RHAMNACEAE

Род 1. Жестер, или крушина, – *Rhamnus* L.

Rhamnus davurica Pall.: Шишкин 1930 – **Ж. даурский**. Ключ Ковалевский; долинные лиственные леса, кустарниковые заросли. Редко. Кустарник.

Сем. 70. ВИНОГРАДОВЫЕ – VITACEAE

Род 1. Виноградовник – *Ampelopsis* Michx.

Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc.: Шишкин, 1930 – **В. разнолиственный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, осыпи. Редко. Лиана.

Род 2. Виноград – *Vitis* L.

Vitis amurensis Rupr.: Шишкин, 1930 – **В. амурский**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Левый Михайловский; КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли, по долинам рек. Относительно часто. Лиана.

Сем. 71. МАРЕНОВЫЕ – RUBIACEAE

Род 1. Подмаренник – *Galium* L.

Galium boreale L.: Шишкин, 1930 – **П. северный**. Ключи: Левый Михайловский, Островной, Николаев, Трофимов; КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, р. Лесовозная; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные и сырые луга. Нередко. Многолетник.

Galium davuricum Turcz. ex Ledeb.: Шишкин, 1930 – **П. даурский**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Трофимов, Яков; КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный; реки: Малая Пихтовка, Лесовозная; долинные кедрово-широколиственные, лиственные леса, кустарниковые заросли, сырые луга. Часто. Многолетник.

Galium kamtschaticum* Steller ex Schult.: Крестов, 1993а – **П. камчатский. Ключ Николаев, лиственничник. Редко. Многолетник.

Galium odoratum (L.) Scop. (как *Asperula odorata* L.: Шишкин, 1930) – **П. душистый**. КПП 1 «Корейский», ключ Николаев; кедрово-широколиственные леса, дубняки. Нередко. Многолетник.

Galium paradoxum Maxim.: Шишкин, 1930 – **П. удивительный**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Трофимов; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник. Вид включен в КК ПК.

Galium ruthenicum Willd. – **П. русский**. КПП 1 «Корейский», кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Galium trifidum L. – **П. трехраздельный**. Пасечный руч., урочище Орочонский Бог, болота и сырые луга. Нередко. Многолетник.

Galium verum L.: Шишкин, 1930 – **П. настоящий**. Ключи: Широкий, Островной; урочище Орочонский Бог, дубняки, скалистые обнажения, луга, речные отложения. Нередко. Многолетник.

Род 2. **Марена – Rubia L.**

Rubia chinensis Regel et Maack: Шишкин, 1930 – **М. китайская**. Водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, ключ Яков; кедрово-широколиственные леса, дубняки. Относительно редко. Многолетник.

Rubia cordifolia L.: Шишкин, 1930 – **М. сердцелистная**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Лесовозная; кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Сем. 72. **ЛАСТОВНИКОВЫЕ – ASCLEPIADACEAE**

Род 1. **Ластовень – Vincetoxicum Wolf**

Vincetoxicum acuminatum C. Morren et Decne. (как *Cynanchum acuminatifolium* Hemsley: Шишкин, 1930) – **Л. заостренный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки. Часто. Многолетник.

Сем. 73. **ГОРЕЧАВКОВЫЕ – GENTIANACEAE**

Род 1. **Горечавка – Gentiana L.**

Gentiana scabra Bunge: Шишкин, 1930 – **Г. шероховатая**. Ключ Широкий; дубняки, кустарниковые заросли, луга. Редко. Многолетник.

Gentiana triflora Pall.: Шишкин, 1930 – **Г. трехцветковая**. Ключ Островной; сырые луга, обочины дорог. Редко. Многолетник.

Gentiana zollingeri Fawc. – **Г. Цоллингера**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; луга, дубняки. Редко. Многолетник.

Сем. 74. **ВАХТОВЫЕ – MENYANTHACEAE**

Род 1. **Вахта – Menyanthes L.**

Menyanthes trifoliata L.: Шишкин, 1930 – **В. трёхлистная**. Ключ Островной, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; болота. Нередко. Многолетник.

Сем. 75. **ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ, или ПОДЪЕЛЬНИКОВЫЕ,
– MONOTROPACEAE**

Род 1. **Вертляница – Monotropa L.**

Monotropa hypopitys L. (как *Hypopytis monotropa* Grantz: Шишкин, 1930) – **В. обыкновенная**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский; кедрово-еловые леса. Редко. Многолетник.

Род 2. **Вертлянцеvidка – Monotropastrum Andres**

Monotropastrum humile (D. Don) Nara – **В. шаровидная**. Водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Сем. 76. **МАСЛИНОВЫЕ – OLEACEAE**

Род 1. **Ясень – Fraxinus L.**

Fraxinus mandshurica Rupr.: Шишкин, 1930 – **Я. маньчжурский**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Яков;

водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Орочонский Бог, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, реки: Арму, Лесовозная, Малая Пихтовка; ясеневники, ильмо-ясеневые, долинные и горные кедрово-широколиственные леса, берега ручьев. Часто. Лесообразователь. Дерево.

Род 2. **Трескун – Ligustrina** Rupr.

Ligustrina amurensis Rupr. (как *Syringa amurensis* Rupr.: Шишкин, 1930) – **Т. амурский**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Островной, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; р. Малая Пихтовка; долинные лиственные и кедрово-широколиственные леса, скалы вдоль р. Большая Уссурка. Часто. Дерево.

Сем. 77. ЖИМОЛОСТЕВЫЕ – CAPRIFOLIACEAE

Род 1. **Линнея – Linnaea** Gronov ex L.

Linnaea borealis L.: Крестов, 1993б – **Л. северная**. р. Арму; кедрово-еловые леса. Редко. Многолетник.

Род 2. **Жимолость – Lonicera** L.

Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn: Шишкин, 1930 – **Ж. съедобная. с. Дальний Кут; речные долины. Редко. Кустарник.

Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb.: Шишкин, 1930 – **Ж. золотистоцветковая**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, КПП 1 «Корейский»; кедрово-широколиственные леса, берега ручьев, каменистые обнажения. Часто. Кустарник.

Lonicera maximowiczii (Rupr.) Regel: Шишкин, 1930 – **Ж. Максимовича**. Ключ Левый Михайловский, р. Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Кустарник.

Сем. 78. КАЛИНОВЫЕ – VIBURNACEAE

Род 1. **Калина – Viburnum** L.

Viburnum sargentii Koehne (как *V. pubinerve* Blum ex Miq.: Шишкин, 1930) – **К. Саржента**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; дубняки, ясеневники, кедрово-широколиственные леса. Относительно часто. Кустарник.

Сем. 79. БУЗИНОВЫЕ – SUMBUCACEAE

Род 1. **Бузина – Sambucus** L.

Sambucus sibirica Nakai (как *S. racemosa* L.: Шишкин, 1930) – **Б. сибирская**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной, Яков, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; долинные кедрово-широколиственные, лиственные леса, кустарниковые заросли. Нередко. Кустарник.

Сем. 80. АДОКСОВЫЕ – ADOXACEAE

Род 1. Адокса – *Adoxa* L.

Adoxa moschatellina L.: Крестов, 1993а – **А. мускусная**. Ключи: Ковалевский, Николаев; кедрово-еловые леса. Редко. Многолетник.

Сем. 81. ВАЛЕРИАНОВЫЕ – VALERIANACEAE

Род 1. Патрэнция – *Patrinia* Juss.

Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Link: Шишкин, 1930 – **П. короставниколистная**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, осыпи, суходольные луга. Нередко. Многолетник.

Род 2. Валериана – *Valeriana* L.

Valeriana alternifolia Ledeb. – **В. очереднолистная**. Никиткин ключ; каменистые склоны. Нередко. Многолетник.

Valeriana fauriei Briq. – **В. Фори**. Ключи: Ковальский, Николаев, Островной, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, реки Малая Пихтовка, Лесовозная; долинныя кедрово-широколиственные, лиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Сем. 82. ВЬЮНКОВЫЕ – CONVULVACEAE

Род 1. Повой – *Calystegia* R. Br.

Calystegia inflata Sweet (как *C. rosea* Choisy: Шишкин, 1930) – **П. вздутый**. КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Сем. 83. ПОВИЛИКОВЫЕ – CUSCUTACEAE

Род 1. Повилика – *Cuscuta* L.

Cuscuta japonica Choisy: Шишкин, 1930 – **П. японская**. Ключ Широкий, КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли. Изредка. Однолетник.

Сем. 84. СИНЮХОВЫЕ – POLEMONIACEAE

Род 1. Синюха – *Polemonium* L.

Polemonium chinense (Brand) Brand – **С. китайская**. Ключ Ковалевский, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Polemonium laxiflorum (Regel) Kitam. (как *P. caeruleum* L.: Шишкин, 1930) – **С. рыхлоцветковая**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Сем. 85. БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE

Род 1. Тригонотис – *Trigonotis* Stev.

Trigonotis radicans (Turcz.) Stev.: Шишкин, 1930 – **Т. укореняющийся**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, Яков; водораздел

р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, р. Лесовозная; дубняки, ясеневники. Часто. Многолетник.

Сем. 86. **ФРИМОВЫЕ – PHRYMACEAE**

Род 1. **Фрима – Phryma L.**

Phryma asiatica (Hara) O. et J. Degener (как *Phryma leptostachya* L.: Крестов, 1993а) – **Ф. азиатская**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов; междуречье Арму – Большая Уссурка, реки: Арму, Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные и лиственные леса. Часто. Многолетник.

Сем. 87. **ЯСНОТКОВЫЕ – LAMIACEAE**

Род 1. **Многоколосник – Agastache Clayt. ex Gronov**

Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) O. Kuntze (как *Lophanthus rugosus* Fisch. et C.A. Mey.: Шишкин, 1930) – **М. морщинистый**. Ключи Ковалевский, Островной, КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли, скалистые обнажения, режа дубняки. Относительно редко. Многолетник.

Род 2. **Живучка – Ajuga L.**

Ajuga multiflora Bunge – **Ж. многоцветковая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 3. **Ложеножка – Clinopodium L.**

Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze (как *Calamintha chinensis* Benth.: Шишкин, 1930) – **Л. китайская**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные луга, скалистые обнажения. Нередко. Многолетник.

Род 4. **Эльсгольция – Elsholzia Willd.**

Elsholzia ciliata (Thunb.) Nyl. – **Э. реснитчатая**. Ключ Островной; антропогенные местообитания, окраины полей. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 5. **Пикульник – Galeopsis L.**

Galeopsis bifida Voenn. – **П. двунадрезанный**.с. Дерсу; антропогенные местообитания, окраины полей. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 6. **Будра – Glechoma L.**

Glechoma hederacea L.: Шишкин, 1930 – **Б. плющевидная**. Ключи: Ковалевский, Островной; обочины дорог. Редко. Многолетник. Заносный вид.

Glechoma longituba (Nakai) Kurjian. – **Б. длиннотрубковая**. КПП 1 «Корейский»; обочины дорог, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 7. **Яснотка – Lamium L.**

Lamium barbatum Siebold et Zucc. – **Я. бородатая**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Широкий, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный; долинные кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 8. **Пустьрыник** – *Leonurus* L.

Leonurus japonicus* Houtt.: Пробатова, Крестовская, 1995 (рис. 96, с. 341) – **П. японский. Р. Большая Уссурка; антропогенные местообитания. Редко. Многолетник.

Род 9. **Зюзник** – *Lycopus* L.

Lycopus lucidus Turcz. ex Benth.: Шишкин, 1930 – **З. блестящий**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; суходольные и сырые луга. Нередко. Многолетник.

Lycopus maackianus (Maxim.) Makino: Шишкин, 1930 – **З. Маака**. Ключ Островной, с. Дальний Кут; сырые луга. Относительно редко. Многолетник.

Lycopus uniflorus Michx. – **З. малоцветковый**. Николаев ключ; вдоль дорог. Редко. Многолетник.

Род 10. **Мята** – *Mentha* L.

Mentha canadensis L. – **М. канадская**. Пасечный ручей; сырые луга, окраины болот. Относительно редко. Многолетник.

Род 11. **Мосла** – *Mosla* Buch.-Ham. ex Maxim.

Mosla dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. – **М. двупыльниковая**. Р. Малая Пихтовка; лиственничные леса, окраины болот. Редко. Однолетник.

Род 12. **Черноголовка** – *Prunella* L.

Prunella vulgaris* L.: Шишкин, 1930 – **Ч. обыкновенная. Ключ Островной, с. Дальний Кут; антропогенные местообитания, суходольные луга, вдоль дорог, опушки лесов. Относительно редко. Многолетник. Заносный вид.

Род 13. **Прутъевик** – *Rabdosia* (Blume) Hassk.

Rabdosia excisa (Maxim.) Nara (как *Plectranthus excisus* Maxim.: Шишкин, 1930) – **П. вырезной**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Островной, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; дубняки, по берегам ручьев, на сырых местах, кустарниковые заросли. Очень часто. Многолетник.

Rabdosia glaucocalyx (Maxim.) Prob. (как *Plectranthus glaucocalyx* Maxim.: Шишкин, 1930) – **П. сизочашечный**. Ключи: Ковалевский, Островной; КПП 1 «Корейский», дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 14. **Шлемник** – *Scutellaria* L.

Scutellaria dependens Maxim.: Шишкин, 1930 – **Ш. повислый**. Ключ Островной; долинные лиственные леса. Редко. Многолетник.

Scutellaria ussuriensis (Regel) Kudo: Шишкин, 1930 – **Ш. уссурийский**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; руч. Пасечный, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Лесовозная; дубняки, долинные хвойно-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Scutellaria regeliana* Nakai: Пробатова, Крестовская, 1995 (рис. 85, с. 310) – **Ш. Регеля.р. Большая Уссурка; сырые луга. Многолетник.

Род 15. **Чистяк** – *Stachys* L.

Stachys aspera Michx. (как *S. baicalensis* Fisch.: Шишкин, 1930) – **Ч. шероховатый**. КПП 1 «Корейский»; сырые луга. Редко. Многолетник.

Сем. 88. КРАСОВЛАСКОВЫЕ – **CALLITRICHACEAE**

Род 1. Красовласка – **Callitriche L.**

Callitriche palustris* L. (как *C. verna* L.: Шишкин, 1930) – **К. болотная. Ключ Островной; берега водоемов, сырые участки на старых проселочных дорогах. Редко. Однолетник.

Сем. 89. ПАСЛЕНОВЫЕ – **SOLANACEAE**

Род 1. Паслен – **Solanum L.**

Solanum nigrum* L.: Шишкин, 1930 – **П. черный. Ключ Островной, с. Дальний Кут; антропогенные участки. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Сем. 90. НОРИЧНИКОВЫЕ – **SCROPHULARIACEAE**

Род 1. Очанка – **Euphrasia L.**

Euphrasia maximowicziana* Wettst.: Шишкин, 1930 – **О. Максимовича. Ключ Островной, с. Дальний Кут; суходольные луга. Редко. Однолетник.

Род 2. Льянка – **Linaria Mill.**

Linaria vulgaris Mill. – **Л. обыкновенная**, КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, луга. Относительно редко. Многолетник. Заносный вид.

Род 3. Марьянник – **Melampyrum L.**

Melampyrum roseum Maxim.: Шишкин, 1930 – **М. розовый**. КПП 1 «Корейский»; дубняки. Часто. Однолетник.

Melampyrum setaceum (Maxim. ex Palib.) Nakai – **М. щетинистый**. КПП 1 «Корейский»; дубняки. Нередко. Однолетник.

Род 4. Омфалотрикс – **Omphalothrix Maxim.**

Omphalothrix longipes* Maxim.: Шишкин, 1930 – **О. длинноножковый. Ключ Островной, с. Дальний Кут; сырые луга. Редко. Однолетник.

Род 5. Мытник – **Pedicularis L.**

Pedicularis grandiflora* Fisch.: Шишкин, 1930 – **М. крупноцветковый. Ключ Островной, с. Дальний Кут; болота, луга. Редко. Многолетник.

Pedicularis resupinata L.: Шишкин, 1930 – **М. перевернутый**. КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли, луга. Редко. Многолетник.

Род 6. Фтейроспермум – **Phtheirospermum Bunge**

Phtheirospermum chinense* Bunge: Шишкин, 1930 – **Ф. китайский. Ключ Островной, с. Дальний Кут; дубняки, кустарниковые заросли, скалистые обнажения, антропогенные местообитания. Относительно редко. Однолетник.

Род 7. Сифоностегия – **Siphonostegia Benth.**

Siphonostegia chinensis Benth. – **С. китайская**. КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли, антропогенные местообитания. Редко. Однолетник.

Род 8. Вероника – **Veronica L.**

Veronica daurica Steven – **В. даурская**. КПП 1 «Корейский»; скалистые обнажения, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Veronica longifolia L.: Шишкин, 1930 – **В. длиннолистная**, ключ Островной; разнотравные луга, кустарниковые заросли, залежи. Редко. Многолетник.

Veronica serpyllifolia* L.: Шишкин, 1930 – **В. тимьянолистная. с. Дальний Кут; антропогенные участки. Редко. Многолетник. Заносный вид.

Род 9. **Вероничник – Veronicastrum Heist. ex Farb.**

Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell (как *Veronica sibirica* L.: Шишкин, 1930) – **В. сибирский**. Ключи: Ковалевский, Островной; урочище Орочонский Бог, КПП 1 «Корейский»; долинные лиственные леса. Нередко. Многолетник.

Сем. 91. **ПОДОРОЖНИКОВЫЕ – PLANTAGINACEAE**

Род 1. **Подорожник – Plantago L.**

Plantago asiatica L. – **П. азиатский**. Урочище Орочонский Бог, КПП 1 «Корейский»; луга, антропогенные местообитания. Нередко. Многолетник.

Plantago major L.: Шишкин, 1930 – **П. большой**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, вдоль дорог. Часто. Многолетник.

Сем. 92. **КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – CAMPANULACEAE**

Род 1. **Бубенчик – Adenophora Fisch.**

Adenophora pereskiiifolia (Fisch. ex Schult.) G. Don (как *A. latifolia* Fisch.: Шишкин, 1930) – **Б. перескиелистный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки. Часто. Многолетник.

Adenophora verticillata Fisch.: Шишкин, 1930 – **Б. мутовчатый**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 2. **Свободноцветка, или азинеума, – Asyneuma Griseb. et Schenk**

Asyneuma japonicum (Miq.) Briq. – **С. японская**. Ключ Кордонный, КПП 1 «Корейский»; междуречье Арму – Большая Уссурка; ясеневники, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 3. **Колокольчик – Campanula L.**

Campanula cephalotes Nakai – **К. головковый**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Campanula glomerata L.: Шишкин, 1930 – **К. сборный**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Campanula punctata Lam.: Шишкин, 1930 – **К. точечный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, каменистые местообитания. Относительно часто. Многолетник.

Род 4. **Колокольник, или кодонопсис, – Codonopsis Wall.**

Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook.f. ex Trautv.: Шишкин, 1930 – **К. ланцетный, или кодонопсис ланцетный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Сем. 93. **ЛОБЕЛИЕВЫЕ – LOBELIACEAE**

Род 1. **Лобелия – Lobelia L.**

Lobelia sessilifolia Lamb.: Шишкин, 1930 – **Л. сидячелистная**. Ключ Островной, с. Дальний Кут, р. Малая Пихтовка; болота. Редко. Многолетник.

Сем. 94. **АСТРОВЫЕ – ASTERACEAE**

Род 1. **Тысячелистник – Achillea L.**

Achillea millefolium L. – **Т. обыкновенный**. Ключи: Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский»; обочины дорог, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 2. **Железистостебельник – Adenocaulon Hook.**

Adenocaulon adhaerescens Maxim.: Шишкин, 1930 – **Ж. гималайский**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Островной, КПП 1 «Корейский»; нарушенные места. Нередко. Многолетник.

Род 3. **Аяния – Ajania Poljakov**

Ajania pallasiana (Fisch. ex Besser) Poljakov (как *Chrysanthemum pallasianum* (Fisch.) Kom.: Шишкин, 1930) – **А. Палласа**. Ключи: Никиткин, Островной, КПП 1 «Корейский», скалистые обнажения. Многолетник.

Род 4. **Амброзия – Ambrosia L.**

Ambrosia artemisiifolia L. – **А. полыннолистная**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; вдоль дорог. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 5. **Анафалис – Anaphalis DC.**

Anaphalis margaritacea (L.) A. Gray: Шишкин, 1930 – **А. жемчужный**. Ключ Островной; кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 6. **Лопух – Arctium L.**

Arctium lappa L.: Шишкин, 1930 – **Л. большой**. Ключи: Ковалевский, Островной, КПП 1 «Корейский»; нарушенные местообитания, обочины дорог. Редко. Двулетник. Заносный вид.

Род 7. **Полынь – Artemisia L.**

Artemisia desertorum Spreng. – **П. суходолинная**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог; приречные скальные выходы, в пойме. Нередко. Многолетник.

Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. (как *A. sacrorum* Ledeb.: Шишкин, 1930) – **П. Гмелина**. Ключи: Островной, Широкий; Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, каменистые местообитания. Часто. Полукустарник. Многолетник.

Artemisia integrifolia L.: Шишкин, 1930 – **П. цельнолистная**. Ключ Островной, урочище Орочонский Бог; сырые разнотравные луга, долинные лиственные леса, галечники, кустарники вдоль реки. Нередко. Многолетник.

Artemisia japonica Thunb.: Шишкин, 1930 – **П. японская**. Ключ Островной; речные наносы, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Artemisia keiskeana Miq.: Шишкин, 1930 – **П. Кейске**. Ключ Островной, Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский»; дубняки, каменистые местообитания. Часто. Многолетник.

Artemisia mandshurica (Kom.) Kom. – **П. маньчжурская**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные луга. Часто. Многолетник.

Artemisia saitoana Kitam. – **П. Сайто**. Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский»; скалистые склоны, обращенные к р. Большая Уссурка. Нередко. Многолетник.

Artemisia selengensis Turcz. ex Bess. – **П. селенгинская**. КПП 1 «Корейский»; берег р. Большая Уссурка. Редко. Многолетник.

Artemisia stolonifera (Maxim.) Kom.: Шишкин, 1930 – **П. побегоносная**. Ключи: Никиткин, Николаев, Островной, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, р. Арму; лиственные леса предгорий, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Artemisia sylvatica Maxim.: Шишкин, 1930 – **П. лесная**. Ключи: Кордонный, Пасечный, Широкий, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог, р. Арму; смешанные леса. Нередко. Многолетник.

Artemisia umbrosa (Besser) Turcz. ex DC. – **П. теневая**. Ключ Ковалевский; берега рек, дорог, среди кустарников. Редко. Многолетник.

Artemisia vulgaris L.: Шишкин, 1930 – **П. обыкновенная**. Ключ Островной; кустарниковые заросли, вдоль дорог. Нередко. Многолетник. Заносный вид.

Род 8. Астра – *Aster* L.

Aster maackii Regel: Шишкин, 1930 – **А. Маака**, ключ Островной; сырые разнотравные луга, окраины болот. Часто. Многолетник.

Aster tataricus L. f.: Шишкин, 1930 – **А. татарская**, КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; сырые и суходольные луга, кустарниковые заросли, залежи. Очень часто. Многолетник.

Род 9. Веретенник – *Atractylodes* DC.

Atractylodes ovata (Thunb.) DC. (как *Atractylis ovata* Thunb.: Шишкин, 1930) – **В. яйцевидный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняк, сухие каменистые гребни. Нередко. Многолетник.

Род 10. Череда – *Bidens* L.

Bidens tripartita* L.: Шишкин, 1930 – **Ч. трёхраздельная. Ключ Островной; вдоль дорог, на залежах. Редко. Однолетник.

Род 11. Недоспелка – *Cacalia* L.

Cacalia auriculata DC.: Шишкин, 1930 – **Н. ушастая**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; тенистые смешанные леса. Нередко. Многолетник.

Cacalia hastata L.: Шишкин, 1930 – **Н. копьевидная**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; междуречье

Арму – Большая Уссурка; руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; долинные лиственные леса, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 12. **Карпезий – *Carpesium* L.**

Carpesium triste Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. печальный**. Ключи: Никиткин, Островной; смешанные леса. Редко. Многолетник.

Род 13. **Бодяк – *Cirsium* Mill.**

Cirsium arvense (L.) Scop.: Шишкин, 1930 – **Б. полевой**. Ключ Островной, с. Дерсу, КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, речные наносы, залежи. Нередко. Многолетник.

Cirsium pendulum Fisch.: Шишкин, 1930 – **Б. поникающий**. Ключи: Островной, Николаев, Широкий; КПП 1 «Корейский»; ивняки, антропогенные местообитания, кустарниковые заросли, дороги. Относительно редко. Двулетник.

Cirsium schantarense Trautv. et C.A. Mey.: Шишкин, 1930 – **Б. шантарский**. Ключи: Островной, Николаев, Трофимов, Широкий; КПП 1 «Корейский», р. Лесовозная; дубняки, ясеневники, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Cirsium setosum (Willd.) M. Vieb.: Баркалов и др., 1992 (рис. 70, с. 306) – **Б. щетинистый**. р. Большая Уссурка, с. Дерсу; берега рек, антропогенные местообитания. Нередко. Многолетник. Заносный вид.

Cirsium vlassovianum Fisch.: Шишкин, 1930 – **Б. Власова**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные луга. Редко. Многолетник.

Род 14. **Кониза – *Conyza* Less.**

Conyza canadensis (L.) Cronquist (как *Erigeron canadensis* L.: Шишкин, 1930) – **К. канадская**. Ключ Островной, с. Дерсу; нарушенные местообитания, обочины проселочных дорог. Нередко. Однолетник. Заносный вид.

Род 15. **Скерда – *Crepis* L.**

Crepis tectorum L.: Шишкин, 1930 – **С. кровельная**. Ключ Островной, с. Дерсу; нарушенные местообитания, обочины проселочных дорог. Относительно редко. Одно- или двулетник. Заносный вид.

Род 16. **Деллингерия – *Doellingeria* Nees**

Doellingeria scabra (Thunb.) Nees (как *Aster scaber* Thunb.: Шишкин, 1930) – **Д. шершавая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняк, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 17. **Мелколепестник – *Erigeron* L.**

Erigeron manshuricus (Kom.) Worosch. (как *E. acris* var. *manshuricus* Kom.: Шишкин, 1930) – **М. маньчжурский**. Ключ Островной; луга, кустарниковые заросли. Редко. Двулетник.

Род 18. **Посконник – *Eupatorium* L.**

Eupatorium lindleyanum DC. (как *E. kirilowii* Turcz., Шишкин, 1930) – **П. Линдлея**. КПП 1 «Корейский»; сырые и суходольные луга, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Род 19. Сушеница – **Gnaphalium L.**

**Gnaphalium uliginosum* L.: Шишкин, 1930 – С. топяная. Ключ Островной, с. Дальний Кут; сырые антропогенные местообитания. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 20. Ястребинка – **Hieracium L.**

Hieracium umbellatum L.: Шишкин, 1930 – Я. зонтичная. Ключ Островной; дубняк, кустарниковые заросли, суходольные луга. Часто. Многолетник.

Hieracium virosum Pall. Шишкин, 1930 – Я. ядовитая. Ключ Островной; галечники, берега рек, луговые склоны. Редко. Многолетник.

Род 21. Девясил – **Inula L.**

Inula britannica L.: Шишкин, 1930 – Д. британский. Ключ Островной; кустарниковые заросли. Редко Многолетник.

**Inula salicina* L.: Шишкин, 1930 – Д. ивовый. Ключ Островной, с. Дальний Кут; кустарниковые заросли, луга. Редко. Многолетник.

Род 22. Иксеридиум – **Ixeridium (A. Gray) Tzvelev**

**Ixeridium gramineum* (Fisch.) Tzvelev: Баркалов и др., 1992 (рис. 81, с. 342) – И. злаковидный. Дубняки, кустарниковые заросли, обочины дорог. Редко. Многолетник.

Род 23. Якобея, или крестовник, – **Jacobaea Mill.**

Jacobaea argunensis (Turcz.) V. Nord. (как *Senecio argunensis* Turcz.: Шишкин, 1930) – Я. аргунская. Ключ Островной; речные наносы, кустарниковые заросли. Нечасто. Многолетник.

Jacobaea cannabifolia (Less.) E. Wiebe (как *Senecio palmatus* Pall.: Шишкин, 1930) – Я. коноплеволистная. Ключи: Ковалевский, Островной, КПП 1 «Корейский»; вдоль дорог, ручьев, поляны, опушки лиственных долинных лесов. Нередко. Многолетник.

Род 24. Калимерис – **Kalimeris Cass.**

Kalimeris incisa (Fisch.) DC. (как *Aster incisus* Fisch.: Шишкин, 1930) – К. надрезанный. КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог, ключ Широкий; луга, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 25. Лейбница – **Leibnitzia Cass.**

Leibnitzia anandria (L.) Turcz. – Л. бестычиночная. КПП 1 «Корейский»; дубняки. Редко. Многолетник.

Род 26. Бузульник – **Ligularia Cass.**

Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. (как *L. speciosa* (Schrad. ex Link) Fisch. et S.A. Mey.: Шишкин, 1930) – Б. Фишера. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Островной; КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; р. Лесовозная; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 27. Латук – **Mulgedium Cass.**

Mulgedium sibiricum (L) Cass. ex Less.: Шишкин, 1930 – Л. сибирский. КПП 1 «Корейский»; обочины дорог, нарушенные местообитания, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Род 28. **Параиксерис – Paraixeris Nakai**

Paraixeris denticulata (Houtt.) Nakai (как *Lactuca denticulata* Maxim.: Шишкин, 1930) – **П. мелкозубчатый**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, каменистые местообитания. Редко. Однолетник.

Род 29. **Белокопытник – Petasites Mill.**

Petasites tatewakianus Kitam. (как *P. palmata* A. Gray: Куренцов, 1935) – **Б. Татеваки**. Ключ Яков, урочище Ороchonский Бог, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; берега рек и ручьев. Часто. Многолетник.

Род 30. **Фалакролома – Phalacroloma Cass.**

Phalacroloma annuum (L.) Dumort. – **Ф. однолетняя**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; кустарниковые заросли, луга. Нередко. Однолетник. Заносный вид.

Род 31. **Горлюха – Picris L.**

Picris japonica Thunb.: Шишкин, 1930 – **Г. японская**. Ключи: Никиткин, Островной, Широкий; песчано-галечные наносы, обочины дорог. Относительно редко. Однолетник.

Род 32. **Чихотник – Ptarmica Mill.**

Ptarmica alpina (L.) DC. (как *Achillea sibirica* Ledeb.: Шишкин, 1930) – **Ч. альпийский**. Ключи: Никиткин, Островной; разнотравные луга. Нередко. Многолетник.

Ptarmica ptarmicoides (Maxim.) Worosch. (как *Achillea ptarmica* L.: Шишкин, 1930) – **Ч. птармиковидный**. Ключ Островной; вейниковые луга, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Род 33. **Крылатосемянник – Pterocypsela Shih**

Pterocypsela indica (L.) Shih (как *Lactuca squarrosa* (L.) Miq.: Шишкин, 1930) – **К. индийский**. Урочище Ороchonский Бог; дубняки, кустарниковые заросли, песчано-галечниковые наносы, обочины дорог, нарушенные местообитания. Редко. Многолетник.

Pterocypsela raddeana (Maxim.) Shih (как *Lactuca raddeana* Maxim.: Шишкин, 1930) – **К. Радде**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Pterocypsela triangulata (Maxim.) Shih (как *Lactuca triangulata* Maxim.: Шишкин, 1930) – **К. треугольный**. Ключи: Николаев, Островной; урочище Ороchonский Бог; сырые галечники, скалы, дубняки, дороги. Относительно редко. Многолетник.

Род 34. **Соссюрея – Saussurea DC.**

Saussurea amurensis Turcz.: Шишкин, 1930 – **С. амурская**. Ключ Островной, урочище Ороchonский Бог, осоково-разнотравные кочкарные болота, сырые луга и окраины болот. Часто. Многолетник.

Saussurea manshurica Kom. – **С. маньчжурская**. Урочище Ороchonский Бог; скальные выходы. Редко. Многолетник.

Saussurea neoserrata Nakai (как *S. serrata* DC.: Шишкин, 1930) – **С. новопильчатая**. Ключ Островной; сырые смешанные леса, берега рек и ключей. Редко. Многолетник.

Saussurea neopolchella Lipsch. – **С. новохорошенькая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; скалистые обнажения, кустарниковые заросли, пойменные разнотравные луга, по лесным опушкам. Нередко. Многолетник.

Saussurea ussuriensis Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. уссурийская**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли, сухие склоны. Нередко. Многолетник.

Род 35. **Серпуха – Serratula L.**

Serratula manshurica Kitag. (как *S. coronata* L.: Шишкин, 1930) – **С. маньчжурская**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кедрово-широколиственные леса, разнотравные луга. Часто. Многолетник.

Род 36. **Сигезбекия – Sigesbeckia L.**

Sigesbeckia orientalis L.: Шишкин, 1930 – **С. восточная**. Ключ Островной; вдоль дорог, залежи. Редко. Однолетник. Заносный вид.

Род 37. **Осот – Sonchus L.**

Sonchus arvensis L.: Шишкин, 1930 – **О. полевой**. Ключ Островной, урочище Орочонский Бог, р. Малая Пихтовка; нарушенные местообитания, кустарниковые заросли, залежи. Нередко. Многолетник. Заносный вид.

Род 38. **Синейлезис – Syneleisis Maxim.**

Syneleisis aconitifolia (Bunge) Maxim. (как *Cacalia aconitifolia* Bunge: Шишкин, 1930) – **С. борцоволистный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», дубняк, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Род 39. **Сростнохвостник – Synurus Pjij**

Synurus deltoides (Aiton) Nakai (как *S. atriplicifolius* Pjij: Шишкин, 1930) – **С. дельтовидный**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кедрово-широколиственные леса, скалистые обнажения, луга. Относительно часто. Многолетник.

Род 40. **Пижма – Tanacetum L.**

Tanacetum boreale Fisch. ex DC. – **П. северная**. КПП 1 «Корейский»; долины рек и ручьев, на отмелях и галечниках. Редко. Многолетник.

Род 41. **Одуванчик – Taraxacum Wigg.**

Taraxacum brassicifolium Kitag. – **О. реполистный**. Ключ Широкий; вдоль дорог. Часто. Многолетник.

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.: Шишкин, 1930 – **О. монгольский**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», урочище Орочонский Бог; разнотравные луга, речные наносы, залежи, кустарниковые заросли, вдоль дорог. Часто. Многолетник.

Taraxacum officinale F.H. Wigg. – **О. лекарственный**. Ключи: Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка; пески, галечники, вдоль дорог. Нередко. Многолетник. Заносный вид.

Род 42. **Пепельник – Tephroseris (Rchb.) Rchb.**

Tephroseris kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub – **П. Кирилова**. КПП 1 «Корейский», с. Дерсу, сырые луга. Редко. Многолетник.

Род 43. **Троммдорфия – Trommsdorffia Bernh.**

Trommsdorffia ciliata* (Thunb.) Soják (как *Hypochoeris grandiflora* Ledeb.: Шишкин, 1930) – **Т. реснитчатая. Разнотравные луга, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Сем. 95. **ЧАСТУХОВЫЕ – ALISMATACEAE**

Род 1. **Частуха – Alisma L.**

Alisma plantago-aquatica L.: Шишкин, 1930 – **Ч. подорожниковая**. Ключ Островной; речные берега, вдоль дорог. Нередко. Многолетник.

Сем. 96. **РДЕСТОВЫЕ – POTAMOGETONACEAE**

Род 1. **Рдест – Potamogeton L.**

Potamogeton perfoliatus L.: Шишкин, 1930 – **Р. пронзённолистный**. Пасечный руч.; озера, зарастающие старицы. Изредка. Многолетник.

Сем. 97. **МЕЛАНТИЕВЫЕ – MELANTHIACEAE**

Род 1. **Чемерица – Veratrum L.**

Veratrum dahuricum (Turcz.) O. Loes. (как *V. album* L. var. *dauricum* Turcz.: Шишкин, 1930) – **Ч. даурская**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Широкий, междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; сырые луга. Часто. Многолетник.

Veratrum dolichopetalum O. Loes. – **Ч. длиннолепестковая**. Ключи: Ковальский, Кордонный, Островной, Яков, Широкий; берега ключей в хвойно-широколиственных лесах. Нередко. Многолетник.

Veratrum maackii Regel: Шишкин, 1930 – **Ч. Маака**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, луга, кустарниковые заросли. Относительно редко. Многолетник.

Veratrum oxysepalum Turcz.: Крестов, 1993а – **Ч. остродольная**. Ключи: Ковалевский, Яков, междуречье Арму и Большая Уссурка; кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Veratrum ussuriense (O. Loes.) Nakai (как *V. nigrum* L.: Шишкин, 1930) – **Ч. уссурийская**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Сем. 98. **ЛИЛИЕВЫЕ – LILIACEAE**

Род 1. **Гусиный лук – Gagea Salisb.**

Gagea terraccianoana Pasch. – **Г. л. Терраччиано**. КПП 1 «Корейский», дубняк, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 2. **Лилия – Lilium L.**

Lilium buschianum Lodd. – **Л. Буша**. КПП 1 «Корейский», луга, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Lilium distichum Nakai ex Kamib. (как *L. avenaceum* Fisch. ex Maxim.: Шишкин, 1930) – **Л. двурядная**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной,

Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный; реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Относительно часто. Многолетник.

Lilium pensylvanicum Ker Gawl. (как *L. dauricum* Reuthe: Шишкин, 1930) – **Л. пенсильванская**. Ключи: Ковалевский, Островной; КПП 1 «Корейский», урочище Ороchonский Бог, руч. Пасечный, дубняк, кустарниковые заросли, скалы вдоль р. Большая Уссурка. Часто. Многолетник.

Сем. 99. ЛУКОВЫЕ – ALLIACEAE

Род 1. Лук – *Allium* L.

Allium ledebourianum Schult. et Schult. fil.: Шишкин, 1930 – **Л. Ледебур**. Долинный лиственный лес. Редко. Многолетник.

Allium maximowiczii Regel – **Л. Максимовича**. КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли вдоль р. Большая Уссурка. Нередко. Многолетник

Allium monanthum Maxim. – **Л. одноцветковый**. КПП 1 «Корейский»; дубняки. Редко. Многолетник.

Allium sacculiferum Maxim.: Шишкин, 1930 – **Л. мешочконосный**. Ключ Островной;вейниковые луга речных долин, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Allium senescens L.: Шишкин, 1930 – **Л. стареющий**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Allium strictum Schrad. (как *A. lineare* Willd. ex Kunth: Шишкин, 1930) – **Л. торчащий**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; скальные обнажения, каменистые склоны. Редко. Многолетник.

Сем. 100. КРАСОДНЕВНЫЕ – NEMEROCALLIDACEAE

Род 1. Красоднев – *Nemerocallis* L.

Nemerocallis lilio-asphodelus* L. (как *Nemerocallis flava* (L.) L.: Куренцов, 1935) – **К. жёлтый. Долина р. Большая Уссурка; кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Nemerocallis middendorffii Trautv. et С.А. Mey.: Шишкин, 1930 – **К. Миддендорфа**. Ключи: Ковалевский, Островной; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», Лаулинский прижим, р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли, скалы. Часто. Многолетник.

Nemerocallis minor* Mill.: Куренцов, 1935 – **К. малый. Долина р. Большая Уссурка; скалистые обнажения. Нередко. Многолетник.

Сем. 101. СПАРЖЕВЫЕ – ASPARAGACEAE

Род 1. Спаржа – *Asparagus* L.

Asparagus schoberioides Kunth: Шишкин, 1930 – **С. шобериевидная**. Ключи: Ковалевский, Островной, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, р. Лесовозная; кедровники, кустарниковые заросли, лиственные леса. Нередко. Многолетник.

Сем. 102. ЛАНДЫШЕВЫЕ – CONVALLARIACEAE

Род 1. Клинтония – *Clintonia* Raf.

Clintonia udensis Trautv. et С.А. Меу. – **К. удская**. Ключи: Левый Михайловский, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, кедрово-еловые леса. Нередко. Многолетник.

Род 2. Ландыш – *Convallaria* L.

Convallaria keiskei Miq. (как *C. majalis* L.: Шишкин, 1930) – **Л. Кейске**. Ключи: Ковалевский, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Лесовозная, руч. Пасечный; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Род 3. Диспорум – *Disporum* Salisb. ex D. Don

Disporum viridescens (Maxim.) Nakai (как *D. smilacinum* A. Gray var. *viridescens* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Д. зеленеющий**. Ключи: Ковалевский, Островной; КПП 1 «Корейский»; лиственные леса. Нередко. Многолетник.

Род 4. Майник – *Maianthemum* Wigg.

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt: Шишкин, 1930 – **М. двулистный**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; руч. Пасечный; хвойно-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr.: Шишкин, 1930 – **М. широколистный**. Ключи: Ковалевский, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, руч. Пасечный, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка; хвойно-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 5. Купена – *Polygonatum* Mill.

Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. низкая**. Ключ Ковалевский, КПП 1 «Корейский», дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Polygonatum involucratum (Franch. et Sav.) Maxim.: Шишкин, 1930 – **К. обертковая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки. Часто. Многолетник.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (как *P. officinale* All.: Шишкин, 1930) – **К. душистая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», с. Дерсу; луга, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 6. Смилацина – *Smilacina* Desf.

Smilacina dahurica Turcz. ex Fisch. et С.А. Меу. – **С. даурская**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; долинные, кедрово-лиственничные леса. Нередко. Многолетник.

Smilacina hirta Maxim.: Шишкин, 1930 – **С. волосистая**. Ключи: Ковалевский, Никиткин, Николаев, Островной, Яков; междуречье Арму – Большая Уссурка; долинные кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Сем. 103. **КАСАТИКОВЫЕ – IRIDACEAE**

Род 1. **Касатик – Iris L.**

Iris ensata Thunb. (как *I. kaempferi* Siebold: Шишкин, 1930) – **К. мечевидный**. Ключ Островной, с. Дерсу; суходольные луга, реже сырые луга, дубняк. Нередко. Многолетник. Включен в КК РФ, КК ПК.

Iris laevigata Fisch. et С.А. Mey.: Шишкин, 1930 – **К. гладкий**. Ключ Островной, руч. Пасечный; болота, берега водоемов. Нередко, местами образует скопления. Многолетник. Многолетник. Включен в КК ПК.

Iris setosa Pall. ex Link – **К. щетинистый**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Широкий; КПП 1 «Корейский»; сырые луга, обочины дорог. Относительно редко. Многолетник.

Iris uniflora Pall. ex Link: Шишкин, 1930 – **К. одноцветковый**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубовые леса, скалистые обнажения. Редко. Многолетник.

Сем. 104. **ТРИЛЛИУМОВЫЕ – TRILLIACEAE**

Род 1. **Вороний глаз – Paris L.**

Paris verticillata M. Vieb. – **В. г. мутовчатый**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Малая Пихтовка, руч. Пасечный, р. Лесовозная; кедрово-широколиственные, кедрово-еловые леса. Часто. Многолетник.

Сем. 105. **ДИОСКОРЕЕВЫЕ – DIOSCOREACEAE**

Род 1. **Диоскорея – Dioscorea L.**

Dioscorea nipponica Makino (как *D. quinqueloba* Thunb.: Шишкин, 1930) – **Д. японская**. Ключи: Ковалевский, Островной, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, руч. Пасечный, р. Лесовозная; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник. Лиана.

Сем. 106. **ОРХИДНЫЕ – ORCHIDACEAE**

Род 1. **Пыльцеголовник – Cephalanthera Rich.**

Cephalanthera longibracteata Blume – **П. длинноприцветниковый**. Ключи Николаев, Островной; КПП 1 «Корейский»; дубовые, кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник. Вид включен в КК РФ, КК ПК, КС МСОП.

Род 2. **Венерин башмачок – Cypripedium L.**

Cypripedium calceolus L. – **В. б. настоящий**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», дубняки. Редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ, КК ПК и КС МСОП.

Cypripedium macranthon Sw. – **В. б. крупноцветковый**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», дубняки, кедрово-широколиственные леса. Очень редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ, КК ПК и КС МСОП.

Cypripedium ventricosum Sw.: Шишкин, 1930 – **В. б. вздутый**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки. Редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ, КК ПК.

Род 3. Дремлик – ***Epipactis* Zinn**

Epipactis papillosa Franch. et Sav. (как *Epipactis latifolia* var. *papillosa* (Franch. et Sav.) Maxim. ex Kom.: Шишкин, 1930) – **Д. сосочковый**. КПП 1 «Корейский»; дубняк. Очень редко. Многолетник.

Род 4. Галеарис – ***Galearis* Raf.**

Galearis cyclochila (Franch. et Sav.) Soó (как *Orchis cyclochila* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Г. круглогубый**. с. Дальний Кут, ключ Островной, р. Малая Пихтовка; долинные хвойно-широколиственные леса. Редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ, КК ПК.

Род 5. Поводник – ***Habenaria* Willd.**

****Habenaria linearifolia*** Maxim.: Шишкин, 1930 – **П. линейнолистный**. Ключ Островной, с. Дальний Кут; сырые луга, окраины болот. Редко. Многолетник.

Род 6. Глянцелистник – ***Liparis* Rich.**

Liparis japonica (Miq.) Maxim.: Шишкин, 1930 – **Г. японский**. Ключ Кордонный; долинный кедровник с ильмом и ясенем. Очень редко. Многолетник. Вид включен в КК РФ, КК ПК.

Род 7. Горноятрышник – ***Oreorchis* Lindl.**

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. – **Г. раскидистый**. Ключи: Николаев, Островной, Лаулинский прижим, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; дубовые, хвойно-широколиственные и белоберезовые леса. Редко. Многолетник.

Род 8. Любка – ***Platanthera* Rich.**

Platanthera densa Freyn – **Л. Фрейна**. Никиткин ключ; травяно-кустарниковые заросли у обочины дороги. Редко. Многолетник.

Platanthera metabifolia F. Maek. (как *Platanthera extremiorientalis* Nevski: Крестов, 1993а) – **Л. дальневосточная**. Перевал к р. Заманиха; кедрово-широколиственные леса. Многолетник.

Сем. 107. СИТНИКОВЫЕ – **JUNCACEAE**

Род 1. Ситник – ***Juncus* L.**

Juncus bufonius L.: Шишкин, 1930 – **С. жабий**. Ключ Островной, антропогенные местообитания, речные наносы. Относительно часто. Однолетник.

Juncus decipiens (Buchenau) Nakai (как *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchenau: Шишкин, 1930) – **С. сомнительный**. Ключ Островной, антропогенные местообитания, придорожные кюветы, сырые луга, окраины болот. Часто. Многолетник.

****Juncus papillosus*** Franch. et Sav.: Шишкин, 1930 – **С. сосочковый**. Ключ Островной, с. Дальний Кут, антропогенные местообитания, сырые луга. Относительно редко. Многолетник.

Род 2. Ожика – ***Luzula* DC.**

****Luzula multiflora*** (Ehrh.) Lej.: Шишкин, 1930 – **О. многоцветковая**. Ключ Островной, с. Дальний Кут, кустарниковые заросли, разнотравные луга. Нередко. Многолетник. Заносный вид.

Luzula pallescens Sw. – **О. бледноватая**. КПП 1 «Корейский», суходольные луга, кустарниковые заросли, опушки дубняков. Относительно редко. Многолетник.

Сем. 108. **СЫТЕВЫЕ – CYPERACEAE**

Род 1. **Осока – Carex L.**

Carex appendiculata (Trautv. et С.А. Меу.) Kük.: Крестов, 1993б – **О. придатконосная**. Долина р. Большая Уссурка, ключ Пасечный; долинные лиственные леса, берега ручьев, болота, сырые луга. Часто. Многолетник.

Carex arnelii Christ: Крестов, 1993б – **О. Арнела**. Ключ Широкий, реки: Арму, Малая Пихтовка, руч. Пасечный; долинный кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Carex augustinowiczii Meinsh. ex Korsh.: Шишкин, 1930 – **О. Августиновича**. Ключи: Островной, Яков; кедрово-широколиственные леса, берега горных ручьев. Нередко. Многолетник.

Carex bostrychostigma Maxim. – **О. курчаворыльцевая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; лесные дороги и тропы, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Carex callitrichos V.I. Krecz.: Крестов, 1993а – **О. красовлас**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий, слияние рек Арму и Большая Уссурка; сухие кедровники, дубняки, кедро-дубняки. Часто. Многолетник.

Carex campylorhina V.I. Krecz.: Крестов, 1993а – **О. кривоносая**. Ключи: Ковалевский, Островной; реки: Арму, Малая Пихтовка, Лесовозная; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Carex canescens L. – **О. пепельно-серая**. р. Малая Пихтовка; болота, мари. Часто. Многолетник.

Carex capituliformis Meinsh. ex Maxim. – **О. головковидная**. Ключи: Ковалевский, Островной, Широкий, Яков, р. Арму, р. Малая Пихтовка, р. Лесовозная; долинные кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Carex cryptocarpa С.А. Меу. – **О. скрытоплодная**. Ключ Островной; сырые луга, болота и берега водоемов. Относительно редко. Многолетник.

Carex dispalata Boott: Шишкин, 1930 – **О. расходящаяся**. Ключ Островной, междуречье Арму и Большая Уссурка; долинные лиственные леса, сырые луга, берега ручьев. Очень часто, местами массово. Многолетник.

Carex disperma Dew. – **О. двусемянная**. Ключ Пасечный, р. Малая Пихтовка; кедрово-еловые, кедрово-лиственничные леса. Редко. Многолетник.

Carex drymophila Turcz. ex Steud.: Шишкин, 1930 – **О. лесолюбивая**. Ключи: Кордонный, Островной, Широкий, Яков, КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка, долинные лиственные леса, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Carex egena H. Lév. et Vaniot: Крестов, 1993а, б – **О. неродящая**. Реки: Арму, Малая Пихтовка; долинные кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Carex falcata Turcz. – **О. серповидная**. Островной ключ, КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, болота. Нередко. Многолетник.

Carex jankowskii Gorodkov – **О. Янковского**. Островной ключ; сырые луга. Относительно редко. Многолетник.

Carex laevis Nakai – **О. гладчайшая**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; вдоль дорог. Нередко. Многолетник.

Carex lanceolata Boott: Крестов, 1993а – **О. ланцетная**. КПП 1 «Корейский», ключ Островной; дубняки, кедро-дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Carex lancibracteata A.E. Kozhev. – **О. ланцетноприцветниковая**. Дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Carex lasiocarpa Ehrh.: Шишкин, 1930 – **О. волосистоплодная**. Ключ Островной; болота травяно-осоковые. Часто. Многолетник.

Carex latisquamea Kom. – **О. широкочешуйная**. Р. Арму; кустарниковые заросли, сырые луга. Относительно редко. Многолетник.

Carex leiorrhyncha С.А. Меу.: Шишкин, 1930 – **О. гладконосая**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания. Редко. Многолетник.

Carex limosa L.: Шишкин, 1930 – **О. топяная**. Ключ Островной, р. Малая Пихтовка; болота, зарастающие водоемы. Нередко. Многолетник.

Carex loliacea L. – **О. плевельная**. Ключ Островной; кустарники, берега водоемов. Многолетник.

Carex longirostrata С.А. Меу. – **О. длинноклювая**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Carex maackii Maxim. – **О. Маака**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Carex meyeriana* Kunth: Куренцов, 1935 – **О. Мейера. Долина р. Большая Уссурка; болота, сырые луга. Нередко. Многолетник.

Carex nanella Ohwi: Крестов 1993а – **О. низенькая**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кедро-дубняки, каменистые местообитания. Относительно часто. Многолетник.

Carex pallida С.А. Меу.: Шишкин, 1930 – **О. бледная**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; дубняки, кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

– *Carex pediformis* С.А. Меу.: Шишкин, 1930 – **О. стоповидная**. Леса, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

– *Carex pilosa* Scop.: Шишкин, 1930 – **О. волосистая**. Леса, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Carex quadriflora (Kuk.) Ohwi – **О. четырёхцветковая**. Ключи: Трофимов, Широкий, Яков; КПП 1 «Корейский»; реки Арму, Малая Пихтовка; кедрово-широколиственные леса. Нередко. Многолетник.

Carex remotiuscula Wahlenb. – **О. немногораздвинутая**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; дубняки, долинные кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Carex reventa V.I. Krecz.: Крестов 1993а – **О. возвратившаяся**. КПП 1 «Корейский», ключ Трофимов, р. Лесовозная; дубняки, кедро-дубняки. Нередко. Многолетник.

Carex sabyneensis Less. ex Kunth: Кожевников, 1988 (рис. 74, с. 263) – **О. шабинская**. КПП 1 «Корейский», р. Большая Уссурка; хвойные и лиственные леса. Редко. Многолетник.

Carex schmidtii Meinsh.: Шишкин, 1930 – **О. Шмидта**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; КПП 1 «Корейский»; сырые луга. Часто. Многолетник.

Carex siderosticta Нансе: Шишкин, 1930 – **О. ржавопятнистая**. Ключи: Ковалевский, Левый Михайловский, Островной, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, урочище Орочонский Бог, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки: Малая Пихтовка, Лесовозная; кедрово-широколиственные леса, дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Carex sordida Neurck et Müll. Arg.: Крестов, 1993а – **О. грязная**. Ключ Широкий, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; реки Арму, Малая Пихтовка; долинны кедрово-широколиственные леса, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Carex subbracteata (Kük.) Ohwi: Кожевников, 1988 (рис. 76, с. 268) – **О. малоприцветниковая**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кедрово-широколиственные леса. Редко. Многолетник.

Carex tenuiflora Wahlenb. – **О. тонкоцветковая**. р. Малая Пихтовка; лиственничники, болота. Часто. Многолетник.

Carex uda Maxim. – **О. мочажинная**. Ключи: Ковалевский, Островной, кедрово-еловые леса, сырые участки, берега ручьев. Нередко. Многолетник.

Carex ussuriensis Kom.: Шишкин, 1930 – **О. уссурийская**. Ключи: Николаев, Островной, Трофимов; кедрово-широколиственные леса, кедро-дубняки, дубняки. Часто. Многолетник.

Carex xiphium Kom.: Шишкин, 1930 – **О. мечевидная**. Островной Ключ, междуречье Арму – Большая Уссурка; кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Carex vesicata Meinsh.: Кожевников, 1988 (рис. 104, с. 348) – **О. пузыреватая**. КПП 1 «Корейский», берега рек, сырые луга. Многолетник.

Род 2. Сыть – *Cyperus* L.

Cyperus orthostachyus Franch. et Sav. (как *C. truncatus* Turcz.: Шишкин, 1930) – **С. прямоколосая**. Островной Ключ, с. Дальний Кут; сырые участки у дорог, антропогенные местообитания. Часто. Однолетник.

Род 3. Болотница – *Eleocharis* R. Br.

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.: Шишкин, 1930 – **Б. болотная**. КПП 1 «Корейский», ключ Широкий; берега рек, болота. Часто. Многолетник.

Род 4. Пушица – *Eriophorum* L.

Eriophorum komarovii* V.N. Vassil.: Кожевников, 1988 (рис. 61, с. 194) – **П. Комарова, долина р. Большая Уссурка; болота. Редко. Многолетник.

Eriophorum russeolum Fr. – **П. рыжеватая**. р. Малая Пихтовка; осоково-моховые болота. Нечасто. Многолетник.

Eriophorum vaginatum* L.: Шишкин, 1930 – **П. влагалищная. Островной Ключ; осоково-моховые болота. Редко. Многолетник.

Род 5. **Схеноплектус – Schoenoplectus (Rchb.) Palla**

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla (как *Scirpus tabernaemontani* C.C. Gmel.: Шишкин, 1930) – **С. Табернемонтана**, или **камыш Табернемонтана**. Островной ключ; берега водоемов, заболоченные луга. Редко. Многолетник.

Schoenoplectus nipponicus (Makino) Soják – **С. nipponicus**. КПП 1 «Корейский»; мелководья, берега водоемов. Редко. Многолетник.

Род 6. **Камыш – Scirpus L.**

Scirpus orientalis Ohwi – **К. восточный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный, реки: Лесовозная, Малая Пихтовка; берега водоемов, заболоченные луга. Часто. Многолетник.

Scirpus radicans Schkuhr: Шишкин, 1930 – **К. укореняющийся**. Ключ Островной; берег водоемов, болотца у дороги. Редко. Многолетник.

Сем. 109. **КОММЕЛИНОВЫЕ – COMMELINACEAE**

Род 1. **Коммелина – Commelina L.**

Commelina communis L.: Шишкин, 1930 – **К. обыкновенная**. Ключ Островной; нарушенные местообитания, речные наносы. Редко. Однолетник.

Сем. 110. **МЯТЛИКОВЫЕ – POACEAE**

Род 1. **Чий – Achnatherum Beauv.**

Achnatherum extremorientale (Hara) Keng (как *Stipa effusa* (Maxim.) Nakai: Шишкин, 1930) – **Ч. дальневосточный**. Ключ Островной; дубняки, кустарниковые заросли. Относительно часто. Многолетник.

Род 2. **Полевица – Agrostis L.**

Agrostis clavata Trin.: Шишкин, 1930 – **П. булавовидная**. Ключ Островной, луга речных долин, антропогенные местообитания. Нередко. Многолетник.

Agrostis trinii Turcz.: Пробатова, 1985 (рис. 81, с. 208) – **П. Триниуса**. КПП 1 «Корейский», луга, обочины дорог, окраины полей. Многолетник.

Род 3. **Лисохвос – Alopecurus L.**

Alopecurus aequalis Sobol. (как *A. amurensis* Kom.: Шишкин, 1930) – **Л. равный**. Ключ Островной; берега рек, сырые луга. Часто. Многолетник.

Род 4. **Артраксон – Arthraxon P. Beauv.**

Arthraxon langsdorffii (Trin.) Roshev. (как *A. ciliaris* P. Beauv. subsp. *langsdorffii* (Trin.) Hack.: Шишкин, 1930) – **А. Лангсдорфа**. Ключ Островной; антропогенные местообитания, сырые луга, болота. Часто. Однолетник.

Род 5. **Тростянка – Arundinella Raddi**

Arundinella anomala Steud.: Шишкин, 1930 – **Т. аномальная**. Ключ Островной; дубняки, разнотравные луга. Часто. Многолетник.

Род 6. Бекмания – *Beckmannia* Host

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. (как *B. eruciformis* Host: Шишкин, 1930) – **Б. восточная**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, сырые участки. Относительно редко. Многолетник.

Род 7. Вейник – *Calamagrostis* Adans.

Calamagrostis angustifolia Kom. – **В. узколистный**. Пасечный руч.; болота, сырые луга, ольшаник. Нередко. Многолетник.

Calamagrostis barbata V.N. Vassil.: Пробатова, 1985 (рис. 78, с. 199) – **В. бородатый**. КПП 1 «Корейский»; кустарниковые заросли. Многолетник.

Calamagrostis brachytricha Steud.: Шишкин, 1930 – **В. короткокохололковый**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, осыпи. Нередко. Многолетник.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth: Шишкин, 1930 – **В. наземный**. КПП 1 «Корейский», кустарниковые заросли, сырые и суходольные луга, антропогенные местообитания. Часто. Многолетник.

Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.: Шишкин, 1930 – **В. Лангсдорфа**. Ключи: Островной, Широкий; КПП 1 «Корейский»; р. Малая Пихтовка; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) P. Gaertn., В. Mey. et Schreb.: Куренцов, 1935 – **В. незамечаемый. Долина р. Большая Уссурка; влажные луга. Нередко. Многолетник.

Род 8. Цинна – *Cinna* L.

Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. (как *C. pendula* Trin.: Шишкин, 1930) – **Ц. широколистная**. Ключ Ковалевский, р. Арму; смешанные леса, берега ключиков и ручьев. Редко. Многолетник.

Род 9. Росичка – *Digitaria* Hall.

Digitaria ischaetum (Schreb.) Muhl. (как *D. linearis* Krock.: Шишкин, 1930) – **Р. обыкновенная**. Вдоль дорог, на залежах. Нередко. Однолетник. Заносный вид.

Род 10. Ежовник – *Echinochloe* Beauv.

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. (как *Panicum crus-galli* L.: Шишкин, 1930) – **Е. обыкновенный**, или **куриное просо**. Ключ Островной, с. Дерсу; антропогенные местообитания, окраины полей, залежи, приречные пески, луга, придорожные канавы. Часто. Однолетник.

Род 11. Пырейник – *Elymus* L.

Elymus sibiricus L.: Шишкин, 1930 – **П. сибирский**. КПП 1 «Корейский»; берега рек, галечники, прибрежные скалы. Часто. Многолетник.

Род 12. Пырей – *Elytrigia* Desv.

Elytrigia repens (L.) Nevski (как *Agropyron repens* P. Beauv.: Шишкин, 1930) – **П. ползучий**. КПП 1 «Корейский», антропогенные местообитания, обочины дорог, задернованные речные галечники. Часто. Многолетник.

Род 13. Гусятник – *Eragrostis* M.N. Wolf

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.: Шишкин, 1930 – **Г. волосистый**. Ключ Островной, с. Дальний Кут; антропогенные местообитания, галечниковые отложения. Редко. Однолетник.

Род 14. Овсяница – *Festuca* L.

Festuca extremiorientalis Ohwi – **О. дальневосточная**. урочище Орочонский Бог; дубняки, кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Festuca rubra L. – **О. красная**. Ключи: Островной, Широкий; сырые и суходольные луга, антропогенные местообитания. Часто. Многолетник.

Род 15. Манник – *Glyceria* R. Br.

Glyceria leptolepis Ohwi – **М. тонкочешуйный**. КПП 1 «Корейский»; вдоль дорог, по берегам водоемов. Нередко. Многолетник.

Glyceria triflora (Korsh.) Kom. – **М. трехцветковый**. Ключ Широкий; берега водоемов, болот. Редко. Многолетник.

Род 16. Зубровка – *Hierochloë* R. Br.

Hierochloë glabra Trin. – **З. голая**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, луга. Относительно редко. Многолетник.

Род 17. Шероховатка – *Hystrix* Moench

Hystrix komarovii (Roshev.) Ohwi: Пробатова, 1985 (рис. 48, с. 132) – **Ш. Комарова**. Долина р. Большая Уссурка; долинные лиственные леса, галечники лесных ручьев. Редко. Многолетник.

Род 18. Перловник – *Melica* L.

Melica nutans L. – **П. поникающий**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский», руч. Пасечный; кустарниковые заросли. Нередко. Многолетник.

Melica turczaninowiana Ohwi (как *M. gmelini* Turcz.: Шишкин, 1930) – **П. Турчанинова**. Ключ Николаев, КПП 1 «Корейский»; каменистые склоны, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Род 19. Бор – *Milium* L.

Milium effusum L.: Шишкин, 1930 – **Б. развесистый**. Реки Арму, Малая Пихтовка; смешанные леса, реже дубняки. Редко. Многолетник.

Род 20. Веероцветник – *Miscanthus* Anderss.

Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth.: Шишкин, 1930 – **В. сахароцветный**. Ключ Островной, КПП 1 «Корейский»; суходольные луга. Относительно часто. Многолетник.

Род 21. Новомолиния – *Neomolinia* Honda

Neomolinia mandshurica (Maxim.) Honda (как *Diarrhena manshurica* Maxim.: Шишкин, 1930) – **Н. маньчжурская**. Ключи: Ковалевский, Николаев, Трофимов; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ, КПП 1 «Корейский», междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Лесовозная; дубняки, долинные кедровошироколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 22. **Рогозник – Phalaroides N.M. Wolf**

Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.: Шишкин, 1930 – **Р. тростниковидный**. Ключ Островной; долинные лиственные леса, берега ручьев. Редко. Многолетник.

Род 23. **Тимофеевка – Phleum L.**

Phleum pratense L.: Шишкин, 1930 – **Т. луговая**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания. Часто. Многолетник. Заносный вид.

Род 24. **Тростник – Phragmites Adans.**

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (как *P. communis* Trin.: Шишкин, 1930) – **Т. южный**. КПП 1 «Корейский», р. Лесовозная, ключ Пасечный; болота, берега водоемов, сырые луга. Очень часто, образует заросли. Многолетник.

Phragmites japonicus Steud. – **Т. японский**. КПП 1 «Корейский»; антропогенные местообитания, вдоль дорог. Редко. Многолетник.

Род 25. **Мятлик – Poa L.**

Poa angustifolia L. – **М. узколистный**. Ключ Островной; антропогенные местообитания, суходольные луга. Часто. Многолетник.

Poa annua L.: Шишкин, 1930 – **М. однолетний**. Антропогенные местообитания. Относительно редко. Однолетник. Заносный вид.

Poa palustris L. – **М. болотный**. Урочище Орочонский Бог, сырые луга, антропогенные местообитания, окраины болот. Относительно редко. Многолетник.

Poa pratensis L.: Шишкин, 1930 – **М. луговой**. Ключ Островной, с. Дальний Кут; сухие луга, кустарниковые заросли, дубняк. Часто. Многолетник.

Poa skvortzovii Prob. – **М. Скворцова**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли, суходольные луга, скалы, галечники. Часто. Многолетник.

Род 26. **Овсовидка – Schizachne Hack.**

Schizachne callosa* (Turcz. ex Griseb.) Ohwi: Пробатова, 1985 (рис. 140, с. 336) – **О. мозолистая. Река Большая Уссурка; темнохвойные и смешанные леса, кустарниковые заросли. Редко. Многолетник.

Род 27. **Щетинник – Setaria Beauv.**

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. (как *S. glauca* (L.) P. Beauv.: Шишкин, 1930) – **Щ. низкий**. С. Дерсу; антропогенные местообитания, залежи. Часто. Однолетник.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.: Шишкин, 1930 – **Щ. зеленый**. Урочище Орочонский Бог; антропогенные местообитания, вдоль дорог. Часто. Однолетник.

Род 28. **Серобородник – Spodiopogon Trin.**

Spodiopogon sibiricus Trin.: Шишкин, 1930 – **С. сибирский**. КПП 1 «Корейский», ключ Ковалевский; дубняки, кустарниковые заросли. Очень часто. Многолетник.

Род 29. **Трищетинник – Trisetum Pers.**

Trisetum sibiricum Rupr.: Шишкин, 1930 – **Т. сибирский**. КПП 1 «Корейский»; дубняки, кустарниковые заросли. Часто. Многолетник.

Сем. 111. **РОГОЗОВЫЕ – TYPHACEAE**

Род 1. **Рогоз – Typha L.**

Typha latifolia L.: Шишкин, 1930 – **Р. широколистный**. Ключ Островной; болота, берега водоемов. Относительно часто. Многолетник.

Сем. 112. **АРОИДНЫЕ – ARACEAE**

Род 1. **Однопокровница, или аризема – Arisaema Mart.**

Arisaema amurense Maxim.: Шишкин, 1930 – **О. амурская**. Ключи: Ковалевский, Кордонный, Левый Михайловский, Никиткин, Николаев, Островной, Трофимов, Яков; водораздел р. Большая Уссурка – Ковалевский ключ; руч. Пасечный; междуречье Арму – Большая Уссурка, р. Лесовозная, урочище Орочонский Бог; лиственные и кедрово-широколиственные леса. Часто. Многолетник.

Род 2. **Белокрыльник – Calla L.**

Calla palustris L.: Шишкин, 1930 – **Б. болотный**. Ключ Островной, руч. Пасечный, р. Малая Пихтовка; берега ручьев, водоемов. Относительно редко. Многолетник.

Род 3. **Связноплодник – Symplocarpus Salisb. ex W. Barton**

Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvelev (как *S. foetidus* Salisb.: Шишкин, 1930) – **С. почколистный**. Ключи: Ковалевский, Островной, Яков; руч. Пасечный, КПП 1 «Корейский», р. Малая Пихтовка; долинные смешанные и лиственные леса. Нередко. Многолетник.

Особенности флоры национального парка

В аннотированный список сосудистых растений входит 662 вида сосудистых растений (8 видов, нахождение которых по тем или иным причинам ставится под сомнение, в это количество не включено) из 112 семейств и 369 родов.

Соотношение основных систематических групп сосудистых растений во флоре национального парка приводится в табл. 41.

Сосудистые споровые представлены 17 семействами, 13 из которых – папоротниковидные. Голосеменные, являющиеся основными лесообразователями, составляют 1,0% от общего количества видов и представлены двумя семействами. На долю покрытосеменных приходится наибольшее количество семейств – 93, родов – 330 и видов – 603.

Анализ распределения флоры сосудистых растений по категориям таксонов показал, что во флоре парка ведущими семействами являются: Asteraceae (с 43 родами), Сурегасеae (6 родов), Роасеae (29 родов), Ranunculaceae (18 родов), Rosaceae (17 родов) и др. (табл. 42).

Расположение 5 ведущих семейств аборигенного комплекса (Asteraceae, Сурегасеae, Роасеae, Ranunculaceae, Rosaceae) флоры Приморского края и национального парка совпадает. Аналогичное распределение первых пяти семейств наблюдается также во флоре Еврейской автономной области (Рубцова, 2017).

Таблица 41. Соотношение основных систематических групп флоры сосудистых растений парка

Систематическая группа	Семейства		Роды		Виды	
	Количество	% от общего количества	Количество	% от общего количества	Количество	% от общего количества
Сосудистые споровые	17	15,2	34	9,2	52	7,9
Плауновидные	3	2,7	3	0,8	6	0,9
Хвощевидные	1	0,9	1	0,3	5	0,8
Папоротниковидные	13	11,6	30	8,1	41	6,2
Голосеменные	2	1,8	5	1,4	7	1,0
Покрывтосеменные	93	83,0	330	89,4	603	91,1
Однодольные	19	17,0	67	18,1	153	23,1
Двудольные	74	66,0	263	71,3	450	68,0

Таблица 42. Ведущие семейства флоры национального парка

Семейство	Флора					
	национального парка				Приморского края*	
	полная		аборигенная		аборигенная	
	Ранг	Число видов	Ранг	Число видов	Ранг	Число видов
Asteraceae	1	72	1	61	1	209
Cyperaceae	2	50	2	51	2	200
Poaceae	3	44	3	41	3	155
Ranunculaceae	4	34	4	34	4	94
Rosaceae	5	33	5	31	5	93
Fabaceae	6	22	6	19	8	56
Lamiaceae	7	20	7	17	7	67
Caryophyllaceae	8	18	9	14	9	56
Apiaceae	9	16	8	16	10	46
Brassicaceae	10	15	11–12	11	14	34
Scrophulariaceae	11	13	11–12	11	11	44
Salicaceae	12	12	10	12	15–16	28

* Данные приводятся по А.Е. Кожевникову (2003).

Fabaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Apiaceae и Salicaceae замыкают десятку основных семейств. Более половины от общего количества семейств (53,6%) представлены только одним родом.

Ранжирование ведущих родов приведено в табл. 43. Преобладающим родом является *Carex*, который представлен в различных биотопах: в лесном – 27 видов, прибрежно-водно-болотном – 10 и луговом – 4 вида. Род *Viola* в основном приурочен к лесным – 6 видов, луговым – 2 вида и прибрежно-водно-болотным

Таблица 43. Ведущие роды аборигенной флоры национального парка

Род	Количество видов	Процент от общего количества видов
<i>Carex</i>	41	6,2
<i>Artemisia</i>	12	1,8
<i>Viola</i>	10	1,7
<i>Galium</i>	8	1,2
<i>Salix</i>	8	1,2
<i>Vicia</i>	7	1,1
<i>Allium</i>	6	0,9
<i>Calamagrostis</i>	6	0,9
<i>Corydalis</i>	6	0,9
<i>Geranium</i>	6	0,9
<i>Acer</i>	5	0,8
<i>Aconitum</i>	5	0,8
<i>Betula</i>	5	0,8
<i>Dryopteris</i>	5	0,8
<i>Equisetum</i>	5	0,8
<i>Poa</i>	5	0,8
<i>Stellaria</i>	5	0,8
<i>Veratrum</i>	5	0,8

парка сосудистых растений. На долю луговой растительности приходится 15,1% (100 видов). Прибрежно-водно-болотный комплекс включает 69 видов (10,4%). Скально-осыпной комплекс представлен 41 видом (6,2%).

На долю заносных растений приходится 37 видов (5,6%). При этом доля чужеродных элементов в составе флоры наиболее высокая в пределах населенных пунктов и дорог. В числе заносных видов: тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*), амброзия полынолистная (*Ambrosia artemisiifolia*), кониза канадская (*Conyza canadensis*), тимофеевка луговая (*Phleum pratense*), клевер ползучий (*Trifolium repens*) и др. В состав антропофитных группировок (67 видов, 10,1%) растительности входят также апофиты (виды местной флоры), из которых наиболее обычны пырей (*Elytrigia repens*), полынь теневая (*A. umbrosa*), осот полевой (*Sonchus arvensis*), марь белая (*Chenopodium album*), осока гладчайшая (*Carex laevissima*), бодяк щетинистый (*Cirsium setosum*), росичка обыкновенная (*Digitaria ischaetum*), ежовник обыкновенный (*Echinochloa crusgalli*), щетинник низкий (*Setaria pumila*) и другие, особенно на нарушенных участках (обочины дорог, окраины полей и др.).

В соотношении жизненных форм растений (экобиоморф; рис. 6) во флоре парка преобладают многолетние травы – 73% от общего числа видов; одно- и дву-

местообитаниям – 2 вида. Повсеместно встречаются представители и других ведущих родов: *Artemisia*, *Galium*, *Salix*, *Vicia*, *Allium*, *Calamagrostis*, *Corydalis*, *Geranium* и др. В общем объеме родов преобладают одновидовые – 251 род (68,0%) и роды, насчитывающие 2–3 вида (24,0%).

Выявленный видовой состав флоры указывает на относительно высокое флористическое разнообразие исследованной территории, что обусловлено разнообразием биотопов. Здесь представлены виды лесного, лугового, прибрежно-водно-болотного, скально-осыпного и синантропного флористических комплексов (рис. 5). Самый крупный лесной комплекс насчитывает 385 видов, что составляет 58,2% от общего числа выявленных на территории




Рис. 5. Число видов в эколого-ценотических группах: ШЛ – широколиственно-лесная, ТХ – темнохвойно-лесная, ЛЛ – лугово-лесная; ЛУ – луговая; ВБ – водно-болотная, ПВ – прибрежно-водная, ВО – водная; МО – монтанная; СК – скально-осыпная; СИ – синантропная




Рис. 6. Соотношение жизненных форм сосудистых растений: МЛ – многолетние травы; ОЛ – однолетники; КУ – кустарники; ДЕ – деревья; ДЛ – двулетники; ЛИ – лианы; КЧ – кустарнички; ПК – полукустарники; ПКЧ – полукустарнички

летники составляют – 11,2%. На долю деревянистых растений приходится 15,9% от общего видового состава. Деревьев – 41 вид (6,2%), в том числе хвойных семь видов: *Pinus koraiensis*, *Picea ajanensis*, *Picea koraiensis*, *Picea obovata*, *Abies nephrolepis*, *Larix cajanderi*, *Taxus cuspidata*. Статус *Picea koraiensis* в качестве самостоятельной таксономической единицы, а не подвида *P. obovata* оспаривается (Коропачинский, Встовская, 2002; и др.).

Кустарников и полукустарников – 48 видов (7,2%); кустарничков и полукустарничков – 6 видов (0,9%); деревянистых лиан (*Actinidia kolomikta*, *Ampelopsis heterophylla*, *Schisandra chinensis*, *Vitis amurensis*, *Celastrus flagellaris*, *Atragene ochotensis*, *Clematis fusca* и др.) – 10 видов (1,5%).

Редкие и охраняемые виды

Нами найдено 16 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу Приморского края (2008). В Красный список МСОП включено 8 деревьев и два вида орхидей (табл. 44). В таблице не приведены охраняемые виды, которые нами не были встречены: *Panax ginseng*, *Aleuritopteris argentea* и *Pyrrosia petiolosa*, но они указаны в работе И.К. Шишкина (Шишкин, 1930) и устных сообщениях сотрудников парка.

Таблица 44. Статус охраны видов, входящих в Красный список МСОП и Красные книги Российской Федерации (2008) и Приморского края (2008)

Вид	Красная книга		Красный список МСОП
	РФ	ПК	
Деревья			
<i>Taxus cuspidata</i>	3 д	VU	LC
Травы			
<i>Asplenium incisum</i>	Не включен	VU	Не включен
<i>Bergenia pacifica</i>	Не включен	VU	Не включен
<i>Cephalanthera longibracteata</i>	3 г	VU	Не включен
<i>Coniogramme intermedia</i>	Не включен	LR	Не включен
<i>Cypripedium macranthon</i>	3 б	LR	LC
<i>C. calceolus</i>	3 б, г	LR	LC
<i>C. ventricosum</i>	3 б	LR	LC
<i>Galearis cyclochila</i>	Не включен	EN	Не включен
<i>Galium paradoxum</i>	Не включен	LR	Не включен
<i>Iris ensata</i>	3 г	LR	Не включен
<i>I. laeviagata</i>	Не включен	LR	Не включен
<i>Liparis japonica</i>	3 в	LR	Не включен
<i>Paeonia lactiflora</i>	2 б	LR	Не включен
<i>P. obovata</i>	3 б	LR	Не включен
<i>Phyllitis japonica</i>	Не включен	EN	Не включен

Примечание. EN – угрожаемые; LC – вызывающие наименьшее опасение; LR – низкая степень риска; VU – уязвимые; категории КК РФ: 2 – сокращающиеся в численности, 3 – редкие.

В числе редких видов на исследованной территории встречаются *Lycopodioides tamariscina*, *Lepisorus ussuriensis*, *Coptidipteris wilfordii*, *Asplenium tenuicaule*, *Schisandra chinensis*, *Atragene ochotensis*, *Oreorchis patens*, *Trapa pseudoincisa*, *Eriactis papillosa* и др. Наиболее распространенными древесными видами в национальном парке являются *Pinus koraiensis*, *Picea ajanensis*, *Abies nephrolepis*, *Acer mono*, *Quercus mongolica*, *Betula platyphylla*, *Fraxinus mandshurica*, *Chosenia arbutifolia*, *Ulmus japonica* и др. Повсеместно встречаются *Osmundastrum asiaticum*, *Athyrium sinense*, *Cardamine leucantha*, *Naumburgia thyrsoiflora*, *Filipendula palmata*, *Rabdosia excisa*, *Cacalia hastata*, *Carex dispalata*, *C. drymophila*, *Phragmites australis*, *Galium davuricum*, *Artemisia stolonifera* и др.

ЛЕСА

По природному районированию Приморского края средняя часть бассейна р. Большая Уссурка входит в Нижне-Уссурийский материковый низкогорно-равнинный округ широколиственных и лиственнично-березовых лесов, влажных злаково-осоковых лугов и низинных болот (Колесников, 1956, 1969). Эти леса были отнесены к категории уникальных невоспроизводимых (Васильев, 1963а, б, 1977; Крестов, 1993а, б; и др.). По экологическому районированию Дальнего Востока территория парка находится в ареале субнеморальных дубовых и кедрово-широколиственных лесов в сочетании с влажными лугами и горными подтаежными лесами, фрагментов горной тайги Западного Сихотэ-Алиня (Мартыненко, Бочарников, 2008).

Территория парка характеризуется высокой степенью сохранности природных ландшафтов. В национальном парке господствующим типом растительного покрова является лесной, который занимает 98,8% общей площади. Доля нелесных земель – сенокосов, пасек, дорог, просек, вод, болот, песков составляет только 1,2%. Неоднородность лесорастительных условий создает большое разнообразие лесных формаций и типов леса. Не имеют статуса формаций леса с преобладанием тиса остроконечного, бархата амурского, клена моно и других видов, которые занимают небольшие площади и лесоустойчивостью не фиксируются. В сложении лесной растительности наряду с основными лесообразователями участвуют многочисленные древесные породы, роль которых в древостоях незначительна вследствие особенностей их экологии, а также специфики их географического распространения, связанной с историческими причинами (Манько, Ли, 2005).

Лесоводственные свойства основных древесных пород

Аралия высокая Ар^{1*} (*Aralia elata*). Небольшое деревце высотой 3–4, реже 5–6 м и диаметром до 10–12 см. Встречается единично или небольшими группами, чаще всего приуроченными к минерализованным участкам. Корневая система поверхностная, радиальная. Цветет в августе, плоды созревают в сентябре.

Бархат амурский Бх* (*Phellodendron amurense*). Встречается единично, реже группами на горных склонах и в долинах. Достигает высоты 20 м и диаметра 54 см, иногда более. Доживает до 150–200 лет. В сомкнутых древостоях стволы хорошо очищены от сучьев, а на разреженных участках бархат имеет низкоопущенную раскидистую крону. Светолюбив. Плохо переносит недостаток влаги, но на местообитаниях с застойным увлажнением не растет. На плодородных хорошо увлажняемых дренированных почвах развивает глубокую корневую систему и характеризуется быстрым ростом. Морозостоек, но в молодом возрасте повреждается заморозками. Размножается семенами (зоохор), порослью и корневыми отпрысками. Семеносит с 15–18 лет. Плоды созревают в сентябре.

¹ Под * – сокращенные названия древесных пород.

Берёза даурская Бд* (*Betula davurica*). Крупное дерево до 25 м высотой и 70 см в диаметре. Чаше встречается в дубняках, нередко в дубово-кедровых лесах. Избегает сырые и мокрые почвы. Довольно устойчива к влиянию огня. Морозоустойчива. Семена созревают в начале августа.

Берёза плосколистная Бп* (*Betula platyphylla*). Порода-пионер. Дерево до 20 м высотой и до 50 см в диаметре. В кедрово-широколиственных лесах встречается единично, поселяясь по минерализованным участкам, возникающим при распаде древостоя. Доживает до 250 лет, хотя естественный распад древостоев происходит раньше. Возобновляется семенами, которые созревают в сентябре, и порослью.

Берёза ребристая, жёлтая Бж* (*Betula costata*). Может выступать как порода-пионер, занимая местообитания после пожаров и рубок. Дерево до 30 м высотой и до 100 см в диаметре. Доживает до 300 лет, а возможно, и более. Теневынослива. Естественно возобновляется под пологом леса, поселяясь на трухлявом валежнике и обнажениях почвы. Относительно теплолюбива. Семена созревают в середине сентября.

В парке «Удэгейская легенда» древостои с преобладанием этого вида берёзы представляют возрастную стадию разнокустарникового кедровника с жёлтой берёзой.

Берёза шерстистая Бш* (*Betula lanata*). Дерево до 15–20 м высотой и до 50–60 (80) см в диаметре. Примечательными являются опушение на молодых **веточках**, а также **шерстистые** или даже войлочно-опушенные **почки**. На территории национального парка встречается отдельными деревьями или группами в ельниках. Относится к наиболее холодостойким **лиственным** породам.

Дуб монгольский Д* (*Quercus mongolica*). Распространен в национальном парке по южным склонам, совместно с кедром формирует дубово-кедровые леса, а в других местопроизрастаниях присутствует в качестве примеси. Отдельные экземпляры его имеют высоту 20–25 м, диаметр на высоте груди 127–131 см. Доживает до 500 лет. Порослевые особи менее долговечны (Добрынин, 2000).

Дуб монгольский – экологически пластичная порода, способная произрастать в различных местообитаниях (от сухих до влажных), но не выносящая переувлажнения.

Морозоустойчив, но повреждается поздними весенне-летними заморозками. Способен переносить низкие зимние температуры до –50...–60 °С. Светолюбив. Ветроустойчив благодаря глубокой корневой системе, развитие которой зависит от особенностей почвогрунта.

Хорошо возобновляется семенным путем и порослью. Порослевую способность сохраняет до глубокой старости, хотя у основной массы она почти прекращается после 140 лет (Цымек, 1956).

Семеношение дуба нерегулярно, в отдельные годы оно может отсутствовать. Порослевой дуб начинает семеносить с 6–12, семенной – с 15–20 лет (Добрынин, 2000). Созревание желудей происходит в середине–конце сентября. Во влажные годы жёлуди прорастают сразу же после опадения.

Дуб монгольский – наиболее устойчивая к огню древесная порода. По мнению большинства исследователей, дуб монгольский расширил площади со своим преобладанием благодаря систематическим пожарам, под влиянием которых деградировали хвойно-широколиственные леса.

Ель аянская Еа* (*Picea ajanensis* = *P. jezoensis*). Ель аянская – дерево первой величины, в национальном парке достигает высоты 30 м и диаметра 80 см и более. Теневынослива, способна переносить длительное затенение, но при улучшении эколого-фитоценологических условий увеличивает темпы роста. По степени теневыносливости превосходит все другие виды ели, распространенные в пределах ее ареала. Доживает до 500 лет и более.

Ель, растущая на открытых местах, начинает семеносить с 20–25 лет, иногда первые шишки на ней появляются в 15-летнем возрасте. В сомкнутых древостоях семеношение наступает в более позднем возрасте, заметные урожаи семян она начинает приносить после вхождения в основной полог. Обильные урожаи наблюдаются через 3–4 года.

Ель отличается умеренной потребностью в тепле, морозоустойчивостью, коротким периодом глубокого покоя. Она относится к влаголюбивым видам. В целом ель аянская гигромезофит.

Ель сильно страдает от лесных пожаров. Даже низовые пожары приводят к ее гибели.

Ель корейская Ек* (*Picea koraiensis*). В национальном парке встречается в бассейнах ключей Ковалевский и Островной. Ель корейская более светолюбива по сравнению с елью аянской, отличается более быстрым ростом и менее плотной кроной. Доживает до 300 лет. Семеносит в естественных условиях с 18–20 лет (Усов, 1991).

Жестер даурский Ж* (*Rhamnus davurica*). Небольшое дерево до 10–12 м в высоту и 20–25 см в диаметре, а чаще значительно меньше. Встречается редко, единичными экземплярами. Зоохор.

Ильм лопастной Ил* (*Ulmus laciniata*). Встречается в виде примеси в хвойно-широколиственных лесах, где достигает высоты 20–25 м и диаметра 40 см. Доживает до 200–230 лет, по Н.Г. Васильеву (1979), – до 500 лет. Чаще встречается на горных склонах. Возраст естественной спелости у него наступает раньше, чем у ильма японского, – в 150–170 лет. Более теневынослив и менее холодостоек по сравнению с ильмом японским. Возобновляется семенным путем и порослью. Начало семеношения особей семенного происхождения с 15–20, порослевого – с 8–12 лет. Семеносит ежегодно, семена опадают в июне. Корневая система поверхностная. К огню устойчив.

Ильм японский, долинный Ид* (*Ulmus japonica*). Дерево долинных местообитаний, где оно формирует широколиственную урёму с хорошо развитым покровом из крупных папоротников, что придает этим лесам экзотический вид, чему способствует также светлая окраска крупных стволов ильма. На горных склонах встречается единичными деревьями. Требователен к богатству и влажности почвы. В национальном парке на дренированных аллювиальных почвах образует

древостои со своим преобладанием, где отдельные деревья достигают высоты 35 м и диаметра на высоте груди 122 см (такие экземпляры встречаются в районе Тенниковой базы и ключа Михайловский). Возраст естественной спелости наступает в 180–200 лет. Теневынослив. В сомкнутых древостоях имеет широко раскидистую крону, высоко поднятую над землей.

Продолжительную засуху (более 2 месяцев), по сведениям Н.Г. Васильева (1979), переносит удовлетворительно; особенно засухоустойчива разновидность ильма, растущего на крутых южных склонах. Корневая система размещена на глубине 40–60 см. Ее образуют хорошо развитые боковые корни. Ветроустойчив. Семеносит ежегодно, хотя размеры урожая колеблются по годам. Начало семенения семенных особей – с 30–35, порослевых – с 20–25 лет. Семена созревают в июне. Возобновляется семенным путем и порослью от пня. Крупные деревья устойчивы к огню, но нередко подвержены грибным заболеваниям.

Клён укурудунду Кж* (*Acer ukurunduense*). Дерево высотой до 5–7 м, чаще крупный куст. Встречается единично и рассеянно преимущественно в елово-широколиственных лесах. Теневынослив. Наиболее холодостойкий вид среди клёнов, произрастающих на российском Дальнем Востоке. Возобновляется семенами и порослью.

Клён зеленокорый Кз* (*Acer tegmentosum*). Небольшое дерево высотой 12–15 м и до 20–30 см в диаметре. Встречается единично, иногда небольшими группами преимущественно в хвойно-широколиственных лесах. Теневынослив. Морозоустойчив. Возобновляется семенами и порослью. Плодоносит обильно. Хорошие урожаи через 1–2 года (Солодухин, 1962).

Клён мелколистный Км* (*Acer mono*). Обычный вид для кедрово-широколиственных лесов. Экологически пластичен: встречается как в сухих, так и в сырых местообитаниях, но более многочислен в свежих и влажных типах леса. Наиболее характерен для нижних пологов древостоя, где нередко преобладает, однако его единичные деревья обычно присутствуют и в основном пологе. Дерево до 18–20 (28) м высотой, до 50–70 см в диаметре. Доживает до 250 лет и более.

Теневынослив, отличается умеренным ростом. Размножается семенами и порослью. Семена созревают в конце августа–начале сентября. Под пологом сомкнутого леса нередко преобладает в подросте. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре. Морозоустойчив.

Кореянка земляничколистная, чозения Чз* (*Chosenia arbutifolia*). Крупное дерево до 40 м высотой и до 1 м в диаметре. Растет по поймам рек, заселяя вместе с ивой и нередко с тополем галечниковые косы. Быстрорастущая, недолговечная порода. Встречается в долине р. Большая Уссурка.

Липа Лп* (*Tilia*). В национальном парке распространены три вида липы, однако липа маньчжурская Лпм* (*T. mandshurica*) встречается реже. По морфологическим признакам липа амурская Лпа* (*T. amurensis*) и Таке (*T. taquetii*) близки. Пчеловоды различают их по срокам цветения: первой в конце июня–начале июля зацветает липа Таке, позже на 8–10 дней – липа амурская (Васильев, 1938).

Липы являются постоянным компонентом хвойно-широколиственных лесов. Они требовательны к богатству и постоянному увлажнению почвы. В затяжные сухие периоды могут досрочно сбрасывать значительную часть листвы, что помогает им выжить в стрессовой ситуации. Достигает 30 м в высоту, до 100 см в диаметре. Предельный возраст 300 лет и более.

Липы теневыносливы и отличаются медленным ростом. Возобновляются семенным путем и порослью. Плоды созревают в сентябре.

Маакия амурская Мк* (*Maackia amurensis*). Небольшое дерево 10–12 м высотой и диаметром 30 см. Доживает до 200–230 лет. Растет чаще в долинных смешанных лесах, но встречается и на горных склонах. Предпочитает хорошо увлажненные плодородные почвы, но встречается как на переувлажненных участках, так и на бедных каменистых почвах. Теневынослива. Морозоустойчива. Возобновляется семенным путем (зоохор) и порослью. Плоды созревают в сентябре. Крупные ее стволы нередко поражены гнилью.

Ольха волосистая Ол* (*Alnus hirsuta*). Дерево до 20 м высотой и до 60 см в диаметре. В национальном парке растет вдоль водотоков и на переувлажненных участках долины.

Орех маньчжурский Ор* (*Juglans mandshurica*). Встречается единично и группами в кедрово-широколиственных и долинных ясенево-ильмовых лесах. Дерево высотой 27–28 м, 60–80 (100) см в диаметре. Доживает до 200–250 лет. Светолюбив, но в раннем возрасте мирится с затенением. Отличается быстрым ростом, особенно на плодородных дренированных почвах, на которых развивает мощную с глубоким стержневым корнем корневую систему. Морозостоек, но повреждается поздними весенне-летними заморозками. Возобновляется семенами (зоохор) и порослью. Семеносит с 6–15 лет. Семенные годы чередуются с 2–3 неурожайными. Плоды созревают в сентябре. В зрелом возрасте деревья повреждаются гнилями.

Осина Ос* (*Populus tremula*). Порода-пионер. Как и берёза плосколистная, в кедрово-широколиственных лесах присутствует в виде единичных особей, которые селились по минерализованным участкам. Дерево до 30 м в высоту и до 1 м в диаметре. Доживает до 150 лет. В зрелом возрасте повреждается гнилями. Размножается семенами, порослью и корневыми отпрысками. Семена разлетаются в июне. Они быстро теряют всхожесть.

Пихта почкочешуйная, белокорая Пп* (*Abies nephrolepis*) часто встречается в бассейнах рек Большая Уссурка, Малая Пихтовка, Большая Пихтовка и Лесовозная. В поясе широколиственно-кедровых лесов она участвует как примесь, но в местоположениях, отличающихся застоем холодного воздуха, и на склонах северной экспозиции она преобладает в подчиненном пологе. При естественном распаде основного полога роль пихты в сложении древостоя обычно возрастает.

Наиболее крупные ее деревья имеют высоту 26–28 м, диаметр 50–60 см. Доживает до 250–270 лет, хотя основное ее поколение отмирает значительно раньше по причине сильного повреждения корневыми, напенными и стволовыми гнилями.

Она считается малоустойчивой древесной породой к дереворазрушающим грибам (Любарский, Васильева, 1975).

Пихта более теневынослива по сравнению с елью аянской. Вместе с тем пихта несколько быстрее ели адаптируется к условиям сплошных вырубок, хотя, как и ель, страдает на открытых местах от поздне-весенних заморозков (Манько, Дон Ку Ли, 2005). Пихта по сравнению с елью более теплолюбива. Требовательна к богатству почвы, отличается лучшим ростом на мощных хорошо дренированных аллювиальных почвах, но может расти и в местообитаниях с застойным увлажнением. Корневая система пихты поверхностная и размещается в тех же почвенных слоях, что и корни ели, поэтому она, как и ель, значительно зависит от температуры, влажности и других параметров корнеобитаемого слоя.

Семеношение особей, растущих в свободном стоянии, наступает в 20 лет. Хорошо естественно возобновляется под сомкнутым пологом леса. Популяция пихты обычно характеризуется разновозрастностью.

Неустойчива к воздействию огня (поверхностная корневая система).

Рябина похуашаньская, или амурская, Рб* (*Sorbus pochuashanensis*). Дерево высотой до 4–8 м, до 30 (35) см в диаметре, с прямым стволом. Встречается обычно одиночно, реже небольшими группами и плодоносит хорошо, но не ежегодно. Плоды созревают в сентябре.

Сосна кедровая корейская, кедр корейский К* (*Pinus koraiensis*). Основной лесообразователь в зоне хвойно-широколиственных лесов. В национальном парке эта порода преобладает. Высота кедра не превышает 38 м. Наиболее крупные экземпляры имели диаметр на высоте груди 132 см (отмечены в ключе Николаев). Предельный возраст кедра, по мнению Б.П. Колесникова (1956а), достигает почти 600 лет.

Кедр принадлежит к числу медленнорастущих древесных пород. Отличается экологической пластичностью. Растет на скальных обнажениях с примитивными сухими почвами и единично встречается в сырых ясенёвниках. В свежих и влажных условиях местопроизрастания обычно преобладает. Лучшими условиями для формирования древостоев с его преобладанием являются среднекрутые и крутые склоны гор преимущественно южной экспозиции.

Взаимоотношения кедра с другими породами контролируются лесорастительными условиями, которые определяют участие видов с различной экологией и длительностью жизненного цикла в древостоях.

Кедр умеренно теплолюбив. Успешно переносит поздневесенние и летние засухи. Морозостоек, более устойчив к весенним заморозкам по сравнению с елью аянской, пихтами почкочешуйной и цельнолистной. На ранних этапах онтогенеза отличается теневыносливостью, что позволяет его молодому поколению длительно существовать под сомкнутым древесным пологом. В то же время сеянцы могут развиваться и при полном солнечном освещении.

Семеносит на открытых местах с 20 лет, а иногда и раньше. В насаждениях этот процесс наступает после выхода кедра в основной полог. Основными разносчиками семян являются животные (Бромлей, Костенко, 1974), благодаря которым

он появляется под пологом естественных и производных древостоев, а также на обезлесенных участках.

Корневая система отличается коротким стержневым корнем и хорошо развитыми боковыми. На большинстве местообитаний она размещена на глубину до 1 м. В перестойном возрасте кедр подвержен ветровалу, что связано с грибными повреждениями корневых систем. Его крупные деревья в большинстве случаев имеют напennую и стволовую гниль, которая нередко развивается после механических и пожарных повреждений. Мелкий подрост кедра погибает даже при беглых палах, хотя тонкомерные деревья его при этом нередко выживают. Крупные деревья удовлетворительно переносят локальные огневые повреждения, которые остаются на стволе в виде сухобочин. Но в целом кедр не отличается устойчивостью к огню.

Тис остроконечный То* (*Taxus cuspidata*). Встречается редко единичными особями в кедрово-широколиственных и елово-широколиственных лесах. Тис на территории национального парка отмечен в бассейнах ключей Левый Михайловский, Яков, Трофимов, Николаев и др.; наиболее многочисленная популяция произрастает в бассейне ключа Ковалевский (более 500 крупных деревьев). Возраст крупного тиса (диаметр на уровне корневой шейки – 91 см, высота 15 м) – около 800 лет. Мелкого и среднего подроста очень мало. Встречаются участки с крупным подростом, составляющим второй ярус хвойно-широколиственных лесов.

Тополь Максимовича Тм* (*Populus maximowiczii*). Одно из наиболее крупных деревьев Дальнего Востока. В высоту достигает 40 м (Цымек, 1956). В бассейне р. Большая Уссурка встречены экземпляры тополя, имевшие диаметр на высоте груди 158 см. Растет в долинах рек, но единично встречается в нижней части горных склонов в составе хвойно-широколиственных лесов. Отличается быстрым ростом. Возобновляется семенным путем и порослью. Семена созревают в июне, они очень быстро теряют всхожесть. Продолжительность жизни 200–300 лет, а иногда и более. Тополь Максимовича является одним из наиболее устойчивых видов среди рода **тополь** к грибным болезням.

По морфологическим и биологическим свойствам к тополю Максимовича близок **тополь корейский Тк*** (*P. koreana*), также встречающийся в парке.

Трескун амурский Тр* (*Ligustrina amurensis*). Небольшое дерево высотой 8–10 (16) м, диаметром до 25 см. Доживает до 90–100 лет. Встречается единично на горных склонах и в долинах. В сомкнутых древостоях имеет прямой ствол, хорошо очищенный от сучьев, в долинных кустарниковых зарослях может принимать вид кустарника. К почвам нетребователен, но лучше растет на плодородных глубоких почвах. Теневынослив. Растет медленно. Размножается семенами, порослью, отводками и корневыми отпрысками. Под пологом хвойно-широколиственных лесов иногда преобладает в подросте. Плоды созревают в сентябре.

Черёмуха Маака Чрм* (*Padus maackii*). В национальном парке имеет вид небольшого деревца, чаще встречается на участках с поврежденным в прошлом почвенным покровом, вдоль ручьев. Плоды созревают в конце июля – начале августа. В их распространении большую роль играют птицы и животные.

Черёмуха Максимовича Вш*, или вишня Максимовича (*Padus maximowiczii*). Стройное дерево высотой до 15 м и диаметром до 30 см. Встречается единично в хвойно-широколиственных лесах. Удовлетворительно возобновляется семенами (зоохор).

Черёмуха обыкновенная Чро* (*Padus avium*). Встречается нередко по берегам водотоков, а также в ильмово-ясеневых и других долинных лесах, принимая единичное участие в древостоях. Зоохор.

Яблоня маньчжурская Ябм* (*Malus mandshurica*). Невысокое дерево (10–12 м), диаметр которого достигает 40–45 см. Встречается редко в придолинных смешанных лесах, еще реже на горных склонах. Возобновляется семенным путем (зоохор). Плоды созревают в сентябре.

Ясень маньчжурский Ям* (*Fraxinus mandshurica*). Относится к деревьям первой величины, достигает высоты 30–32 м и диаметра более 70 см. Н.Г. Васильев (1979) в Приморье встречал экземпляры ясеня, имевшие высоту 37,3 м, диаметр 151 см и возраст свыше 400 лет. Стадия разрушения основной части древостоя у ясеня наступает в 150–200 лет. В парке встречается в виде незначительной примеси в горных кедрово-широколиственных лесах на свежих местообитаниях, во влажных условиях участие его возрастает. В долинных сырых местообитаниях с застойным увлажнением он может господствовать, однако такие участки встречаются редко.

Хорошо растет на богатых и устойчиво увлажняемых почвах. Требователен к высокой влажности воздуха. Мезогигрофит. В летние жаркие солнечные дни листья ясеня теряют тургор. Светолюбив и быстрорастущ. Морозостоек, но повреждается поздними весенними заморозками.

Возобновляется семенным путем и порослью. Цветет в мае до распускания листьев. Ассимиляционный аппарат развивается позже других пород. Начало плодоношения семенных особей с 20–25, порослевых – с 12–15 лет. Семена созревают в сентябре–октябре и не опадают до начала зимы. Обильное семеношение повторяется через 1–2 года.

Лесные формации

В результате анализа лесостроительных материалов национального парка «Удэгейская легенда» установлено, что из 23 лесных формаций и субформаций, учитываемых для территории Приморского края (Богатов и др., 2000), в парке встречается 12 формаций (пихтово-еловая, широколиственно-кедровая, лиственничная, дубовая, белоберезовая, желтоберезовая, ивовая, чозениевая, тополевая, ясенево-ильмовая, осиновая, ольховая) и 2 субформации (кедрово-еловая и кедрово-лиственничная), которые включают 42 типа леса. Основу растительного покрова составляют широколиственно-кедровые леса – 61,6% и пихтово-еловые леса – 21,9%. Доля других формаций и субформаций невысока: кедрово-еловые леса занимают 4,7%, ясенево-ильмовые леса – 7,2%, желтоберезовые леса – 2,6% и 2% от общей площади занимают другие леса.

Пихтово-еловые леса. На территории парка лесоустройством отмечено 8 типов пихтово-еловых лесов, обогащенных неморальными элементами во всех ярусах. Эти сообщества формируются на крутых горных склонах всех экспозиций, превышающих отметку 500 м над ур. моря, а также на дренированных речных террасах р. Большая Уссурка, в бассейнах ключей Кондратов, Яков, Никиткин, Хариусинский, в урочище Забытый, г. Крутогорка.

Ель аянская и пихта белокорая – доминанты этой формации. Из сопутствующих пород в составе пихтово-еловых лесов встречаются березы каменная и ребристая, реже липы амурская и Таке, клен мелколистный, кедр корейский и другие виды. Возобновление удовлетворительное, распределение по площади групповое. Самосев ели и пихты встречается преимущественно на валеже и микроповышениях. Подлесок редкий, в его составе клен желтый, роза иглистая, бересклет малоцветковый, спирея березолистная. В травяном покрове фон создают лептормора амурская, дерен канадский, майник двулистный, кислица обыкновенная, осока мечевидная, плауны; другие травянистые растения встречаются единично.

Наиболее распространены в парке ельники мелкотравно-зеленомошные (ЕМЗ), далее следуют ельники высокогорные (ЕВГ), ельники кустарниково-разнотравные (ЕКР), ельники зеленомошные (ЕЗ), ельники травяные (долинные) (ЕД), ельники с кленом желтым разнотравно-кустарниковые (ЕКЛЖ), ельники разнотравно-мелкопапоротниковые (ЕРМП), ельники крупно-папоротниковые с кедром (ЕКПК). В настоящее время на территории парка представлены 5 типов кедрово-еловых лесов. Наибольшую площадь занимает кедровый ельник с берёзой жёлтой мшисто-лещинный (табл. 45).

Таблица 45. Характеристика пихтово-еловых и кедрово-еловых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Формация пихтово-еловых лесов				
Ельник высокогорный	ЕВГ	Гребни водоразделов и прилегающие к ним крутые склоны, бассейн р. Большая Уссурка	IV–V	2727
Ельник зеленомошный	ЕЗ	Крутые и очень крутые склоны, преимущественно С, СВ, СЗ, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	1479
Формация пихтово-еловых лесов				
Ельник мелкотравно-зеленомошный	ЕМЗ	Крутые и среднекрутые склоны, преимущественно С, СВ, СЗ; до высоты 1000 м, бассейн р. Большая Уссурка	III–IV	3421
Ельник разнотравно-мелкопапоротниковый	ЕРМП	Пологие и средней крутизны склоны разной экспозиции (кроме Ю); 500–700 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	642

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Ельник с кедром крупнопоротниковый	ЕКПК	Пологие и средней крутизны склоны разной экспозиции (кроме Ю); от 500 до 800 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	194
Ельник с клёном жёлтым разнотравно-кустарниковый	ЕКЛЖ	Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ; 500–700 м, бассейн р. Большая Уссурка	III–IV	776
Ельник кустарниково-разнотравный	ЕКР	Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ; на высоте 500–600 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	2032
Ельник долинный	ЕД	Надпойменные и переходные речные террасы, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	1232
Итого:			12 503,00	
Субформация кедрово-еловых лесов				
Мшисто-папоротниковый кедровник	К-5	Склоны разной экспозиции, но чаще – северных румбов, средней, реже малой крутизны, до 600 м над ур. моря, бассейн р. Большая Уссурка	III–IV	190
Кедровельник с берёзой жёлтой мшисто-лещинный	КЕБЖ	Склоны малой и средней крутизны от В-ЮВ до СВ, С, СЗ экспозиции, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	1260
Кедровельник с липой мшисто-кустарниковый	КЕЛП	Склоны малой и средней крутизны от В-ЮВ до СВ, С, СЗ, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	468
Елово-широколиственный с кедром	ЕШК	Склоны малой и средней крутизны от В-ЮВ до СВ, С, СЗ, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	685
Кедровельник с пихтой белокорой мшисто-кустарниковый	КЕП	Склоны малой и средней крутизны, преимущественно СВ, С, СЗ, бассейн р. Большая Уссурка	III–IV	67
Итого:			2670	

Широколиственно-кедровые леса. Выделено 7 типов широколиственно-кедровых лесов, находящихся на разных этапах возрастного и восстановительного развития (табл. 46). Эти леса определяют облик лесного покрова парка. Для этих растительных сообществ характерен большой набор коренных лесообразователей. Они занимают средние и нижние части горных склонов разных экспозиций и крутизны, поднимаясь в среднем до высоты 600–700 м над ур. моря,

Таблица 46. Характеристика широколиственно-кедровых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Кедровник с дубом рододендровый	К-1	Гребни водоразделов и примыкающие крутые и очень крутые склоны, преимущественно ЮВ, Ю, ЮЗ; до 700 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	V	307
Кедровник с дубом лещинно-леспедце-вый	К-2	Крутые и очень крутые склоны, преимущественно ЮВ, Ю, ЮЗ, до 600 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	V	401
Кедровник с липой и дубом лещинный	К-3	Верхние и средние части склонов средней крутизны, преимущественно З, В, СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ; до 600 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	6829
Кедровник с берёзой жёлтой разнокустарниковый	К-4	Верхние и средние части склонов средней крутизны, преимущественно СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ; до высоты 600–700 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	19921
Кедровник с липой и дубом кленово-лещинный	К-6	Средние части склонов малой и средней крутизны, преимущественно СВ, В, СЗ, З до высоты 500–600 м, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III	4947
Кедровник долинный	К-7	Высокие надпойменные и переходные террасы, очень редко заливаемые и не заливаемые водами реки в наводнения, иногда очень пологие склоны и шлейфы, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III	1269
Кедровник с ясенем рябинолистниковый	К-8	Низкие участки надпойменных и переходных террас, на длительное время заливаемые водами рек в наводнения, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	1553
Итого:				35227
Субформация: кедрово-лиственничные леса				
Кедровник с лиственницей разнотравный	КЛ	Водораздельный хребет ключа Николаев, 3 экспозиции, высота около 400 м	III–IV	5

также произрастают на дренированных террасах речных долин, конусах выноса небольших водотоков, затопляемые или кратковременно заливаемые водами рек Большая Уссурка и Арму в наводнения.

В местах с выраженными температурными инверсиями, а также на склонах свыше 700 м над ур. моря кедрово-широколиственные леса сменяются кедрово-еловыми. На гребнях водоразделов, на крутых склонах преимущественно южных экспозиций с мелкими каменистыми почвами растут кедровники с дубом, занимающие небольшие площади, на долю рододендронowego кедровника с дубом приходится 0,7% от площади кедровых лесов, а на долю лещинно-леспедцевого кедровника с дубом – 0,9%.

Сухие рододендрово-леспедцевые кедровники с дубом (К-1) развиваются на узких гребнях водоразделов, вершинах, крутых склонах, скалистых выступах гор до высоты 700 м над ур. моря.

В составе древостоя преобладают сосна корейская, за которой закрепилось название кедр (до 40%), и дуб монгольский (от 30 до 50%), кроме них в составе встречаются и другие древесные породы – липа амурская, березы даурская и ребристая, тополь дрожащий, клен моно (их доля участия не более 10%). Средний возраст кедр 150–160 лет, средний диаметр 32–36 см, средняя высота 20 м. Полнота 0,5–0,6. Запас на 1 га 170–220 м³. Класс бонитета – III.

Подрост редкий, на 1 га 0,75–1,5 тыс. шт., представлен мелким (высотой до 50 см), реже средним (высотой 51–150 см) подростом кедр, дуба монгольского и других древесных пород.

Подлесок редкий, местами средней густоты, высотой 1–1,5 м, преобладает рододендрон остролистный, леспедца двуцветная, встречаются единично: жимолость Максимовича, чубушник тонколиственный, бересклет малоцветковый.

Травяной покров развит слабо, в его составе осоки (низенькая, ланцетная, ржавопятнистая), очиток Миддендорфа, полынь Сайто, красоднев Миддендорфа, мятлик Скворцова.

Периодически сухие лещинно-леспедцевые кедровники с дубом (К-2) формируются на крутых и очень крутых склонах до 600 м над ур. моря.

Господствующими породами в древостоях являются кедр (от 40 до 80%) и дуб (от 10 до 50%), на долю липы амурской, ели аянской, пихты белокорой, клена моно, березы ребристой приходится до 10%. Средний возраст кедр 150–190 (реже 260) лет, средний диаметр от 28 до 42 (реже 52) см, средняя высота 18–24 (реже 26) м. Полнота 0,4–0,7. Запас на 1 га 200–300 м³. Класс бонитета III–IV.

Подрост редкий, на 1 га 1,0–1,5 тыс. шт., представлен мелким (высотой до 50 см), реже средним (высотой 51–150 см) подростом кедр, дуба монгольского, липы амурской, клена моно, пихты белокорой, березы ребристой, клена зеленокорого и др.

Подлесок редкий, высотой 1,0–2,0 м, преобладает леспедца двуцветная, лещина маньчжурская, жимолость Максимовича, чубушник тонколиственный, бересклет малоцветковый, свободнаягодник колючий, смородина маньчжурская. Из лиан – актинидия коломикта, виноград амурский.

Травяной покров хорошо развит, в его составе осоки (ржавопятнистая, мечевидная, кривоногая, возвратившаяся), мятлик Скворцова, адиант стоповидный, щитовник толстокорневищный, ложнопузырник игольчатый, майник двулистный, ландыш кейске и др.

Свежие лещинные кедровники с липой и дубом (К-3) распространены на крутых и покатых, преимущественно западных, юго-западных, восточных и юго-восточных склонах до высоты 600 м над ур. моря, занимают в парке 17,9% от площади кедровых лесов.

Господствующими породами в древостоях являются кедр (от 10 до 70%), дуб (от 10 до 40%) и липа амурская (от 10 до 30%), на долю ели аянской, пихты белокорой, клена моно, березы ребристой приходится до 20%. Средний возраст кедра 160–270 лет, средний диаметр от 28 до 52 см, средняя высота от 20 до 27 м. Полнота 0,3–0,7. Запас на 1 га 100–250 м³. Класс бонитета III–IV.

Подрост редкий – на 1 га 1,0–2,0 тыс. шт., представлен мелким, средним и крупным подростом кедра, пихты белокорой, ели аянской, липы амурской, дуба монгольского, клена моно, березы ребристой, клена зеленокорого и другими породами.

Подлесок средней густоты, высотой до 2,5 м, в его составе лещина маньчжурская, чубушник тонколистный, жимолость Максимовича, бересклет малоцветковый, свободнаягодник колючий, смородина маньчжурская. Из лиан – актинидия коломикта, виноград амурский.

Травяной покров хорошо развит, в его составе осоки (ржавопятнистая, возвратившаяся), мятлик Скворцова, адиант стоповидный, щитовник толстокорневищный, ложнопузырник игольчатый, какалия копьевидная, майник двулистный и др.

Правый берег р. Большая Уссурка, Николаев ключ, левый борт, средняя часть западного склона, 548 м, 45°47.471' с.ш., 135°25.752' в.д.

Свежие разнокустарниковые кедровники с желтой березой (К-4) обычно занимают крутые и очень крутые, реже покатые склоны преимущественно северной, западной и восточной экспозиций поднимаясь до высоты 600 м над уровнем моря.

Разнокустарниковые кедровники с желтой березой – наиболее распространенный тип кедрово-широколиственной формации, в национальном парке их доля – 59,6%. Обычными сопутствующими породами в этом типе являются береза желтая, липы Таке и амурская, пихта белокорая, ель аянская, реже ильм горный, ясень маньчжурский, дуб монгольский, клен моно, тополь дрожащий. Примесь сопутствующих пород может достигать более 50% по запасу стволовой древесины. Класс бонитета древостоев – IV–III. Возобновление древесных пород удовлетворительное, а береза желтая и ель аянская обильно возобновляются на валеже. В подросте всех категорий происходит накопление хвойных пород.

Для этих кедровников характерен густой хорошо развитый подлесок из лещины маньчжурской, чубушника, свободнаягодника колючего, клена бородчатонервного, барбариса амурского, смородины, жимолости и бересклетов. Очень часты лианы – актинидия, лимонник, виноград.

Травяной покров сложный по строению и многовидовой. В его составе осмориза остистая, реброплодник уральский, корноптерис городчато-пильчатый, кониограмма средняя.

Кедровник разнокустарниково-кониограммовый с желтой березой, 230 лет, полнота 0,5. Правый берег р. Большая Уссурка, Николаев ключ, правый борт, средняя часть восточного склона, 312 м, $45^{\circ}47.224'$ с.ш., $135^{\circ}24.998'$ в.д.

Левобережье р. Большая Уссурка, Трофимов ключ, северо-восточный, северный склоны, 346–511 м над ур. моря, $45^{\circ}38.476'$ с.ш., $135^{\circ}21.161'$ в.д.

Правый берег реки Большая Уссурка, 280 м над ур. моря, на выровненном гребне вдоль ключа Ковалевский.

На обследованных участках в составе древостоев единично отмечен тис остроконовый.

Влажные миисто-папоротниковые кедровники с пихтой и желтой березой (К-5) занимают склоны разной экспозиции, чаще северных румбов, до высоты 600–700 м над уровнем моря, входят в субформацию кедрово-еловых лесов, где их доля составляет 6,2%.

Левобережье р. Большая Уссурка, Левый Михайловский ключ, $45^{\circ}45.134'$ с.ш., $135^{\circ}19.345'$ в.д., 220–270 м над ур. моря, отмечено 40 деревьев тиса остроконового. Ковалевский ключ, $45^{\circ}47.048'$ с.ш., $135^{\circ}19.486'$ в.д., 271–320 м над ур. моря, северный, северо-восточный склоны, отмечено 330 деревьев, $45^{\circ}47.224'$ с.ш., $135^{\circ}19.460'$ в.д., 300–310 м над ур. моря, северный склон, встречено более 100 деревьев тиса.

Ковалевский ключ, левый борт, $45^{\circ}47.243'$ с.ш., $135^{\circ}19.112'$ в.д., нижняя часть северо-западного склона, $5-10^{\circ}$, 250–340 м, отмечено 165 деревьев тиса.

Левобережье р. Большая Уссурка, Яков ключ, $45^{\circ}46.092'$ с.ш., $135^{\circ}25.427'$ в.д., выположенная часть северо-восточного склона, 270–295 м над ур. моря, отмечено 74 тиса.

Влажные кленово-лещинные кедровники с липой и дубом (К-6) формируются на покатых и пологих склонах и у подножья гор, чаще южных экспозиций до высоты 500–600 м над ур. моря. В национальном парке занимают 13,6% площади кедровых лесов.

Кленово-лещинный кедровник с липой и дубом, 210–230 лет, полнота 0,5. Правый берег р. Большая Уссурка, юго-восточный склон (выше дороги Островной ключ – КПП 1 «Корейский»), 357 м, $45^{\circ}47.213'$ с.ш., $135^{\circ}18.043'$ в.д.

Правый берег р. Большая Уссурка, 220 м, средняя часть северо-восточного склона, $45^{\circ}46.873'$ с.ш., $135^{\circ}17.509'$ в.д.

Большая часть долинных кедровников входит в запретные полосы в бассейнах рек Большая Уссурка и Арму, они занимают надпойменные террасы, конусы выноса небольших водотоков, затопляемые или кратковременно заливаемые водами реки в наводнения. Обычными сопутствующими кедру породами являются ильм долинный, ясень маньчжурский, ели аянская и корейская, пихта белокорая, береза желтая, липа Таке, тополь корейский и клен мелколистный. Класс бонитета древостоев – III–II. Возобновление древесных пород удовлетворительное. Для этих кедровников характерен густой многовидовой подлесок, наиболее типичны

элеутерококк, смородина, жимолость, лещина маньчжурская и рябинник. Из лиан обычен лимонник. Травяной покров сложный по строению и многовидовой.

Влажные долинные кедровники (К-7) располагаются на высоких надпойменных террасах, очень редко заливаемых водами реки в наводнения. В национальном парке занимают 2,9% площади кедровых лесов.

В составе древостоя преобладает сосна корейская (до 60%), обычные сопутствующие породы: ильм японский, ясень маньчжурский, ель аянская, пихта белокорая, реже бархат амурский, липа амурская, клен моно, орех маньчжурский, береза плосколистная, тополь дрожащий. Примесь сопутствующих пород может достигать более 50% по запасу стволовой древесины. Полнота 0,4–0,7. Запас на 1 га 200–250 м³, реже 500–600 м³. Класс бонитета древостоев – III–IV, реже II.

Возобновление древесных пород удовлетворительное. В подросте всех категорий происходит накопление хвойных пород.

Подлесок редкий, многовидовой, состоит из боярышника Максимовича, свободнойгодника колючего, свободнойгодника сидячецветкового, жимолости золотистоцветковой, смородины маньчжурской, бузины кистистой, рябинника рябинолистного, свидины белой, калины Саржента, лимонника китайского.

Травяной покров хорошо развит, сомкнутость 0,8. В его составе более 60 видов растений, наибольшее проективное покрытие у щитовника толтокорневищного, страусника обыкновенного, оноклеи чувствительной, чистоустника азиатского, крапивы светло-зеленой, а остальные виды встречаются единично: борец Щукина, воронец заостренный, водосбор острочашелистиковый, кочедыжник китайский, однопокровница амурская, полынь лесная, спаржа шобериевидная, недоспелка ушастая, недоспелка копьевидная, калужница перепончатая, схизопепон переступенелистный, луносемянник даурский, ломонос бурый, бузульник Фишера, сердечник белоцветковый, осоки, чистотел азиатский, селезеночник ветвистый, ландыш Кейске, энемион Радде, лабазник дланевидный, бахромчатолепестник лучистый, мак лесной весенний, майник двулистный, майник широколистный, колючестебельник Тунберга и др.

Долинный кедровник расположен в бассейне р. Большая Уссурка, ключ Кордонный, урочище Чистый затон (45°44.987' с.ш., 135°29.214' в.д., 255–265 м над ур. моря, рис. 4). На участке 26 июня 2014 года была заложена постоянная пробная площадь 3–2014 (табл. 47). Кедровник долинный с ильмом и ясенем, возраст 200 лет, полнота 0,6.

Долинный кедровник расположен в излучине рек Большая Уссурка и Арму (Тенникова база), 45°45.847' с.ш., 135°28.325' в.д., 237–248 м над ур. моря. Кедровник долинный с ильмом

Древостой двухъярусный: *I полог* 6К 2Илд 2Я ед. Лп, Пб, Еа, Дм, средняя высота 24,0 м, средний диаметр 50,5 см, средний возраст 180–190 лет, полнота 0,5–0,6. Класс бонитета – III, запас – 350–450 м³; *II полог* 6К 2Клм 1Лп 1Дм +Еа + Клж ед. Ма, средняя высота 9,5 м, средний диаметр 12,2 см, средний возраст 60–70 лет, полнота – 0,5, запас около 20 м³.

Сырые рябинолистниковые кедровники с ясенем (К-8) занимают низкие участки надпойменных террас, заливаемые водами реки в наводнения. В национальном парке занимают 4,4% территории широколиственно-кедровых лесов.

Кедрово-лиственничные леса в национальном парке по данным лесоустройства занимают в Дальнекутском лесничестве площадь 5 га и расположены на западном склоне водораздельного хребта ключа Николаев на высоте 400 м (табл. 47). Состав древостоя 8К 2Л, средний диаметр 36 см, средняя высота 20 м, средний возраст 140 лет, полнота 0,5. Запас древесины на 1 га 190–200 м³. Класс бонитета древостоя – III.

П.В. Крестов (1993а, б) встретил и описал этот тип леса как лиственничник сфагново-бруснично-багульниковый на террасовидном уступе осыпного происхождения на западном склоне водораздельного хребта ключа Николаев и отнес его к категории редких для западного макросклона Сихотэ-Алиня. В древостое господствует лиственница даурская, сомкнутость крон 0,5. Подрост лиственницы жизнеспособный, а кедр и березы желтой – угнетенный. В подлеске аспект создает рододендрон (*Сор1-gr*), реже встречается смородина Комарова.

Таблица 47. Таксационная характеристика древостоя на пробной площади 3-2014, данные на 1 га

Порода	Средние		Количество, шт.	Сумма площадей сечения, м ²	Запас, м ³
	D _{1,3} см	Н, м			
I ярус: состав 5К 2Ил 2Я 1Е +Бх					
Бархат амурский	46,1	21,5	12	2,008	19,36
Ель аянская	34,8	24,5	52	4,988	58,76
Ильм японский	65,1	26,0	40	13,324	107,44
Кедр корейский	35,5	25,5	284	28,20	304,28
Ясень маньчжурский	45,2	24,5	68	7,06	96,64
Итого			432	55,46	574,08
II ярус; состав 3Ма 3(Клж+Клз+Клм) 1Я 1Е 1Тр 1Б +Лп ед. Ил, К, Пб					
Боярышник	8,0	6,5	12	0,06	0,12
Ель аянская	8,0	6,0	16	0,08	0,16
Ильм японский	8,1	7,0	4	0,020	0,04
Кедр корейский	7,7	6,3	4	0,020	0,04
Клен желтый	8,6	6,5	28	0,164	0,44
Клен зеленокорый	10,1	8,5	8	0,064	0,24
Клен моно	8,0	7,5	8	0,04	0,08
Липа амурская	8,0	7,5	8	0,04	0,08
Маакия амурская	12,4	10,5	12	1,144	0,76
Пихта белокорая	8,0	7,5	4	0,02	0,04
Трескун амурский	8,0	6,5	16	0,08	0,16
Ясень маньчжурский	8,3	7,7	24	0,12	0,24
Итого			144	1,852	2,4
Всего			576	57,312	576,48

В травяно-кустарничковом ярусе доминирует багульник подбел (Сор3-gr) и брусника (Сор2), единично представлено таежное мелкотравье: седмичник европейский, дерен канадский и подмаренник камчатский. На открытых участках отмечены синузии бадана тихоокеанского и очитка сельского.

При обследовании нами бассейна ключа Николаев данный тип леса не был встречен.

Лиственничные леса. Лиственничные леса по материалам лесоустройства располагаются в Пихтовом лесничестве (бассейн р. Большая Уссурка, ключ Пасечный) и включают два типа леса: лиственничник багульниково-моховой (ЛБМ) и лиственничник вейниково-разнотравный (ЛВРТ).

Лиственничники багульниково-моховые встречаются в нижних частях горных склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным увлажнением, по данным лесоустройства занимают площадь 142 га (табл. 48).

Таблица 48. Характеристика лиственничных лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Местоположение, рельеф	Класс бонитета	Площадь, га
Лиственничник багульниково-моховой	ЛБМ	Нижние части горных склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным увлажнением, бассейн р. Большая Уссурка	IV	142
Лиственничник вейниково-разнотравный	ЛВРТ	Шлейфы склонов разной экспозиции, речные террасы и другие формы рельефа с избыточным, частично застойным увлажнением, бассейн р. Большая Уссурка	III–IV	10
Итого				152

Лиственничники вейниково-разнотравные занимают шлейфы склонов разной экспозиции, речные террасы и другие формы рельефа с избыточным, частично застойным увлажнением. Их площадь по материалам лесоустройства 10 га. Этот тип леса встречен нами в районе Темных озер (долина ключа Пасечный) по пониженным слабодренированным участкам надпойменных террас долины р. Большая Уссурки. По-видимому, они представляют собой длительно-восстановительную смену коренного долинного кедровника.

Над основным пологом хвойно-лиственного древостоя из сосны корейской, лиственницы Каяндера, ели аянской, пихты белокорой, березы ребристой, дуба монгольского, клена зеленокорого, березы плосколистной, маакии амурской возвышаются «маяки» сосны корейской и лиственницы Каяндера. Возобновление древесных пород необильное, распределение по площади неравномерное, групповое, в составе подроста сосна корейская, пихта белокорая, ель аянская, тис остроколючный, лиственница, ильм долинный, клены, маакия, аралия.

Подлесок средней густоты, групповой, в его составе бересклет малоцветковый, береза овальнолистная (ерник), чубушник тонколистный, лимонник китайский, свободнаягодник колючий и др.

Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, фон создают папоротники (чистоустник азиатский, орляк обыкновенный, лунокучник густосорусовый, лептормора амурская, буковник обыкновенный, голокучник обыкновенный), отмечены синусии клитонии удской, косоплодника сомнительного, майника широкого, ландыша Кейске, седмичника европейского, плауна темного, вахты трехлистной, касатика гладкого, белокрыльника болотного, реже встречаются калужница лесная, кизляк кистецветный, связноплодник почколистный, княжик охотский.

Дубовые леса. На территории парка дубовые леса образованы дубом монгольским, и большинство типов дубняков возникло из кедрово-широколиственных лесов в результате многочисленных пожаров. Производные дубняки располагаются в нижней и средней части склонов южной, юго-западной, юго-восточной экспозиций разной крутизны, обращенных к долине р. Большая Уссурка и р. Арму, поднимаясь в среднем до высоты 240–480 м над ур. моря. В составе дубовых лесов помимо дуба монгольского принимают участие березы (даурская, ребристая и плосколистная), липа амурская, тополь дрожащий, сосна корейская и другие древесные породы. По материалам лесоустройства на территории национального парка 5 типов дубовых лесов (дубняки леспедецевые горные, дубняки лещинные горные, дубняки кустарниково-разнотравные, дубняки с липой и лещиной маньчжурской и дубняки с черной березой). Наиболее часто встречаемые типы – дубняки кустарниково-разнотравные и дубняки с черной березой (табл. 49).

Таблица 49. Характеристика дубовых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Дубняк леспедецевый горный	Д2Г	Сухие и периодически сухие гребни водоразделов и верхние части среднекрутых и крутых склонов, преимущественно Ю, ЮВ, ЮЗ; до 500 м, бассейн р. Арму	V	28
Дубняк лещинный горный	Д3Г	Водоразделы, средние и нижние части склонов малой и средней крутизны разных, но преимущественно В, Ю, З; до 400 м, бассейн рек Большая Уссурка и Арму	IV	57
Дубняк кустарниково-разнотравный	Д4	Водоразделы, средние и нижние части склонов малой и средней крутизны разных, но преимущественно В, Ю, З; 250–400 м, бассейн р. Большая Уссурка	IV–V	169
Дубняк с липой и лещиной маньчжурской	Д5	Средние и нижние части склонов разной крутизны и экспозиции, но преимущественно Ю, бассейн р. Большая Уссурка	IV	43

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Дубняк с берёзой даурской	Дб	Средние и нижние части склонов разной крутизны и экспозиции, но преимущественно Ю, бассейн р. Большая Уссурка	IV–V	178
Итого				475

Дубняк леспедцевый – один из обычных типов дубовых лесов, расположен на правом берегу р. Большая Уссурка, пологая часть южного склона, 250–260 м над ур. моря, пробная площадь 2-2014 (45°45.163' с.ш., 135°22.010' в.д.).

Древостой одноярусный, происхождение смешанное, состав: 10Д. Средний возраст 60–80 лет, средняя высота – 13,5 м; средний диаметр – 20,2 см, Класс бонитета – III. Количество стволов на 1 га – 988 шт., запас – 219 м³ га⁻¹, полнота – 0,7 (табл. 50).

Таблица 50. Таксационная характеристика древостоя на пробной площади 2-2014, данные на 1 га

Порода	Средние		Количество, шт.	Сумма площадей сечения, м ²	Запас, м ³
	D _{1,3} см	H, м			
Дуб монгольский	20,2	13,5	988	31,908	218,6

Возобновление дуба слабое и представлено семенными и порослевыми экземплярами дуба и сопутствующих ему пород. Семенное возобновление периодически повреждается пожарами.

Подлесок хорошо развит, господствует леспедца двуцветная, единично встречаются лещина маньчжурская, бересклет малоцветковый, боярышник Максимовича, виноградовник короткоцветоножковый, лимонник китайский, виноград амурский.

Травяно-кустарничковый ярус многовидовой, хорошо развитый, средней густоты, в его составе более 50 видов: бубенчик перескиелистный, полынь лесная, кочедыжник китайский, веретенник яйцевидный, осоки: низенькая, возвратившаяся, ржавопятнистая; хлорант японский, ландыш Кейске, венерин башмачок настоящий, в.б. крупноцветковый, ясенец мохнатоплодный, деллингерия шершавая, дремлик сосочковый, подмаренник даурский, красоднев Миддендорфа, вербейник даурский, перловник поникающий, пион молочноцветковый, пион обратнойцевидный, косоплодник сомнительный, купена обертковая, марена сердцелистная, синейлезис борцоволистный, сростнохвостник дельтовидный, вероничник сибирский, горошек амурский, ластовень заострённый, фиалка Селькирка и др. Аспект не создает ни один вид.

Белоберёзовые леса. Белоберёзовые леса сформировались после пожаров и рубок. В национальном парке лесоустройством отмечены две группы типов леса:

белоберезник лещинно-кустарниковый (ББК) и белоберезник лещинный (ББЛ), которые занимают 79 га лесопокрытой площади (табл. 51). Класс бонитета спелых насаждений III.

Таблица 51. Характеристика берёзовых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Белоберезник лещинный	ББЛ	Склоны преимущественно средней крутизны и преимущественно В, С, З; на всех высотных уровнях бассейнов рек Большая Уссурка и Арму	III	30
Белоберезник лещинно-кустарниковый	ББК	Склоны преимущественно средней крутизны и преимущественно В, С, З; на всех высотных уровнях бассейнов рек Большая Уссурка и Арму	III	49
Итого				79
Желтоберезник крутых склонов	БЖ1	Склоны всех экспозиций разной крутизны в среднем и верхнем поясе гор бассейнов р. Большая Уссурка и р. Арму	III	187
Желтоберёзовые смешанные леса	БЖ2	Склоны всех экспозиций разной крутизны в среднем и верхнем поясе гор бассейнов р. Большая Уссурка и р. Арму	III–IV	1299
Итого				1486

Белоберёзовый разнокустарниково-разнотравный лес с осинной, 60–70 лет, 0,4. Правый берег р. Большая Уссурка, надпойменная терраса, 240–260 м, 45°42.867' с.ш., 135°29.214' в.д.

Желтоберёзовые леса сформировались на месте кедрово-широколиственных лесов после пожаров и рубок, занимают склоны всех экспозиций и разной крутизны. В национальном парке лесоустройством отмечено две группы типов леса: *папоротниково-кустарниковые (БЖ 1)* и *разнотравно-широколиственные (БЖ 2)*. Класс бонитета спелых насаждений III–IV. В национальном парке занимают 1490 га лесопокрытой площади.

Осиновые леса сформировались на месте кедрово-широколиственных лесов после пожаров и рубок. В национальном парке лесоустройством отмечены две группы типов леса: осинники лещинно-разнокустарниковые (ОСЛК) и осинники разнотравные (ОСРТ), они занимают 64 га лесопокрытой площади (табл. 52). Класс бонитета спелых насаждений III–IV.

Долинные лиственные леса. Долинные лиственные леса национального парка сложены ильмом, ясенем, ивами, тополями, ольхой, коряжкой. Леса из этих пород в пойме рек, ручьев и ключей довольно динамичны и образуют сменяющие друг друга серийные сообщества.

Ясенево-ильмовые леса распространены по высоким поймам и участкам надпойменных террас с периодическим застойным увлажнением в бассейне

Таблица 52. Характеристика осиновых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Осинник лещинно-разнокустарниковый	ОСЛК	Преимущественно нижние части склонов и шлейфы разной экспозиции и крутизны бассейнов рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	42
Осинник разнотравный	ОСРТ	Преимущественно нижние части склонов и шлейфы разной экспозиции и крутизны бассейна рек Большая Уссурка и Арму	III–IV	22
Итого				64

р. Большая Уссурка. Лесоустройством выделены три типа леса: широколиственно-ильмовая урема (ШИ), ясеневники осоково-разнотравные (ЯО), ясеневники с ильмом кустарниково-травянистые (ЯИ) (табл. 53). Леса данных типов имеют водоохранное и почвозащитное значение.

Таблица 53. Характеристика ясенево-ильмовых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Широколиственно-ильмовая урема	ШИ	Высокие прирусловые, часто подтопляемые, но редко заливаемые, прорезанные старицами террасы бассейна р. Большая Уссурка	III–IV	883
Ясенёвник с ильмом кустарниково-травянистый	ЯИ	Нижние части пологих склонов, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	III	3201
Ясенёвник осоково-разнотравный	ЯО	Широкие надпойменные или переходные, редко заливаемые террасы с периодическим застойным переувлажнением, бассейн р. Большая Уссурка	IV–V	78
Итого				4162

В сложении древостоя обычны ясень маньчжурский (от 20 до 70%), ильм японский (от 30 до 80%), орех маньчжурский (10–20%), ель аянская (до 20%), сосна корейская (10–20%), тополь Максимовича (10–30%), в подчиненных ярусах – сирень амурская, черемуха азиатская, ивы, крушина даурская.

Подлесок рассеянный, иногда совершенно отсутствует, в его составе бузина кистистая, рябинник рябинолистный, бересклет Маака и б. священный, свидина белая, калина Саржента.

Травяной покров развит, сложен вейником Лангсдорфа, страусником, хвощом зимующим, осоками, крапивой узколистной, лабазником дланевидным, недотрогой обыкновенной, калужницей, вороньим глазом, недоспелкой копьевидной, водосбором острошашелистым и другими видами.

В низкой пойме представлены чозенивые (*Chosenia arbutifolia*), тополевые (*Populus maximowiczii*) и ивовые леса, которые формируются под влиянием гидрологического режима реки.

Чозенивые леса развиваются на молодых песчано-галечниковых наносах. Лесоустройством выделен высокотравно-кустарниковый чозенник, где корейка образует высокопроизводительное насаждение I–II класса бонитета без примеси или с небольшой примесью ольхи волосистой, тополя Максимовича, ильма долинного, ясеня маньчжурского и других древесных пород (табл. 54). Характерными особенностями чозенников являются их одновозрастность и полное отсутствие естественного возобновления корейки под древесным пологом.

В подлеске встречается рябинник рябинолистный, жимолость Максимовича, свидина белая.

Травяной покров многовидовой, в его составе крапива узколистная, осоки расходящаяся и придатковая, недоспелки копьевидная и ушастая, лабазник дланевидный, вейник Лангсдорфа, полынь красночерешковая, борщевик рассеченный, страусник германский, чистотел азиатский и др. Общее проективное покрытие трав составляет 60–70%, высота 0,2–0,7 м. Значение чозенников заключается, прежде всего, в их защитной роли по отношению к берегам рек. Являясь пионерами растительного покрова в долинах рек, чозенники представляют собой первое звено последующих сукцессионных смен.

Таблица 54. Характеристика чозениевых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Чозениево-тополевые леса	ЧЗТ	Пойменные, часто заливаемые и переходные подтопленные террасы бассейна р. Большая Уссурка	I–II	82
Итого				82

Тополевые леса формируются на наносных иловато-песчаных почвах первой пойменной террасы р. Большая Уссурка и занимают 121 га лесопокрытой площади (табл. 55). Лесоустройством выделены два типа – тополево-ивовые прирусловые (ТИв) и тополево-чозениевые (ТЧз).

В древостое – тополь Максимовича (30–60%), на долю сопутствующих пород – ильма японского, ясеня, тополя дрожащего, ели и чозении – приходится 40–70%. Тополь формирует высокопроизводительные насаждения I–II класса бонитета.

Подлесок сложен рябинником рябинолистным и спиреей иволистной.

Травяной покров образован гигромезофильными видами, среди которых наиболее обильны лабазник дланевидный, недоторога обыкновенная, онюкля чувствительная, чистостник азиатский, щитовник толстокорневищный, вейник

Лангсдорфа, бузульник Фишера, поручейник приятный, калужница болотная, крестовник коноплеволистный, белокопытник Татеваки, хвощ лесной и др. Общее проективное покрытие трав составляет 60–80%. Высота травянистого яруса 0,2–1,0 м.

Таблица 55. Характеристика тополевых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, экспозиция, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Тополево-ивовые леса	ТИВ	Первые пойменные постоянно заливаемые террасы, сложенные галечниковым аллювием бассейна р. Большая Уссурка	II	135
Тополево-чозениевые леса	ТЧЗ	Пойменные, часто заливаемые и переходные подтопляемые террасы бассейна р. Большая Уссурка	I–II	121
Итого				256

Ивовые леса занимают галечниково-иловато-песчаные наносы. Лесоустройством выделена разнотравно-вейниковая формация из древовидных и кустарниково-древовидных ив (табл. 56).

Таблица 56. Характеристика ивовых и ольховых лесов

Тип леса	Шифр типа леса	Рельеф, местоположение	Класс бонитета	Площадь, га
Ивняк вейниковый	ИВВ	Пойменные, периодически заливаемые террасы, сложенные песчано-галечниковым аллювием, бассейны рек Большая Уссурка и Арму	II–III	181
Итого				181
Ольховник кустарниково-ый	ОЛК	Низкие и средние уровни пойменных террас р. Большая Уссурка и крупных ключей с застойным переувлажнением	IV	36
Итого				36

В разнотравно-вейниковом ивовом лесу главными лесообразующими породами являются несколько видов древовидных ив (росистая, Пьеро, Шверина, удская), чозения, тополь Максимовича и сопутствующие породы – лигустрина амурская, яблоня ягодная и др.

В вейниковом ивовом лесу преобладают ивы (росистая, Пьеро, Шверина, удская, скрытая, тонкостолбиковая, коротконожковая).

Подлесок ивовых лесов редкий, сложен рябинником рябинолистным, спиреей иволистной, жимолостью Максимовича.

Травяной покров средней густоты, преобладают растения влажных мест обитания – полыни селенгинская, побегоносная, вейник Лангсдорфа, осоки (придатковая, расходящаяся).

Ольховые леса приурочены к первой надпойменной террасе и занимают в национальном парке всего 36 га. Лесоустройством выделен только один тип леса – ольховники кустарниковые (Олк) (табл. 56).

Древостой сложен ольхой волосистой, ивами и тополем Максимовича, развивается по IV классу бонитета. Средний возраст 50 лет, средняя высота – 8–10 м; средний диаметр – 12,0–16,0 см. Полнота – 0,7. Запас на 1 га – 60–70 м³.

Подлесок средней густоты, в его составе рябинник рябинолистный и спирея иволистная.

Травяной покров представлен вейником Лангсдорфа, лабазником дланевидным, чистострунником азиатским, ариземой амурской, недоспелкой копьевидной, осоками (мочажинная, придатковая, расходящаяся), хвощом лесным, щитовником толстокорневищным, чистострунником азиатским.

Леса с тисом остроконечным. Особо хочется отметить леса с тисом остроконечным, которые лесоустройством не отмечены. Тис – редко встречающаяся хвойная порода российского Дальнего Востока. Растет преимущественно в поясе хвойно-широколиственных лесов. Леса с участием тиса встречаются на территории национального парка в бассейнах ключей Михайловский, Яков, Трофимов, Николаев и в охранной зоне парка в бассейне ключа Ковалевский. В бассейне ключа Ковалевский находится самая крупная популяция тиса более 500 крупных деревьев.

На северо-западном склоне левого берега ключа Ковалевский на высоте 280–300 м над ур. моря была заложена пробная площадь 1-2014 для длительного мониторинга за состоянием тиса (45°47.161' с.ш., 135°19.348' в.д., квартал 301 Дальнекутского участкового лесничества). Более полная информация по пробной площади приведена в работе (Сибирина и др., 2015).

В составе древостоя и подроста отмечено 23 древесных вида. Ранжирование вклада отдельных видов в состав древостоя показало, что доминирует тис (36%), за ним следуют сосна корейская и ель (табл. 57). Возраст тиса более 500 лет.

Таблица 57. Таксационная характеристика древостоев с тисом, данные на 1 га

Порода	Средние		Количество, шт.	Сумма площадей сечения, м ²	Запас, м ³
	D _{1,3} см	H, м			
Пробная площадь 1-2013 (площадь 0,12 га) бассейн кл. Михайловский					
Сосна корейская	45,7	24,2	262	43,034	550,3
Тис остроконечный	20,9	8,2	107	3,657	32,3
Ель аянская	43,0	23,5	16	2,378	30,5
Пихта почкочешуйная	10,2	10,9	66	0,533	2,62
Дуб монгольский	56,7	20,3	16	10,357	96,0
Ясень маньчжурский	23,9	19,5	8	0,369	3,4
Клен моно	23,1	17,0	16	0,697	6,4
Клен зеленокорый	14,0	13,5	16	0,256	1,6

Порода	Средние		Количество, шт.	Сумма площадей сечения, м ²	Запас, м ³
	D _{1,3} см	H, м			
Клен укурунду	8,0	7,3	16	0,082	–
Ильм лопастный	37,8	21,5	16	1,845	16,3
Итого			539	63,21	739,4
Пробная площадь 2-2013 (площадь 0,10 га) бассейн кл. Михайловский					
Сосна корейская	34,1	21,6	60	5,48	64,6
Тис остроконечный	18,1	8,0	200	5,13	37,8
Ель аянская	31,7	20,6	110	8,69	105,9
Пихта почкочешуйная	26,1	20,1	100	5,37	51,8
Липа амурская	81,4	22,4	20	10,40	79,4
Береза ребристая	20,3	17,6	20	0,65	6,2
Клен моно	30,5	18,2	20	1,46	12,4
Черемуха Маака	28,1	17,8	10	0,62	6,1
Ясень маньчжурский	36,1	22,5	10	1,02	11,1
Бархат амурский	24,3	16,0	20	0,93	6,8
Маакия амурская	32,9	18,3	20	0,82	7,8
Трескун амурский	8	7,7	10	0,05	–
Итого			600	40,62	389,9
Пробная площадь 1-2014 (площадь 0,25 га) бассейн кл. Ковалевский					
Сосна корейская	28,0	19,7	124	7,656	80,4
Тис остроконечный	41,2	11,8	96	12,824	136,4
Ель аянская	19,6	17,0	176	5,304	49,1
Пихта почкочешуйная	8,9	10,3	92	0,576	1,9
Дуб монгольский	22,5	15,5	36	1,272	9,2
Липа амурская	42,6	20,6	28	3,984	38,8
Береза ребристая	23,5	19,0	48	2,088	22,44
Клен моно	10,5	11,0	14	0,14	0,9
Клен зеленокорый	10,4	10,6	24	0,204	1,2
Клен укурунду	10,1	9,5	8	0,64	0,2
Черемуха Маака	18,0	15,0	8	0,204	1,5
Ясень маньчжурский	24,4	19,5	36	1,684	16,5
Орех маньчжурский	38,1	22,5	8	0,912	8,2
Ильм лопастный	15,1	14,2	8	0,144	1,0
Ольха волосистая	15,2	14,3	56	1,024	7,0
Рябина похуашаньская	8,0	8,5	8	0,04	0,1
Ива козья	28,1	18,5	4	0,248	2,2
Трескун амурский	8,8	8,1	76	0,456	1,5
Итого			850	39,4	378,5

Возобновление древесных пород на пробной площади плохое. В мелком подросте высотой до 50 см насчитано 308 шт. га⁻¹, в среднем высотой 51–150 см – 260 шт. га⁻¹. В мелком и среднем подросте преобладали кедр, пихта почкочешуйная и береза ребристая. Другие древесные породы – орех маньчжурский, ель, липа амурская, ильм лопастный, и. японский, клены – моно, зеленокорый и укурунду, бархат, черемуха Максимовича, жёстер – отмечены единично.

Тис в высотных категориях (0–150 см) также встречается единичными хорошо развитыми экземплярами. Размещение подроста по участку неравномерное, групповое: он произрастает на почве, а также на старых валёжинах. Крупный подрост высотой > 151 см (120 шт. га⁻¹) размещен неравномерно, в его составе 10 древесных видов: пихта, клен моно, трескун, клен укурунду, ель, липа, кедр, дуб монгольский, ильм японский, аралия высокая, но тис отсутствует.

Подлесок негустой (табл. 58). Кустарники распределены по пробной площади неравномерно, группами и представлены чубушником тонколиственным, лещиной маньчжурской, свободнойгодниками колючим и сидячецветковым, барбарисом амурским, бересклетом малоцветковым, смородиной маньчжурской и Максимовича, малиной боярышничколистной, бузиной кистистой, калиной Саржента, рябинником рябинолистным; проективное покрытие 30–40%. Внеярусная растительность включает актинидию коломикта, лимонник китайский и виноград амурский.

Таблица 58. Характеристика подлеска на пробных площадях

Вид	Обилие на пробных площадях					
	1-2016	2-2014	2-2013	1-2013	1-2014	3-2014
Кустарники и деревянистые лианы						
<i>Acer barbinerve</i>	–	–	Sol	Sol	–	–
<i>Actinidia kolomikta</i>	–	–	Sol	Sol	Sol	–
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>	–	Un	–	–	–	–
<i>Berberis amurensis</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sol	–
<i>Corylus mandshurica</i>	–	Sol	Sol	Sol	Sol	–
<i>Crataegus maximowiczii</i>	–	Sol	–	–	–	Sol
<i>Eleutherococcus senticosus</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>E. sessiliflorus</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Euonymus pauciflora</i>	–	Sol	Sol	Sol	Sol	–
<i>Lespedeza bicolor</i>	–	Cop1	–	–	–	–
<i>Lonicera sp.</i>	–	–	Sol	Sol		–
Кустарники и деревянистые лианы						
<i>Lonicera chrysantha</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Padus maximowiczii</i>	–	–	Sol	Sol	–	–
<i>Philadelphus tenuifolius</i>	–	–	Sol	Sol	Sol	–
<i>Rhamnus davurica</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Ribes mandshuricum</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Ribes maximoviczianum</i>	Sol	–	–	–	Sol	–

Вид	Обилие на пробных площадях					
	1-2016	2-2014	2-2013	1-2013	1-2014	3-2014
<i>Ribes pallidiflorum</i>	–	–	Sol	Sol	–	–
<i>Rubus crataegifolius</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Sambucus racemosa</i>	–	–	–	–	Sol	Sol
<i>Schisandra chinensis</i>	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Sol	–	–	Sol	Sol	Sol
<i>Spiraea betulifolia</i>	–	–	–	Sol	–	–
<i>Swida alba</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Viburnum sargentii</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Vitis amurensis</i>	–	Sol	Sol	–	Sol	–

Травяной покров выражен хорошо и занимает 60–70% поверхности почвы. Доминируют папоротники; преобладают лептормора амурская и щитовник толсто-корневищный, встречаются кочедыжник китайский, лунокучник густосорусовый, чистоустник азиатский, адиантум стоповидный, орлячок сибирский и кониограмма средняя (табл. 59). Мозаичное распределение разнотравья определяется степенью увлажнения и освещенности. Отмечены виды, характерные для долинных лесов: однопокровница амурская, водосбор острочашелистикový, борец Шукина, волжанка двудомная, вороний глаз мутовчатый, лесной мак весенний, луносемянник даурский, недоселка копьевидная, воронец красноплодный, лабазник гладчайший, звездчатка Бунге, крапива узколистная, яснотка бородастая, селезёночник ветвистый, репяшок мелкобороздчатый, шлемник уссурийский, стеблелист мощный.

Таблица 59. Характеристика травяного покрова на пробных площадях

Вид	Обилие на пробных площадях					
	1-2016	2-2014	2-2013	1-2013	1-2014	3-2014
<i>Aconitum sczukinii</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Actaea acuminata</i>	–	–	Sol	–	–	Sol
<i>Actaea erythrocarpa</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Adenophora pereskiiifolia</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Adenophora verticillata</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Adiantum pedatum</i>	Sol	–	–	Sol	Sol	–
<i>Adoxa moschatellina</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Agrimonia striata</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Amphicarpaea japonica</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Anemone udensis</i>	Sol	–	–	Sol	–	–
<i>Anemonoides amurensis</i>	–	–	–	–	–	–
<i>A. extremiorientalis</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Angelica cincta</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Aquilegia oxysepala</i>	–	–	–	–	Sol	Sol
<i>Arisaema amurense</i>	Sol	–	Sol	–	Sol	Sol

Вид	Обилие на пробных площадях					
	1-2016	2-2014	2-2013	1-2013	1-2014	3-2014
<i>Artemisia sylvatica</i>	–	Sol		–	–	Sol
<i>Aruncus dioicus</i>	–	–	–	Sol	Sol	–
<i>Asparagus schoberioides</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Asyneuma japonicum</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Athyrium sinense</i>	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Cacalia auriculata</i>	–	Sol	–	–	–	Sol
<i>C. hastata</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Calamagrostis</i> sp.	–	–	–	–	–	Sol
<i>Caltha palustris</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Campanula punctata</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Cardamine leucantha</i>	–	–	–	–	Sol	Sol
<i>Carex campylorhina</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>C. nanella</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>C. reventa</i>	–	Sol	–	–	–	Sol
<i>C. siderosticta</i>	–	Sol	Sol	Sol	–	Sol
<i>C. ussuriensis</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Caulophyllum robustum</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Chamaepericlymenum canadense</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Chelidonium asiaticum</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Chrysosplenium ramosum</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Circeae alpina</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sol	–
<i>C. cordata</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>C. lutetiana</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Cirsium schantarense</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Clematis fusca</i>	–	Sol	Sol	–	–	Sol
<i>C. manschurica</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Clintonia udensis</i>	–	–	Sol	–	–	–
<i>Codonopsis lanceolata</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Coniogramme intermedia</i>	–	–	–	–	Sp	–
<i>Convallaria keiskei</i>	Sol	Sol	–	Sol	Sol	Sol
<i>Cypripedium calceolus</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>C. macranthon</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Dictamnus dasycarpus</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Dioscorea nipponica</i>	Sol	Sol	–	–	–	–
<i>Diplazium sibiricum</i>	Sol	–	–	–	Sol	–
<i>Doellingeria scabra</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sp	Sp-cop1
<i>Enemion raddeanum</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Epipactis papillosa</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Equisetum hyemale</i>	Sol	–	–	–	–	–

Вид	Обилие на пробных площадях					
	1-2016	2-2014	2-2013	1-2013	1-2014	3-2014
<i>Euphorbia discolor</i>	–	Sol	–			–
<i>Filipendula glaberrima</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>F. palmata</i>	Sol	Sol	Sol	–	–	Sol
<i>Fimbripetalum radians</i>	–	–	–	–	Sol	Sol
<i>Fragaria orientalis</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Galium boreale</i>	–	–	Sol	–	–	Sol
<i>G. davuricum</i>	–	Sol	–	–	–	Sol
<i>G. odoratum</i>	–	–	–	Sol	–	–
<i>Geranium wilfordii</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Gymnocarpium jessoense</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Hemerocallis middendorffii</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Hylomecon vernalis</i>	Sol	–	–	Sol	Sol	Sol
<i>Hypopitys monotropa</i>	–	–	Sol	–	–	–
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Sol	–	–	–	–	Sol
<i>Lamium barbatum</i>	Sol	–	–	–	Sol	–
<i>Leptorumohra amurensis</i>	–	–	Sol	Sol	Cop1	Sp-cop1
<i>Ligularia fischeri</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Lilium pensylvanicum</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Liparis japonica</i>	–	–	–	–	–	Un
<i>Lunathyrium pycnosorum</i>	Sol	–	–	–	Sol	–
<i>Lysimachia davurica</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Maianthemum bifolium</i>	Sol	–	Sol	Sol	–	Sol
<i>M. dilatatum</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Sol	–	–	–	–	Sp-cop1
<i>Melica nutans</i>	–	Sol	–	–	–	Sol
<i>Menispermum dauricum</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Mitella nuda</i>	–	–	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Neomolinia mandshurica</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Onoclea sensibilis</i>						Sp
<i>Orthilia secunda</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>Osmorhiza aristata</i>	Sol	–	–	–	Sol	–
<i>Osmundastrum asiaticum</i>	–	–	–	–	Sol	Sp
<i>Oxalis acetosella</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Podocarpium mandshuricum</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Polypodium sibiricum</i>	–	–	–	Sol	–	–
<i>Pseudostellaria sylvatica</i>	–	–	–	–	Sol	Sol
<i>Pterocypselia raddeana</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Pyrola rotundifolia</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Rabdosia excisa</i>	–	Sol	–	–	Sol	–
<i>Ranunculus repens</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Rubia cordifolia</i>	Sol	Sol	Sol	–	Sol	Sol

Вид	Обилие на пробных площадях					
	1-2016	2-2014	2-2013	1-2013	1-2014	3-2014
<i>Sanicula rubriflora</i>						Sol
<i>Saussurea neopulchella</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Schizopepon bryoniifolius</i>	Sol	–	–	–	–	Sol
<i>Scutellaria ussuriensis</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Sedum aizoon</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Serratula manshurica</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Smilacina hirta</i>	Sol	–	–	–	–	–
<i>Stellaria bungeana</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>S. longifolia</i>	–	–	–	–	Sol	–
<i>S. radians</i>	–	–	Sol	–	–	–
<i>Syneilesis aconitifolia</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Synurus deltoides</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Thalictrum contortum</i>						Sol
<i>Th. filamentosum</i>	Sol	–	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Truellum thunbergii</i>	–	–	–	–	–	Sol
<i>Urtica angustifolia</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>U. laetevirens</i>	–	–	–	–	–	Sp
<i>Valeriana fauriei</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Veratrum oxysepalum</i>	Sol	–	–	–	Sol	Sol
<i>Veronicastrum sibiricum</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Vicia amurensis</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Vincetoxicum acuminatum</i>	–	Sol	–	–	–	–
<i>Viola selkirkii</i>	–	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
<i>Waldsteinia ternata</i>	–	–	–	–	Sol	Sol

В травяном ярусе также представлены общие виды для ельников и кедровников: мителла голая, кислица обыкновенная, майник широколистный. Помимо перечисленных видов растут еще ветровочник дальневосточный, осока кривоноса, сердечник белоцветковый, чистотел азиатский, двулепестник альпийский, ландыш Кейске, энемион Радде, бахромчатолепестник лучистый, бокоцветка однобокая, хвостосемянница остистая, фрима азиатская, купена низкая, звездчаточка лесная, вальдштейния тройчатая, прутьевик вырезанный, марена сердцелистная, звездчатка длиннолистная, василистник нитчатый, валериана Фори, чемерица остро-дольная, фиалка Селькирка.

Обследованный кедрово-елово-тисовый с лиственными породами лес входит в реликтовую формацию полидоминантных широколиственных влажных лесов (Колесников, 1956), образованную многочисленными видами лиственных и хвойных пород, при обязательном участии ореха маньчжурского и ильма лопастного. Для этих лесов также характерны наличие лиан и присутствие реликтовых растений, таких как хвостосемянница остистая и кониограмма средняя. Подобный

лес является дериватом многопородных тургайских лесов и может быть отнесен вслед за Н.Г. Васильевым (1964, 1977), П.В. Крестовым (1993а, б), П.В. Крестовым и В.П. Верхолат (2003) к категории уникальных лесов. Описанное сообщество характеризуется устойчивыми позициями тиса, представленного несколькими поколениями.

При обследовании лесов национального парка «Удэгейская легенда» были встречены редкие и охраняемые сосудистые растения в кедрово-широколиственных и дубовых лесах. Видовое разнообразие редких и охраняемых растений в разных типах леса неодинаково (табл. 60).

Таблица 60. Характеристика мест нахождения редких и охраняемых видов растений

Тип леса	Местоположение, рельеф, высота над уровнем моря, координаты	Вид
Кедровник с липой и дубом лещинный	Правый берег р. Большая Уссурка, Николаев ключ, левый борт, средняя часть 3 склона, 548 м, 45°47.471'с.ш., 135°25.752' в.д.	<i>Cephalanthera longibracteata</i> , <i>Coniogramme intermedia</i> , <i>Taxus cuspidata</i> , <i>Paeonia obovata</i> , <i>Galium paradoxum</i>
Кедровник с желтой березой разнокустарниково-кониограммовый	Правый берег р. Большая Уссурка, Николаев ключ, правый борт, средняя часть В склона, 312 м, 45°47.224'с.ш., 135°24.998' в.д.	<i>C. intermedia</i> , <i>Phyllitis japonica</i> , <i>T. cuspidata</i> ,
Кедровник с липой и дубом кленово-лещинный папоротниково-разнотравный	Правый берег р. Большая Уссурка, Ю-В склон (выше дороги Островной ключ – КПП 1), 357 м, 45°47.213' с.ш., 135°18.043' в.д.	<i>C. longibracteata</i> , <i>Cypripedium macranthon</i>
Дубняк с березой даурской разнокустарниково-травянистый	Правый берег р. Большая Уссурка, КПП 1 «Корейский», нижняя и средняя часть Ю, Ю-В, Ю-З и С-З склонов 240–485 м, 45°45.659' с.ш., 135°21.007' в.д. – 45°45.283' с.ш., 135°22.185' в.д.	<i>C. longibracteata</i> , <i>Cypripedium calceolus</i> , <i>C. macranthon</i> , <i>Cypripedium ventricosum</i> , <i>Paeonia lactiflora</i> , <i>P. obovata</i>
Дубняк леспедецевый	Правый берег р. Большая Уссурка, КПП 1 «Корейский», нижняя часть Ю склона, 250–260 м, пр. пл. 1-2004, 45°45.163' с.ш., 135°22.010' в.д.	<i>C. calceolus</i> , <i>C. macranthon</i> , <i>P. lactiflora</i> , <i>P. obovata</i>
Кедровник долинный с ильмом и ясенем разнокустарниково-папоротниково-разнотравный	Правый берег р. Большая Уссурка, руч. Чистый, надпойменная терраса, пробная площадь 3-2014, 255–265 м, 45°44.987' с.ш., 135°29.214' в.д.	<i>Liparis japonica</i>
Кедровник с березой желтой разнокустарниковый	Левобережье р. Большая Уссурка, Трофимов ключ, С-В, С склоны, 346–511 м, 45°38.476' с.ш., 135°21.161' в.д.,	<i>C. intermedia</i> , <i>T. cuspidata</i> , <i>G. paradoxum</i>

Тип леса	Местоположение, рельеф, высота над уровнем моря, координаты	Вид
Кедровник с липой и дубом кленово-лещинный папоротниково-разнотравный	Водораздел р. Большая Уссурка и ключа Ковалевский, Ю-В склон, 323 м, 45°47.195' с.ш., 135°18.034' в.д.	<i>C. macranthon</i> , <i>P. obovata</i> , <i>T. cuspidata</i> , <i>C. longibracteata</i>
Кедрово-широколиственный лес с елью, пихтой и тисом разнокустарниково-папоротниково-разнотравный	Левобережье р. Большая Уссурка, Лев. Михайловский ключ, 220–270 м, 45°45.134' с.ш., 135°19.345' в.д.,	<i>T. cuspidata</i>
Кедрово-елово-тисовый лес с лиственными породами разнокустарниково-папоротниково-разнотравный	Ковалевский ключ, С, С-В склоны, 271–320 м н.у.м., 45°47.048' с.ш., 135°19.486' в.д.; С склон 300–310 м, 45°47.224' с.ш., 135°19.460' в.д.; нижняя часть С-З склона, 250–340 м, 45°47.243' с.ш., 135°19.112' в.д.	<i>T. cuspidata</i> , <i>P. obovata</i> , <i>C. intermedia</i> , <i>G. paradoxum</i>
Кедрово-елово-тисовый лес с ясенем и березой желтой папоротниково-разнотравный	Левобережье р. Большая Уссурка, Яков ключ, выположенная часть С-В склона, 270–295 м, 45°46.092' с.ш., 135°25.427' в.д.	<i>T. cuspidata</i> , <i>P. obovata</i>
Долинный широколиственно-кедровый лес	Правобережье р. Лесовозная, надпойменная терраса, 260–270 м, 45°40.508' с.ш., 135°30.638' в.д.	<i>P. obovata</i>
Кедрово-лиственничный лес	По пониженным слабоденированным участкам надпойменных террас долины р. Большая Уссурка, ключ Пасечный район темных озер, 247 м, 45°42.818' с.ш., 135°29.6074' в.д.	<i>Iris laevigata</i>
Кедрово-еловый лес с лиственницей	Бассейн р. Малая Пихтовка	<i>Galearis cyclochila</i>

Мы дали краткий обзор лесных формаций, представленных в национальном парке «Удэгейская легенда», предстоит дальнейшая работа по обследованию современного состояния лесов парка. Леса национального парка, главным образом кедрово-широколиственные, в большинстве своем малонарушенные, таких лесов на территории Приморского края практически не осталось, они сохранились только на особо охраняемых природных территориях края. Поэтому очень важны дальнейшие мониторинговые наблюдения за их состоянием. Необходимо продолжить изучение популяционной структуры редких реликтовых растительных сообществ с тисом на территории национального парка «Удэгейская легенда».

ГРИБЫ

Грибы присутствуют практически во всех растительных сообществах. Призывы основоположника отечественной микологии и фитопатологии А.А. Ячевского изучать грибы как компоненты лесных фитоценозов прозвучали еще в 1922 г. и нашли своих многочисленных сторонников (Шенников, 1943; Частухин 1945, 1948; Частухин, Николаевская, 1969; Шемаханова, 1962; Васильева, Назарова, 1967; Черемисинов и др., 1970; Смицкая, 1975; Томилин, 1977; Шубин, 1988; Цирюлик, Шевченко, 1989; Богачева, 1998; Гапиенко, 2004; Стороженко, 2012). Согласно В.Н. Сукачеву, биогеоценоз – это «совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими явлениями природы, представляющая собой внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном движении, развитии» (Сукачев, 1945). С развитием научных знаний перечень слагающих его компонентов вполне закономерно дополнился миром грибов «как звеном и условием обеспечения равновесия живого и мертвого» (Кузмичев, 2007). Для комплексного использования и управления жизнью лесных биогеоценозов, изменения их в интересах человека и тем более природоохранных мероприятий надо знать процессы, происходящие во всех их структурах. Недостаточная изученность «грибного компонента» грозит приведением в действие его мощного разрушающего потенциала.

При изучении микобиоты различных районов, в том числе и территории национального парка, мы пришли к выводу о важности участия и роли всех слагающих ее видов в биогеоценозе. Нами выделены шесть основных функций грибов в жизнеобеспечении растительных сообществ. Рассмотрим их на примере одной из групп сумчатых грибов – дискомицетов, отмеченных в «Удэгейской легенде».

Грибы как деструкторы, утилизаторы растительных остатков

Дискомицеты в биогеоценозе играют роль деструкторов, утилизаторов растительных остатков. По специфическому характеру трофических отношений это типичные сапротрофы, развивающиеся на почве, в выгоревших местах или старых кострищах, экскрементах животных, на валежных ветках или листовом опаде, хвое, коре валежных стволов деревьев или голой древесине. Роль грибов как деструкторов различных растительных остатков в биоценозе, по нашему мнению, одна из основополагающих. Дальневосточные леса, особенно в южной части региона, характеризуются высокой скоростью накопления подстилки. Это в широком смысле, многокомпонентная система, дифференцированная по степени разложения и составу. Верхний слой подстилки представляет собой смесь перезимовавшего листового и веточного опада древесных, кустарниковых и травянистых растений. На листовом опаде прошлого года на территории парка нами обнаружено 7 видов сумчатых грибов. Это в основном представители рода *Hymenoscyphus* Gray.

Их небольшие, от 1 до 5 мм в диаметре, плодовые тела можно встретить повсеместно в верхних слоях подстилки на остатках листовых пластин широколиственных древесных пород. Характерным признаком этих грибов является формирование на одном субстрате по нескольку мелких плодовых тел. Более крупные аскомы (научное название плодовых тел сумчатых грибов) вряд ли успешно развились на столь незначительном по запасу пищевых ресурсов объекте.

Нижний слой подстилки состоит из растительных остатков, уже отчасти утративших свою структуру. С увеличением деструкции листового опада меняется видовой состав ее грибного населения. Для этих грибов характерно формирование одиночных плодовых тел до 250 мм высотой и 100 мм в диаметре. Иногда на конгломерате из остатков листвы разросшаяся грибница образует по нескольку аском одновременно. Их форма сильно варьирует – от уховидных у представителей рода *Otidea* (Pers.) Bonord. и *Wynnea* Berk. et M.A. Curtis, чашевидных – у *Pachyella* Boud. и *Microstoma* Bernstein до седловидных и складчатых – у *Helvella* L. и *Leotia* Pers. В различных растительных сообществах парка нами отмечено 12 видов таких грибов, включая способных развиваться и на лесной почве.

В естественном распаде древесины, осуществляемом гетеротрофами, особое место принадлежит дереворазрушающим грибам. Замечено, что разложение древесины в природных условиях проходит поэтапно, в зависимости от экологической и биохимической природы субстрата. Что касается утилизации веточного опада и валежной древесины, то, по нашим наблюдениям, дискомицеты осуществляют первую стадию их разложения. В этом заключается их роль в деструктивном процессе – подготовка субстрата в ряде случаев к заселению его базидиальными грибами.

Еще одно наблюдение за развитием и расселением сумчатых грибов заключается в следующем: выбор древесины определяет степень её деструкции: на начало разложения и завершающую его стадию приходится, по нашим наблюдениям, максимум участия дискомицетов. Во время заключительной стадии главная роль переходит к кортикофильным видам, которые поселяются на коре упавших стволов и ветвей деревьев. Обладая всем необходимым набором ферментов, они довершают процесс деструкции самых трудно разлагаемых элементов растительного опада.

В результате наблюдений в природе у нас возникло предположение о том, что на валежных ветвях и деревьях поселяются грибы, ведущие сапротрофный образ жизни. Грибы, обнаруженные на живых или сухостойных деревьях, поднимающиеся по стволам на высоту до полутора метров, могут переходить на паразитарный образ жизни и вызывать гибель растения при ослаблении его сопротивляемости, т.е. являются оппортунистическими патогенами. При отмирании дерева переходят на сапротрофный тип питания, используя уже мертвое органическое вещество. Из наиболее характерных для изученной территории базидиальных ксилосапротрофов можно отметить *Rhodofomes cajanderi*, *Heterobasidion orientale*, *Daedaleopsis sinensis*, *Dentocorticium pilatii*, *Lenzites betulinus*, *Picipes badius*, *Trametes versicolor*, *Stereum ostrea*. Они встречаются на сухостойных и валежных деревьях различных пород, пнях и веточном опаде.

В лесах с благоприятными почвенно-грунтовыми и гидротермическими условиями (широколиственные и хвойно-широколиственные) количество дереворазрушающих грибов максимально. Процессы гниения древесины здесь протекают особенно интенсивно, частота встречаемости многих видов грибов очень большая, и плодовые тела их достигают обычно наиболее крупных размеров. В пределах Дальневосточного региона наиболее благоприятные гидротермические условия для развития грибов сложились в Приморье, которое отличается богатым составом дендрофлоры и, следовательно, большим разнообразием субстратов. Видовой состав грибов на различных лиственных породах нередко перекрывается, на них поселяется много общих видов, в отличие от грибов на хвойных породах. Для лиственных пород деревьев характерны разнообразие видов и одновременное развитие целого ряда видов грибов на одном и том же стволе. Надо заметить, что грибы на хвойных породах более специализированы. На древесине отдельного хвойного растения, его коре, ветвях или хвое, как правило, поселяются 1, реже 2 вида дискомицетов.

Установлена зависимость расселения дереворазрушающих грибов от размеров субстрата. Наибольшее число их отмечается на стволах среднего диаметра (11–20 см). На тонких жердях грибы не могут пройти весь цикл своего развития и не дают плодоношения. Однако дискомицеты, в отличие от трутовых и большинства агариковых, поселяются и «плодоносят» как на крупных, так и на мелких стволах, что делает их особенно опасными для подроста любых пород. Скорость разложения древесины намного повышается при ее горизонтальном положении в пространстве.

Мониторинговые работы, проведенные нами на территории нескольких природоохранных резерватов, в том числе и «Удэгейской легенды», показали, что существует смена состава микобиоты, обусловленная различными причинами. Сезонная смена плодоформирования деструктивных дискомицетов выражена неярко. Более заметно влияние климатических характеристик вегетационного периода. Циклическую смену, обусловленную биологическими ритмами грибов, выявить труднее. На отмеченных территориях нами исследована смена видового состава дискомицетов после пожаров, рубок на вновь присоединенных к охраняемой зоне участках. В процессе лесовосстановления дискомицеты – активные участники. Замечено, что в молодых вторичных лесных сообществах среди деструкторов преобладают филлофильные и напочвенные виды. В старовозрастных лесах комплекс деструкторов значительно пополняется дереворазрушающими и гербофильными грибами. Климатическое сообщество характеризуется невысоким видовым разнообразием дискомицетов и паритетным участием всех экогрупп.

Микоризообразующие грибы как условие усиления конкурентоспособности высших растений в борьбе за минеральные вещества

Микоризообразующие грибы призваны усиливать конкурентоспособность высших растений в борьбе за минеральные вещества, вступая с ними в симбиотические связи. Они не облигатно симбиотрофны, и в отсутствие растения-симбионта

или благоприятных условий они функционируют как сапротрофы. Исключением являются виды семейства Tubercaceae. Эти грибы – облигатные микоризообразователи с дубами. Замечено, что в лесных сообществах, находящихся в оптимальных для деревьев условиях местообитания, микоризообразователи меняют свой тип питания на сапротрофный. Наличие легкодоступного минерального питания, очень высокая или низкая влажность, затенение или наличие растений, подавляющих развитие микориз за счёт выделяемых ими бактерицидных веществ, угнетают микоризоформирование. Дискомицеты, способные вступать в симбиоз с высшими растениями, встречаются в небольшом количестве почти во всех биоценозах парка. Это представители семейств Helvellaceae и Pezizaceae. Некоторые виды эдафотрофных грибов образуют эктотрофную микоризу с хвойными и лиственными древесными растениями. Например, у гриба *Peziza badia* отмечена связь с елями, *Helvella crispa* – с тополями (Шубин, 1988). Последний вид в широколиственных лесах зачастую можно встретить рядом с дубами.

В настоящее время сложилось два представления относительно явления симбиоза грибов и растений. Одни авторы рассматривают его как мутуалистический паразитизм, в основе которого лежат предположение о нападении гриба на растение и выработка со стороны последнего защитных реакций, контролирующей развитие гриба (Цирюлик, Шевченко, 1989). Другие считают, что здесь имеет место мутуалистический симбиоз, где сапротрофный гриб для увеличения своей конкурентоспособности среди почвенных микроорганизмов за питательные вещества вынужден вступать в сожительство с растениями (Danielson, 1984; Каратыгин, 1993).

Некоторые исследователи полагают, что микосимбиотрофизм высших растений – явление чрезвычайно распространенное и является правилом, а не исключением (Селиванов, 1981). Есть также мнение, что в лесных сообществах, находящихся в оптимальных для деревьев условиях местообитания, микоризообразователи меняют свой тип питания на сапротрофный. Наличие легкодоступного минерального питания, очень высокая или низкая влажность, затенение или наличие растений (степных), подавляющих развитие микориз за счёт выделяемых ими бактерицидных веществ, угнетают микоризоформирование (Шемаханова, 1962; Шубин, 1988). Судить об этом можно лишь категориями вероятности, поскольку очень трудно определить, гифы какого гриба оплели покровную ткань окончаний молодых корней и проникли в межклетники. В последнее время появились работы, в которых предложен метод определения конкретного вида гриба-симбионта по ДНК (Weber, Bresinsky, 1992; Vujanovic, Brisson, 2002). Микоризообразующие дискомицеты, скорее всего, необлигатно симбиотрофны, в отсутствие растения-симбионта или благоприятных условий они функционируют как сапротрофы. Следовательно, способны образовывать плодовые тела наравне с симбиотрофным типом питания – сапротрофно (т.е. без связи с корнями деревьев).

Среди афиллофоровых грибов «Удэгейской легенды» выявлено шесть симбиотрофов. Наиболее часто встречается *Hudnum repandum*, способный образовывать эктомикоризу как с хвойными, так и с лиственными деревьями. Также нередко

на территории парка были встречены *Amanita pantherina*, *A. virosa*, *Cantharellus cibarius*, *Coltricia perennis*, *Craterellus cornucopioides*, *Lactarius azonites*, *L. volemus*, *Suillus spraguei*, *Ramaria araiospora*, *Thelephora palmata*, *Tylophilus rubrobrunneus* и различные виды *Russula* и *Inocybe*.

Грибы как возбудители заболеваний высших растений

Паразитные грибы, поселяясь на живых растениях, ограничивают до некоторой степени их рост, при понижении сопротивляемости способствуют гибели ослабленного организма и в конечном итоге утилизируют его отмершие останки. Сохранение лесных массивов, уменьшение порчи деловой древесины – основная забота всех лесных служб разных стран. Однако большинство работ посвящено вредному воздействию трутовых и агариковых грибов на деловую древесину и древесные породы в естественных условиях.

Грибы, развивающиеся на хвойных, вероятно, не имеют строгой привязки к определенным видам и даже родам растений. Замечено, что, в отличие от видов грибов, поселяющихся группами по несколько видов на одном широколиственном древесном растении, на хвойных развивается одновременно только один вид. Возможно, это объясняется наличием патогенности у единолично развивающегося гриба. В свою очередь, сапротрофные дискомицеты более терпимы к наличию разновидовых грибниц на одном отдельном субстрате. По широте видового разнообразия грибов, поселяющихся на древесных растениях хвойных пород, по нашим наблюдениям, несомненным лидером является пихта.

Явление паразитизма как один из вариантов взаимодействия грибов и растений присуще огромному числу видов грибов из различных систематических групп. Долгое время считалось, что подобные виды дискомицетов – это оппортунистические патогены, поражающие только ослабленные растения и ведущие после его отмирания сапротрофный образ жизни. Вследствие этого почти не было известно работ о паразитарной деятельности дискомицетов, о взаимодействии их с растениями. Однако последующие немногочисленные исследования циклов развития дискомицетов и выявление более полного их видового разнообразия заставляют более серьезно воспринимать их способность вызывать различные заболевания (Аблакатова, 1965; Мухина, 1986; и др.). В ряде случаев вспышки развития патогенных дискомицетов признаются фитопатологами как эпифитотии.

Возникшая в Европе с начала века эпифитотия некроза ветвей ясеня поставила под угрозу существования деревообрабатывающую промышленность многих стран. Это важная фитопатологическая проблема побудила нас начать детальные исследования распространения и развития гриба *Hymenoscyphus fraxineus* на Дальнем Востоке. В регионе, в Китае и на своей родине в Японии гриб абсолютно безвреден (Zhao et al., 2012; Zheng, Zhuang, 2013). По нашим данным, он единично встречается практически на всем дальневосточном ареале ясеня. Гриб *Hymenoscyphus fraxineus*, в недавнем прошлом считающийся типичным сапротрофным видом, формирует небольшие аскомы на прошлогодних опавших черешках листьев ясеня в подстилке. Успешное развитие и распространение вида

сопряжены с обильными летними осадками, высокой влажностью почвы и низкой температурой воздуха. Патогенными свойствами обладает конидиальная стадия этого гриба. Признаки ее развития на отдельных растениях были зафиксированы нами на всей исследуемой территории. Первоначально появляются некротические пятна на листьях и отдельных небольших ветвях растения. Постепенно увеличиваясь в размерах, принимая вид вытянутого овала, вызывают преждевременную потерю листвы и отмирание небольших ветвей в вершинной части. За один вегетационный период у молодых деревьев (5–10 лет) наблюдается только угнетенное состояние. У старовозрастных деревьев видимые симптомы наблюдаются после нескольких сезонов инфекции. Надо заметить, что летального исхода не было нами отмечено ни у молодых, ни у старых особей, в отличие от древостоев в европейской части континента.

Территория парка – сложная структура ландшафтов с хорошо выраженной вертикальной поясностью. Нами установлено, что наиболее заселены грибами леса нижнего высотного пояса. В значительной степени поражаются древесные растения, произрастающие на переувлажненных, слабо дренированных участках речных долин, а также ослабленные пожаром. Высокогорные ельники, каменно-березники, заросли кедрового стланика заселены незначительно.

В большей степени поражаются деревья, произрастающие на переувлажненных, слабо дренированных участках речных долин. Так, на 1–2-летних побегах древовидных ив, заселяющих речные косы, массово встречается гриб *Hymenoscyphus salicellus*. Последний, по всей вероятности, вызывает некроз ветвей. Желуди в подстилке при избыточном ее увлажнении и повышенной температуре поражаются грибами *Ciboria batschiana* и *Hymenoscyphus fructigenus*. Последний был часто встречен в прибрежных дубовых лесах р. Большая Уссурка.

Как известно, грибы имеют в цикле своего развития анаморфную (конидиальную) стадию. Большинство микологов полагает, что заражение растения происходит именно конидиями (Wallwork, 1987; Wallwork, Spooner, 1988; Pfister, 1993, 1994, 1995; Pfister, Liftik, 1995; Verkley, 1999). Однако недостаточность исследований в данной области не позволяет ни принять, ни опровергнуть данное утверждение. На погибших растениях зачастую обнаруживают как анаморфную, так и телеоморфную стадии развития гриба. У дискомицетов, вступающих с древесными растениями в паразитические отношения, по всей вероятности, увеличивается анаморфная стадия, а телеоморфная (сумчатая) встречается значительно реже. Во многих случаях паразитный образ жизни связан с увеличением значения анаморфы в цикле развития. Например, у гриба *Dermea cerasi*, отмеченного в заповеднике «Кедровая Падь» еще в 1957 г. А.А. Аблакатовой на живых частях вишни Максимовича, паразитирует анаморфа *Foveostroma drupacearum* (Lév.) DiCosmo, а аскомы появляются только на мертвых и опавших листьях, когда для них наступают исключительно благоприятные условия. На территории парка он пока не обнаружен.

Постоянные попутчики хвойных древесных растений – *Plectania melastoma* и *Scutellinia scutellata*, скорее всего, в анаморфной стадии обладают патогенностью.

Создавая биотрофные ассоциации со всходами, они могут вызывать задержку роста или гибель семян и проростков, формируя апотеции на уже мертвой древесине и хвое.

На территории парка выявлено шесть факультативных патогенных сапротрофов из группы афиллофоровых грибов, которые начинают свое развитие на живых деревьях и продолжают расти на свежем сухостое и пнях. Это *Sparassis latifolia*, *Phellinus yamanoi*, *Fomitopsis pinicola*, *Ganoderma applanatum* и *Aleurodiscus disciformis*. Также обнаружены редкие грибы – *Ganoderma carnosum*, встречающийся на хвойных породах, чаще всего на пихте, и *Hericium erinaceus*, характерный для дубовых лесов, вызывающий стволовую гниль дуба. Последний занесен в Красную книгу Приморского края (2008). Его образец был собран нами один раз на территории кордона «Корейский». *Sparassis latifolia* также включен в Красную книгу Приморского края, но под другим видовым названием – *S. crispa* (Wulfen) Fr. В соответствии с современными данными установлено, что восточно-азиатские образцы относятся к *S. latifolia* и отличаются от европейского вида *S. crispa* как морфологически, так и молекулярными данными (Dai et al., 2006). *S. latifolia* характеризуется широкими, рассеченными и слегка искаженными флабеллами. Этот вид широко распространен в Восточной Азии в хвойных и хвойно-широколиственных лесах, поражая основания стволов и корни деревьев. На территории парка он встречен единожды в устье р. Арму на корнях кедра.

Копротрофные грибы как утилизаторы продуктов жизнедеятельности организмов

Ряд видов дискомицетов выступает как утилизатор продуктов жизнедеятельности травоядных, хищных, грызунов и птиц, населяющих растительные сообщества. Копротрофные грибы на Дальнем Востоке и в России в целом были уже довольно детально изучены. Биохимическая неоднородность и богатство субстрата органическими веществами определяют широкий спектр грибов, обладающих нежными плодовыми телами и короткой телеоморфной стадией. С растительными ценозами копротрофы связаны опосредованно. На сегодняшний день в Дальневосточном регионе зарегистрировано 54 вида, но на территории парка найти их нам еще не удалось.

Роль утилизаторов продуктов жизнедеятельности организмов, в том числе и человека, выполняют и некоторые виды дискомицетов, развивающиеся на техногенных остатках (бумага, картон, ткань, штукатурка и т.д.). Такие грибы, как *Coprobria granulata*, *Peziza repanda*, *Pyronema domesticum*, *Sphaerosporella hinnulea*, *Tricharina gilva*, являются характерными рудеральными видами.

Карбоникольные грибы как условие успешного заселения послепожарных территорий

Одна из немаловажных функций дискомицетов – подготовка к заселению растениями послепожарных территорий. Карбоникольные дискомицеты успешно распространяются по Дальневосточному региону вслед за многочисленными ежегодными пожарами. Пожарища, представляющие собой смесь минеральных

частиц почвы с обуглившимися остатками древесины, являются для таких грибов богатой питательной средой. Послепожарное заселение дискомицетов из родов *Fimaria* (*F. cervaria*), *Geopyxis carbonaria*, *Lamprospora* (*L. schroeteri*), *Peziza* (*P. furfuracea*, *P. natrophila*, *P. verrucosa*, *P. violacea*), *Pulvinula* (*P. cinnabarina*), *Pyronema* (*P. omphalodes*), *Rhodotarzetta* (*R. rosea*) и др. обеспечивает последующее развитие на данном месте базидиальных макромицетов (Wicklow, Hirschfield, 1979). В конечном итоге, поселяясь на старых выгоревших местах, дискомицеты подготавливают их для поселения там других организмов, в частности высших растений. Количество обнаруженных карбоникольных видов может являться естественным индикатором антропогенного давления на исследуемую территорию.

Карбоникольные (пирофильные) грибы распространяются по территории Дальнего Востока вслед за многочисленными кострищами и ежегодными пожарами. Существуют свои особенности формирования подстилки на первых послепожарных стадиях (Громыко, Громыко, 2005а, б). Они, в свою очередь, определяют изменения в представленности видов дискомицетов. Первые два года основу комплекса составляют виды, поселяющиеся на обугленных растительных остатках. В структуре подстилки превалирует верхний ее слой из опада прошлого года со своим набором деструкторов. Активно зарастают лиственницей и мелколиственными бывшие гари. Старые лесосеки покрыты березовыми, осиновыми и дубовыми лесами, под пологом которых уже сформировался ярус кедрового, елового или пихтового молодняка. Все это находит отражение в составе микобиоты – значительное количество лигнофильных видов со слабо выраженной приуроченностью к определенным древесным породам. Скорее всего, узкоспециализированные виды грибов характерны для более зрелых лесных сообществ. Опосредованно идет процесс формирования грибных ассоциаций: от видов, развивающихся на смеси золы и почвы, до видов, ассоциированных с пионерными древесными растениями. Таков, по нашему мнению, общий алгоритм освоения послепожарных территорий. Естественно, что на конкретной территории существуют свои особенности заселения.

Напочвенные грибы как важный компонент почвообразовательного процесса

Напочвенные дискомицеты представляют собой важный компонент гетеротрофного блока сообществ почвенных организмов. Их роль в почвообразовательном процессе и жизни почвенной микобиоты и высших растений основополагающая (Кириленко, 1978; Дурынина, Великанов, 1984; Егорова, 1986; Лугаускас и др., 1987; Лугаускас, 1988; Великанов, Сидорова, 1988; Мирчинк, 1988; Бабьева, Зенова, 1989; Марфенина, 1991; Терехова, 2007). Дискомицеты среди них занимают сравнительно скромное место. Это в основном все гумусо-подстилочные дискомицеты. На территории парка нам удалось найти около 20 видов таких грибов. С их участием идут, по всей вероятности, био- и геохимические процессы

разрушения горных пород и минералов, оструктурирования почвы, утилизации растительных остатков и формирования почвенного перегноя, что поставляет в почвообразование органические кислоты. Основную же роль в этом, несомненно, играют несовершенные грибы (анаморфные стадии). Более 100 видов их было выделено из почвенных проб, взятых в различных растительных сообществах парка. Из почвенных базидиальных сапротрофов здесь обычны *Agaricus placomyces*, *Agrocybe pediades* и *Hygrocybe cantharellus*. Наиболее часты разрушители лесной подстилки – грибы из родов *Clitocybe*, *Marasmius* и *Gymnopus confluens*.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что показанная роль дискомицетов как одних из главных связующих и уравнивающих участников в жизнедеятельности растительных сообществ выполняется и остальными представителями «царства грибов». Они перерабатывают накопленную автотрофными и гетеротрофными организмами энергию, используя ее для динамичного развития биогеоценоза. Грибы тесно связаны с окружающей растительностью, обнаруживая видоспецифичность в выборе субстрата, проявляют себя как деструкторы живого, так и мертвого. Вступая в симбиотические связи с высшими растениями, они обеспечивают их успешное развитие, а заселяя послепожарные территории, подготавливают их для последующего развития на данном месте высших растений.

Большинство видов эврибионтны по отношению к одним экологическим факторам и стенобионтны по отношению к другим. Характер осадков, их количество, химизм, тепловой режим существенно корректируют процессы развития гриба и его жизнедеятельности. Для сапротрофов, развивающихся на почве и подстилке, определяющим является эдафический фактор, характеризующий субстрат. Включенные в него показатели теплового режима, влажности, физических и химических свойств подстилки и почвы обуславливают качественный и количественный состав этой группы. Для симбиотрофов и паразитов биотические факторы играют более существенную роль.

Видовой состав микобиоты парка изучен нами по авторским сборам в вегетационные периоды 2010–2017 гг. На полевых работах от методики сбора во многом зависит полнота выявления видового состава исследуемых районов (Василевич, 1969). Для репрезентативности видов, характеризующих изучаемые сообщества, были установлены объективные границы исследования каждого из них. Построены графики зависимости накопленного числа видов от увеличения обследуемой территории. Характеристические кривые показали минимальную площадь, содержащую репрезентативное количество видов грибов для отдельно взятого сообщества. Так, например, для их поиска в полидоминантном разнорусном древостое с кустарниково-травяным подлеском, осложненным рельефными особенностями и наличием различного рода водотоков, требуется охват значительно большей площади, чем для сухого монодоминантного сообщества с бедным подлеском. Однако этот метод, как показала практика, не совсем корректен при

исследовании высших грибов. Многие микологи определили ритмы в развитии и формировании плодовых тел у макромицетов (Васильева, Назарова, 1967; Шубин, 1988; Перова и др., 2003). Мы тоже отмечали, что плодоформирование у некоторых видов происходит не ежегодно. Это обуславливается как климатическими условиями каждого вегетационного периода, так и, вероятно, онтогенетическими особенностями вида.

Мелкие плодовые тела мало заметны, и бросаются в глаза лишь немногие виды. Подавляющее большинство видов ведет более или менее скрытный образ жизни в слое лесного опада или под покровом зарослей крупнотравья. Поэтому нами тщательно обследовались места скопления их потенциальных субстратов – листовой опад, крупные и мелкие древесные остатки (бревна, старые пни, трухлявые ветки, отмершая кора, сухостой), кора живых деревьев и крупных кустарников, влажные подушки печеночных и листостебельных мхов на скалах и валеже, выветрившийся помет растительноядных животных и др. При этом пользовались 4- и 7-кратными лупами, чтобы заметить грибы с самыми маленькими плодовыми телами, которые у многих видов достигают не более чем 0,3 мм в диаметре. Образцы были высушены как при комнатной температуре, так и при использовании специальных сушилок.

Камеральная обработка собранного материала осуществлялась традиционным методом (Baral, 1987a, b, 1992; Hawksworth, 1974) на базе лаборатории ботаники Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, кафедры микологии биолого-почвенного факультета МГУ (г. Москва) и отдела микологии Института естественных наук Эстонского сельскохозяйственного университета (г. Тарту, Эстония). Морфометрические измерения образцов проводились в 10%-ном растворе едкого калия (КОН), за исключением окрашенных в растворе Cotton blue, с помощью микроскопов Amplival, Nikon Eclipse E200, МБИ-3 и МБИ-11 при увеличении 80–400х, высота орнаментации – при 1600х. Микротехнические исследования осуществлялись по ботаническим методикам (Барыкина и др., 2000). Для более длительного использования препаратов после КОН в препарат добавляли 8% глицерин. Для каждого образца величина спор измерена в 25 повторностях в растворе Cotton blue. Срезы образцов рассматривались в 10% КОН, конго красном (CR). Амилоидность проверялась с помощью реактива Мельцера (MLZ).

В результате проведенных нами исследований впервые выявлен состав микобиоты национального парка «Удэгейская легенда», включающий 406 видов из 78 семейств, 27 порядков, 8 классов, относящихся к 3 отделам царства грибов. В этот перечень вошла группа анаморфных грибов, обитающих в верхних слоях почвы. Таксоны приведены в соответствии с Index Fungorum (<http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp> accepted September 2017). Конспект аннотирован сведениями о типе субстрата, растительном сообществе в месте обнаружения каталожным указателем в случае хранения образца в фонде Дальневосточного регионального гербария (VLA).

Аннотированный список грибов

Царство **Fungi**
 Отдел **Zygomycota**
 Класс **Zygomycetes**
 Порядок **Mucorales**
 Семейство **Mucoraceae**

Absidia caerulea Bainier – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнаягодником колючим, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный; пойма р. Арму, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. et Trotter – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниково-рябинниковый лес; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Absidia glauca Hagem – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный, кедрово-широколиственный лес, ельник с кедром, черемухой и лимонником; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Absidia shinosa Lendn. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осинкой и липой; пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой.

Actinomucor elegans (Eidam.) C.R. Benj. – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Circinella muscae (Sorokin) Berl. et De Toni – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнаягодником колючим.

Gongronella butleri (Lendn.) Peyronel et Dal Vesco – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Mucor circinelloides Tiegh. f. *circinelloides* – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный, кедрово-широколиственный лес, ельник с кедром, черемухой и лимонником, березняк со спиреей, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Mucor hiemalis Wehmer f. *hiemalis* – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнаягодником колючим, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Mucor genevensis Lendner – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Mucor laussanensis Lendn. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнаягодником колючим.

Mucor piriformis A. Fisch. – в почве, пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с тополем, березняк со спиреей, черемухой и рябиной.

Mucor plumbeus Bonord. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнаягодником колючим, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный; пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с тополем, березняк со спиреей, черемухой и рябиной.

Mucor racemosus Fresen. f. *racemosus* – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осиною и липой, ивняк с ольхой и кленом, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Mucor zonatus Milko – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим.

Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником, березняк со спиреей, ивняк с ольхой и кленом, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Zygorhynchus japonicus Komin. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осиною и липой.

Zygorhynchus moelleri Vuill. – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной; протока Староарминская, ивняк с ильмом и ольхой.

Семейство **Choanephoraceae**

Blakeslea trispora Thaxt. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес.

Семейство **Cunninghamellaceae**

Cunninghamella echinulata (Thaxt.) Thaxt. – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Семейство **Thamniaceae**

Helicostylum elegans Corda – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес.

Семейство **Umbelopsidaceae**

Umbelopsis isabellina (Oudem.) W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный.

Umbelopsis ramanniana (Moeller) W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный лес; пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с тополем, березняк со спиреей, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Umbelopsis vinacea (Dixon-Stew.) Arx – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной

и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной; протока Староарминская, ивняк с ильмом и ольхой.

Порядок *Mortierellales*
Семейство *Mortierellaceae*

Mortierella alpina Peyronel – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Mortierella lignicola (G.V. Martin) W. Gams. et Moreau – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный лес; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Mortierella minutissima Tiegh. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, березняк с осиной.

Mortierella polycephala Coem. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный.

Mortierella stylospora Dixon-Stew. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Anamorphic fungi

Acremonium butyri (J.F.H. Beuma) W. Gams – в почве, пойма р. Арму, хвойно-широколиственный лес с кленом, ясенем и ильмом.

Acremonium charticola (J. Lindau) W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Acremonium implicatum (J.C. Gilman et E.V. Abbott) W. Gams – в почве, пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Acremonium roseogriseum (S.B. Saksena) W. Gams – в почве, пойма р. Арму, ивняк с тополем, березняк спиреевый с черемухой и рябиной.

Acremonium rutilum W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом.

Acremonium strictum W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму,

устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой, березняк спиреевый с черемухой и рябиной.

Acrostalagmus luteoalbus (Link) Zare, W. Gams et Schroers – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Aphanocladium album (Preuss) W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Aspergillus flavus Link – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с березой и осокой, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный.

Aspergillus fumigatus Fresen. – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес; пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Aspergillus niger Tiegh. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес с березой осмундово-разнотравный, ивняк с тополем и ольхой; пойма р. Арму, березняк с черемухой и рябиной.

Aspergillus ochraceus G. Wilh. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, березняк с черемухой и рябиной.

Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, березняк с черемухой и рябиной.

Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B. Ellis – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк с тополем и ольхой, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, березняк с черемухой и рябиной.

Arthrobotrys arthrobotryoides (Berl.) Lindau – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес с березой осмундово-разнотравный.

Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником.

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк с тополем и ольхой.

Botrytis pyramidalis (Bonord.) Sacc. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк прибрежный с тростником.

Chrysonilia sitophila (Mont.) Arx – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк с тополем и ольхой.

Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой

и кленом, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и свободноягодником колючим, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой, березняк спиреевый с черемухой и рябиной.

Clonostachys rosea f. *rosea* (Link) Schroers, Samuels, Seifert et W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с березой и осокой.

Clonostachys rosea f. *catenulata* (G.C. Gilman et E.V. Abbott) Schroers – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес.

Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и свободноягодником колючим, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный.

Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес.

Geomyces pannorum (Link) Sigler et J.W. Carmich. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой, березняк спиреевый с черемухой и рябиной.

Gibellulopsis nigrescens (Pethybr.) Zare, W. Gams et Summerb. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный.

Gliocephalotrichum simplex (J.A. Mey) B.L. Willey et E.G. Simmons – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим.

Gliocladium virens J.H. Mill., Giddens et A.A. Foster – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Gliomastix guttuliformis J.C. Br. et W.B. Kendr. – в почве, пойма р. Арму, ивняк с ясенем, ольхой и орешником.

Gliomastix murorum (Corda) W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим.

Humicola grisea Traaen – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare et W. Gams – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Myrothecium roridum Tode – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с тростником, березняк с осиной и липой.

Myrothecium verrucaria Ditm. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Oidiodendron echinulatum G.L. Barron – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес.

Oidiodendron flavum Szilv. – в почве, пойма р. Арму, березняк спиреевый с черемухой и рябиной, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой.

Paecilium lilacinum (Thom) Lunangsa-ard, Nywel-Jones et Samson – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником.

Paecilomyces carneus (Dusche et R. Heim) A.H.S. Br. et G Sm. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Paecilomyces marquandii (Masse) S. Hughes – в почве, пойма р. Арму, березняк спиреевый с черемухой и рябиной. устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой.

Penicillium aculeatum Raper et Fennell – в почве, пойма р. Арму, березняк спиреевый с черемухой и рябиной, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой.

Penicillium aurantiogriseum Dierckx – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и свободнойгодником колючим, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой, березняк спиреевый с черемухой и рябиной.

Penicillium brevicomptum Dierckx – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с березой и осокой; устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Penicillium chrysogenum Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом, широколиственный лес с тополем и ясенем; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Penicillium citrinum Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осиной и липой, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственные; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и свободнойгодником колючим.

Penicillium commune Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с тополем и ясенем.

Penicillium corylophilum Dierckx – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом.

Penicillium decumbens Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с тополем и ясенем, березняк с осиной и липой, ивняк с тростником.

Penicillium diversum Raper et Fennell – в почве, пойма р. Арму, березняк спиревый с черемухой и рябиной, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой.

Penicillium expansum Link – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с тополем и ясенем, березняк с осиной и липой, ивняк с тростником, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес; пойма р. Арму, березняк спиревый с черемухой и рябиной, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный; протока Староарминская, ивняк с кедром, ильмом и ольхой.

Penicillium funiculosum Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с тополем и ясенем, березняк с осиной и липой, ивняк с тростником, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим.

Penicillium glabrum (Wehmer) Westling – в почве, пойма р. Большая Уссурка, широколиственный лес с тополем и ясенем, березняк с осиной и липой, ивняк с тростником.

Penicillium janczewskii K.M. Zalessky – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Красноармейский, ельник разнотравный.

Penicillium lanosum Westling – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, березняк с осиной и липой.

Penicillium palitans Westling – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Penicillium purpurogenum Stoll – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Penicillium roseopurpureum Dierckx – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осиной и липой, ивняк с тростником.

Penicillium sclerotiorum J.F.H. Veuma – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим; березняк с осиной и липой; пойма р. Арму, ивняк с ильмом и ольхой, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Penicillium solitum Westling – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осиной и липой.

Penicillium spinulosum Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим; березняк с осиной и липой, ивняк с ольхой и кленом,

широколиственный лес с тополем и ясенем; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Penicillium thomii Maire – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осинной и липой; пойма р. Арму, ивняк с ильмом и ольхой.

Penicillium waksmanii K.M. Zalessky – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес; пойма р. Арму, ивняк с ильмом и ольхой.

Penicillium vulpinum (Cooke et Masee) Seifert et Samson – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, березняк с осинной и липой.

Phoma humicola J.C. Gilman et E.V. Abbott – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес; пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с ильмом и ольхой.

Scopulariopsis brumptii Salv.-Duval – в почве, пойма р. Арму, ивняк с ильмом и ольхой, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) S. Hughes – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный с елью, кедром, черемухой и лимонником; пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с тополем.

Tolypocladium niveum (Rostr.) Bissett – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк прибрежный с тростником, речной нанос.

Trichocladium asperum Harz – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осинной и липой, ивняк с ольхой и кленом, широколиственный лес с тополем и ясенем; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Trichoderma aureoviride Rifai – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом.

Trichoderma koningii Oudem. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осинной и липой, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес.

Trichoderma viride Pers. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осинной и липой, ивняк с ольхой и кленом, широколиственный лес с тополем и ясенем; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Отдел **Ascomycota**

Класс **Eurotiomycetes**

Порядок **Eurotiales**

Семейство **Trichocomaceae**

Byssochlamys fulva Olliver et G. Sm. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Emericella nidulans (Eidam.) Vuill. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес; устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Eupenicillium javanicum (J.F.H. Веума) Stolk et D.B. Scott – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Eurotium amstelodami L. Mangin – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим.

Eurotium herbariorum (F.H. Wigg.) Link – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Neosartorya fischeri (Wehmer) Malloch et Cain – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим.

Talaromyces flavus (Klocker) Stolk et Samson – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Talaromyces luteus (Zukal) C.R. Benj. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Talaromyces stipitatus Thom – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Talaromyces trachyspermus (Scheer) Stolk et Samson – в почве, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Семейство **Pseudeurotiaceae**

Pseudeurotium zonatum J.F.H. Веума – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный лес, березняк с осинкой и липой, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Pseudogymnoascus roseus (Raiillo) Arpinis – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Порядок **Onygenales**

Семейство **Gymnoascaceae**

Gymnoascus reesii Baran. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободнойгодником колючим, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный лес; пойма р. Арму, широколиственный лес с березой и осокой, ивняк с тополем, березняк со спиреей, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Класс **Lecanoromycetes**
 Подкласс **Ostropomycetidae**
 Порядок **Ostropales**
 Семейство **Stictidaceae**

Stictis radiata (L.) Pers. – на ветвях *Salix sp.*, пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, ивняк, VLA D-3882.

Класс **Leotiomycetes**
 Подкласс **Leotiomycetidae**
 Порядок **Helotiales**
 Семейство **Arachnopezizaceae**

Arachnopeziza cornuta (Ellis) Korf – на древесине лиственного леса, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3920.

Семейство **Dermateaceae**

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. – на древесине *Salix sp.*, пойма р. Арму, пойменный ивняк, на речных завалах, VLA D-3407; на валежной древесине *Betula sp.*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3897; на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3911.

Pezicula rubi (Lib.) Niessl – на прошлогодних стеблях *Rosa acicularis*, пойма р. Большая Уссурка, березняк со спиреей, черемухой и рябиной, VLA D-3387.

Pyrenopeziza benesuada (Tul.) Gremmen – на древесине *Salix sp.*, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3401; на древесине в зоне заплеска, речные завалы, пойма р. Большая Уссурка, VLA D-3423.

Семейство **Helotiaceae**

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Growes et D.F. Wilson – на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3884; пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3919; на древесине *Populus sp.*, окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3845; на валежной древесине *Alnus sp.*, пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3925.

Bisporella citrina Korf et S.E. Carp. – на ветвях *Padus maackii*, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3382; на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3825; на валежной древесине *Alnus sp.*, пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3863, -3918; на валежной древесине *Salix sp.*, пойма р. Арму, ивняк, VLA D-3917.

Bisporella subpallida (Rehm) Dennis – на древесине *Fraxinus mandshurica*, пойма р. Большая Уссурка, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3418.

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf et L.R. Batra – на валежной древесине *Fraxinus mandshurica*, пойма р. Арму, устье

ручья Кожаев, VLA D-3842, -3939; на валежной древесине *Juglans* sp., пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3901; на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3938.

Crocicreas alpinum (Stadelmann) S.E. Carp. – с внутренней стороны коры *Salix* sp., пойма р. Арму, ивняк с тополем, VLA D-3408 (субстрат для вида не характерный).

Crocicreas melanosporum (Rehm) S.E. Carp. – на ветвях *Alnus* sp., пойма р. Большая Уссурка, пойменный лес с ивой, тополем и ольхой, VLA D-3398.

Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. Phillips – на черешках листьев *Fraxinus mandshurica*, в подстилке, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3886; пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3857.

Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis – на черешках листьев различных пород в подстилке, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3883; пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3877; окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3953.

Hymenoscyphus epiphyllus (Pers.: Fr.) Rehm – на листовом опаде, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3388, VLA D-3416; окрестности кордона Корейский, VLA D-3385, VLA D-3393; пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3422.

Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz et Hosoya – на черешках *Fraxinus* sp. в подстилке, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственные, VLA D-3846.

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Fr. – на желудях в подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3830.

Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis – на стеблях сложноцветных, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3847, -3960; пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3849; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3961; на стеблях *Cacalia* sp., пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3872.

Hymenoscyphus humuli (Lasch) Dennis – на прошлогодних стеблях цветковых, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона Корейский, VLA D-3384; пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3870; пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3871; на стеблях *Artemisia* sp., пойма р. Арму, ивняк с тополем, VLA D-3396, на стеблях *Senecio* sp., пойма р. Арму, ивняк, VLA D-3395; на стеблях *Rubus* sp., пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3844.

Hymenoscyphus imberbis (Bull.) Dennis – на тонких ветвях *Betula* sp., пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственные, VLA D-3923.

Hymenoscyphus laetus (Boud.) Dennis – на ветвях *Padus maackii*, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3389.

Hymenoscyphus phyllogenus (Rehm) Kuntze – на черешках листьев разных пород, в подстилке, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3954.

Hymenoscyphus phyllophilus (Desm.) Kuntze – на черешках листьев *Fraxinus mandshurica*, в подстилке, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3858, -3955.

Hymenoscyphus pileatus (P. Karst.) Kuntze – на стеблях сложноцветных, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3826.

Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis – на стеблях сложноцветных, пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3962.

Hymenoscyphus robustior (P. Karst.) Dennis – на вайях папоротников, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, окрестности кордона Корейский, VLA D-3386; пойма р. Арму, устье ключа Красноармейский, ельник разнотравный, VLA D-3420; на стеблях злаковых, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3916; на стеблях злаковых, окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3952.

Hymenoscyphus salicellus (Fr.) Dennis – на валежной древесине *Salix* sp., пойма р. Арму, ивняк, VLA D-3873, -3950; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3949; пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3924.

Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips – на прошлогодних стеблях цветковых, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3380, -3888; пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3417, -3869, -3908; пойма р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3402; на ветвях *Sorbaria sorbifolia*, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3421.

Phaeohelotium epiphyllum (Pers.) Hengstm. – на черешках листьев *Ulmus* sp., пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3921, -3951.

Phaeohelotium vernum (Boud.) Declercq – на валежных ветвях *Populus* sp., пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3887.

Семейство **Hemiphacidiaceae**

Chlorencoelia macrospora F. Ren et W.Y. Zhuang – на валежной древесине *Alnus* sp., пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3885, -3838; на валежной древесине хвойного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3831, D-3913; на валежной древесине *Abies* sp., пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3837; на валежной древесине *Padus* sp., пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3836; на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3841, -3859; на древесине *Populus* sp.,

окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3860; на валежной древесине *Alnus* sp., пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3902.

Chlorencoelia torta (Schwein.) J.R. Dixon – на древесине *Juglans mandshurica*, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3392; на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3834, -3903, -3915, -3942; на валежной древесине *Fraxinus mandshurica*, пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3936.

Chlorencoelia versiformis (Pers.) J.R. Dixon – на валежной древесине *Alnus* sp., пойма р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3412; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3862.

Семейство **Hyaloscyphaceae**

Clavdisculum karstenii Raitv. – на валежной древесине *Populus* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3904; на валежной древесине хвойного, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3957.

Hypodiscus incrustatus (Ellis) Raitv. – на старом плодовом теле трутового гриба, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3823.

Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis – на ветвях *Abies* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3912.

Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc. – на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3881.

Phialina separabilis (P. Karst.) Huhtinen et Scheuer – на ветвях *Rubus* sp., пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, речные завалы, VLA D-3922.

Rodwayella citrinula (P. Karst.) Spooner – на стеблях травянистых растений, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3415, -3909.

Velutaria lignicola (Preuss) Rehm – на валежной древесине *Acer* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3896.

Семейство **Lachnaceae**

Belonidium sulphureum (Fuckel) Raitv. – на стеблях цветковых, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3852.

Neobulgaria pura (Pers.) Petr. – на валежной древесине *Populus* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3848.

Семейство **Leotiaceae**

Leotia lubrica (Scop.) Pers. – на подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3832, -3827, -3944.

Семейство **Sclerotiniaceae**

Ciboria batschiana (Zopf) N.E. Vuchw. – на плюсках в подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3861, -3943.

Семейство **Tympanidaceae**

Holwaya mucida (Schulzer) Lorf et Abawi – на валежной древесине, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3937.

Виды с неопределенным местоположением

Tapesia culcitella (Cooke et Ellis) Sacc. – на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3818.

Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm – на валежной древесине *Acer* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3947.

Класс **Orbiliomycetes**Подкласс **Orbiliomycetidae**Порядок **Orbiliales**Семейство **Orbiliaceae**

Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) P. Karst. – на валежной древесине хвойного, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3876.

Orbilialia delicatula (P. Karst.) P. Karst. – на валежной древесине *Betula* sp., пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3865, -3945; на валежной древесине хвойного, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3910; на валежной древесине *Populus* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3898; на валежной древесине хвойного, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3914.

Orbilialia epipora (Nyl.) P. Karst. – на валежной древесине хвойного, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3835, -3959; на валежной древесине *Populus* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3875.

Orbilialia luteorubella (Nyl.) P. Karst. – на валежной древесине *Populus* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3853, -3856; на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3874, -3900; на валежной древесине, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3948.

Класс **Pezizomycetes**Подкласс **Pezizomycetidae**Порядок **Pezizales**Семейство **Helvellaceae**

Helvella corium (O. Weberb.) Masee – на почве, пойма р. Арму, ивняк прибрежный, VLA D-3399.

Helvella crispa (Scop.) Fr. – на почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3889, -3828, -3867.

Helvella cupuliformis Dissing et Nannf. – на валежной древесине *Quercus mongolica*, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3839.

Helvella ephippium Lév. – на подстилке из веточного опада *Populus* sp., окрестности пос. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3934.

Helvella elastica Bull. – на почве, пойма р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3400; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3958; пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3868, -3899, -3932; пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3890.

Helvella lacunosa Afzel. – на почве, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3940.

Семейство **Pezizaceae**

Pachyella babingtonii (Berk.) Boud. – на древесине *Chosenia arbutifolia*, пойма р. Арму, пойменный ивняк с ольхой и кленом, VLA D-3409.

Pachyella celtica (Boud.) Häffner – на почве, пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3824.

Peziza ampliata Pers. – на валежной древесине *Betula* sp., пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3851.

Peziza arvernensis Roze et Boud. – на почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3817.

Peziza badia Pers. – на почве, пойма р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3403.

Peziza queletii Medardi, Lantieri et Cacialli – на почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3819.

Семейство **Pyronemataceae**

Flavoscypha cantharella (Fr.) Harmaja – на подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3864.

Flavoscypha phlebophora (Berk et Broome) Harmaja – на подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3850, -3928.

Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel – на замшелой древесине, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3926.

Otidea alutacea (Pers.) Masseur – на подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3878; окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3929.

Otidea cochleata (L.) Fuckel – на подстилке, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3833, -3905, -3906, -3930.

Otidea grandis (Pers.) Rehm – на валежной древесине *Populus* sp., пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3931.

Pyronema alborosella Naumov – на валежной древесине *Betula* sp., пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3956.

Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte – на валежной древесине *Populus* sp., окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3820; на валежной древесине *Chosenia arbutifolia*, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3394; на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3907.

Scutellinia heterosculpturata Kullman et Raitv. – на валежной древесине *Betula* sp., пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3933.

Scutellinia parvispora J. Moravec – на валежной древесине хвойного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3821; на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3895.

Scutellinia pennsylvanica (Seaver) Denison – на валежной древесине *Pinus koraiensis*, пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3935.

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte – на валежной древесине *Juglans mandshurica*, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3383; на валежной древесине *Pinus koraiensis*, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3390; на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3892; на веточном опаде *Pinus koraiensis*, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3405; на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3843; на валежной древесине *Pinus koraiensis*, пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3941; на коре *Juglans mandshurica*, пойма р. Арму, ключ Кожаев, VLA D-693.

Scutellinia setosa (Nees) Kuntze – на валежной древесине *Picea ajanensis*, устье ручья Болотный, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3381; на валежной древесине *Betula* sp., пойма р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3406; на речных завалах, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3822; на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3894; на коре *Padus avium*, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3946.

Scutellinia umbrorum (Fr.) Lambotte – на коре *Juglans mandshurica*, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный лес, VLA D-3404 (субстрат для вида не характерный); на валежной древесине *Abies* sp., пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3893.

Spooneromyces velenovskyi (Vacek ex Svřček) Van Vooren – на замшелой почве, окрестности кордона «Корейский», пойма р. Большая Уссурка, дубняк, VLA D-3891; на валежной древесине, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3866.

Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf et J.K. Rogers – на валежной древесине лиственного, пойма р. Большая Уссурка, место впадения р. Арму, хвойно-широколиственные, VLA D-3927.

Trichophaea hybrida (Sowerby) T. Schumach. – на почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA D-3880.

Семейство **Sarcoscyphaceae**

Microstoma protractum (Fr.) Kanouse – на листовой подстилке, пойма р. Большая Уссурка, устье ручья Гремучий, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3444.

Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. – на валежной древесине *Fraxinus mandshurica*, пойма р. Большая Уссурка, кедрово-елово-широколиственный лес, VLA D-3397; на валежной древесине хвойного, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3879, на валежной древесине *Alnus sp.*, пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3963.

Wynnea macrospora B. Liu, M.H. Liu et J.Z. Cao – на почве, пойма р. Большая Уссурка, кедрово-широколиственный лес, VLA D-3391.

Семейство **Sarcosomataceae**

Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel – на почве, пойма р. Большая Уссурка, кедровник, VLA D-3840.

Класс **Sordariomycetes**

Порядок **Hypocreales**

Семейство **Nectriaceae**

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. – на ветвях *Alnus sp.*, пойма р. Арму, устье ручья Кожаев, VLA D-3854; на древесине *Populus sp.*, окрестности с. Дерсу, кедрово-тополевый лес, VLA D-3855.

Семейство **Ophiocordycipitaceae**

Tolypocladium capitatum (Holmsk.) Quandt, Kepler et Spatafora – на плодовых телах трюфельных в почве, окрестности кордона «Корейский», пойма р. Большая Уссурка, дубняк, VLA D-3829.

Порядок **Sordariales**

Семейство **Sordariaceae**

Boothiella tetraspora Lodhi et J.H. Mirza – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк с ольхой и кленом, окрестности кордона «Корейский», дубняк.

Sordaria fimicola (Roberge) Ces. et De Not. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником, березняк со спиреей, ивняк с ольхой и кленом, устье ручья Широкий, хвойно-широколиственный лес, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Семейство **Ceratostomataceae**

Melanospora asymmetrica (Curzi) Arx et E. Mull. – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк с ольхой и кленом.

Microascus singularis (Sacc.) Malloch et Cain – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осиною и липой, пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Порядок **Chaetomiales**
Семейство **Chaetomiaceae**

Chaetomium aureum Chivers – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ивняк с ольхой и кленом; устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Chaetomium circinatum Chivers – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, хвойно-широколиственный папоротниково-рябинниковый лес, ивняк с ильмом и ольхой, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес.

Chaetomium elatum Kunze – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, черемухой и лимонником, березняк со спиреей, ивняк с ольхой и кленом.

Chaetomium globosum Kunze – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом.

Chaetomium murorum Corda – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Chaetomium spirale Zopf – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный с кедром, черемухой и лимонником, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем, ельник папоротниковый с кленом, липой и бархатом, устье ручья Центральный, кедрово-широколиственный лес, устье р. Арму, широколиственный лес с тополем, ясенем и рябиной.

Chaetomium subterraneum Swift et Povah – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Порядок **Trichosphaeriales**
Семейство **Trichosphaeriaceae**

Trichosphaeria pilosa (Pers.) Fuckel – в почве, пойма р. Большая Уссурка, ельник с кедром, лещиной и свободноягодником колючим, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный лес.

Порядок **Dothideales**
Семейство **Sporormiaceae**

Preussia fleischhaki (Auersw.) Cain – в почве, пойма р. Большая Уссурка, березняк с осинкой и липой, ивняк с ольхой и кленом; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Порядок **Hypocreales**
Семейство **Hypocreaceae**

Emericellopsis minima Stolk – в почве, пойма р. Большая Уссурка, хвойно-широколиственный осмундово-разнотравный лес.

Emericellopsis terricola J.F.H. Веума – в почве, пойма р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк; пойма р. Арму, ивняк с тополем.

Отдел **Basidiomycota**
 Класс **Agaricomycetes**
 Подкласс **Agaricomycetidae**
 Порядок **Agaricales**
 Семейство **Agaricaceae**

Agaricus impudicus (Rea) Pilát – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25162.

Agaricus placomyces Peck – на почве, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25701.

Agaricus porphyrizon P.D. Orton – на почве, долина р. Большая Уссурка, ручей Центральный, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25177.

Agaricus xantholepis (F.H. Møller) F.H. Møller – на почве, бассейн ключа Ковалевский, VLA M-25102.

Echinoderma asperum (Pers.) Bon – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, широколиственный лес, VLA M-25825.

Cystodermella cinnabarina (Alb. et Schwein.) Nagajima – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25411.

Lepiota subincarnata J.E. Lange – на подстилке, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-25795.

Lepiota tomentella J.E. Lange – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25796.

Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon et Boiffard – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, устье ручья Кожаев, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25794.

Leucocoprinus cygneus (J.E. Lange) Bon – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25797.

Lycoperdon mammiforme Pers. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, M-25669.

Семейство **Amanitaceae**

Amanita flavipes Imai – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25667.

Amanita pantherina (DC) Krombh. – на почве, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24804.

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25666.

Amanita vaginata (Bull.) Lam. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24814.

Amanita virosa Bertill. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25630.

Amanita volvata (Peck) Lloyd – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25634.

Семейство **Coprinaceae**

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange – на древесине, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-24813.

Coprinus micaceus (Bull.) Fr. – на древесине, долина р. Большая Уссурка, устье ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24765.

Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», луг, VLA M-25173.

Семейство **Psathyrellaceae**

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire – на почве и древесине, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-24779.

Семейство **Bolbitiaceae**

Agrocybe pediades (Fr.) Fayod – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», луг, VLA M-25172.

Conocybe apala (Fr.) Arnolds – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», луг, VLA M-24782.

Descolea flavoannulata (Lj.N. Vassiljeva) E. Horak – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24807.

Семейство **Entolomataceae**

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24809.

Entoloma byssisedum (Pers.) Donk – на основании ствола лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25619.

Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. – долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25623, -25803.

Семейство **Hygrophoraceae**

Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25179.

Hygrocybe cantharellus (Schwein.) J.E. Lange – на почве, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24777.

Hygrocybe conica (Schaeff) P. Kumm. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24780.

Hygrocybe flavescens (Kauffman) Singer – на почве, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24765.

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25672.

Семейство **Pluteaceae**

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. – на валеже, долина р. Большая Уссурка, устье ручья Центральный, широколиственный лес, VLA M-25650; долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25643, 25804.

Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. – на валежном стволе, бассейн ключа Ковалевский, кедрово-тисово-широколиственный лес, VLA M-25109.

Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. – на древесине, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24791.

Семейство **Schizophyllaceae**

Schizophyllum commune Fr. – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24921.

Семейство **Strophariaceae**

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. – на валежном стволе, бассейн ключа Ковалевский, кедрово-тисово-широколиственный лес, VLA M-25129.

Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. – на стволе ивы, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25687.

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. – на валеже, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25671.

Pholiota polychroa (Berk.) A.H. Sm. – на валежных ветках дуба, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24788.

Pleuroflammula chocoruensis Singer – на валежной ветке, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24762.

Stropharia coronilla (Bull. ex DC.) Quél. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25128.

Порядок **Cantharellales**

Семейство **Cantharellaceae**

Cantharellus cibarius Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, дубняк, VLA M-24939.

Craterellus cornucopioides (L.) Pers. – на почве, кордон «Корейский», широколиственный лес, VLA M-26341.

Семейство **Hydnaceae**

Hydnum repandum L. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24947, -24936, -24927.

Порядок **Corticiales**

Семейство **Corticaceae**

Cytidia salicina (Fr.) Burt – на валеже ивы, долина р. Большая Уссурка, ивняк, VLA M-24918.

Порядок **Cortinariales**

Семейство **Hymenogastraceae**

Galerina vittiformis (Fr.) Singer – на почве среди мха, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, M-25791; долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25790.

Gymnopilus sapineus (Fr.) Murrill – на древесине маакии, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25827.

Семейство **Inocybaceae**

Flammulaster erinaceellus (Peck) Watling – на валеже, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25785.

Inocybe acuta Boud. – на почве, бассейна ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-24793.

Inocybe asterospora Quéf. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25799.

Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24781.

Inocybe griseolilacina J.E. Lange – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25786.

Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. – на почве, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-24792; долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25798.

Inocybe splendens R. Heim – на почве, р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25800.

Семейство **Crepidotaceae**

Crepidotus casparyi Velen. – на сухих ветках ивы, бассейн р. Большая Уссурка, ивняк, VLA M-25115.

Crepidotus crocophylluus (Berk.) Sacc. – на валежном стволе, бассейн р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25114.

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude – на сухих ветках ивы, бассейн р. Большая Уссурка, ивняк, VLA M-25116.

Crepidotus subverrucisporus Pilát – на сухих ветках ивы, бассейн р. Большая Уссурка, ручей Кожаев, ивняк, VLA M-25113.

Порядок **Gomphales**

Семейство **Gomphaceae**

Ramaria araiospora Marr et D.E. Stuntz – на почве, кордон «Корейский», широколиственный лес, VLA M-26339.

Семейство **Lentariaceae**

Lentaria byssiseda Corner – на валеже хвойной породы, бассейн ключа Ковалевский, тисовая роща, VLA M-24934.

Порядок **Hymenochaetales**

Семейство **Hymenochaetaceae**

Coltricia perennis (L.) Murrill – на почве, бассейн ключа Ковалевский, тисовая роща, VLA M-24928.

Hymenochaete intricata (Lloyd) S. Ito – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, ручей Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24917.

Phellinus yamanoi (Imazeki) Parmasto – на валеже хвойной (?) породы, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-26344.

Порядок **Polyporales**
Семейство **Fomitopsidaceae**

Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden – на пне кедра, бассейн ключа Ковалевский, тисовая роща, VLA M-24944; устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24945.

Daedalea quercina (L.) Pers. – на валеже лиственной породы, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25250.

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24938; на валеже устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25252, -25253.

Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Vlasák – на валеже кедра, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25256.

Pyrrhoderma scaurum (Lloyd) Ryvarden – на древесине дуба, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24946.

Rhodofomes cajanderi (P. Karst.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai – на валеже кедра, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24930; устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24948; на валеже, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25244.

Семейство **Ganodermataceae**

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – на валеже, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25246; на валеже лиственной породы, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25248.

Ganoderma carnosum Pat. – на валеже пихты, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-24925.

Семейство **Meruliaceae**

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – на валеже березы, кордон «Корейский», широколиственный лес, VLA M-26337.

Irpex lacteus (Fr.) Fr. – на валеже ивы, долина р. Большая Уссурка, ручей Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24943.

Merulius tremellosus Schrad. – на тополе, бассейн ключа Ковалевский, тисовая роща, VLA M-24924.

Семейство **Phanerochaetaceae**

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto – на валеже лещины, долина р. Большая Уссурка, ручей Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25249.

Семейство **Polyporaceae**

Daedaleopsis sinensis (Lloyd) Y.C. Dai – на ветке трескуна амурского, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25248.

Dentocorticium pilatii (Parmasto) Duhem et H. Michel – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24915.

Lenzites betulinus (L.) Fr. – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24926; на валеже лиственной породы, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25251.

Picipes badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko – на валеже, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-24935; на валеже, кордон «Корейский», широколиственный лес, VLA M-26343.

Polyporus melanopus (Pers.) Fr. – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24920.

Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller – на валеже березы даурской, кордон «Корейский», широколиственный лес, VLA M-26338.

Trametes conchifer (Schwein.) Pilát – на валеже, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24932, -24942.

Trametes versicolor (L.) Lloyd – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24923; на валеже, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25245; на валеже, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25254.

Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský – на валежных ветках лиственной породы, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24919.

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24929.

Семейство **Sparassidaceae**

Sparassis latifolia Y.C. Dai et Zheng Wang – на корнях кедра, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24922.

Порядок **Tricholomatales**Семейство **Tricholomataceae**

Leucocybe candicans (Pers.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno et Consiglio – на подстилке, устье р. Арму, широколиственный лес, VLA M-25174.

Clitocybe gibba (Pes.) P. Kumm. – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-24474.

Clitocybe hydrogramma (Bull.) P. Kumm. – на трухлявой древесине в подстилке, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25822; устье р. Арму, широколиственный лес, VLA M-25821.

Melanoleuca grammopodia (Fr.) Pat. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, 16.08.2015, VLA M-25120.

Melanoleuca melaleuca (Fr.) Murrill – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, долинный кедровник, VLA M-25117.

Ompalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. – на валеже ильма, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Кожаев, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24806.

Omphalina umbellifera (Fr.) Quéf. – на трухлявой древесине, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25122.

Panellus patellaris (Fr.) Konrad et Maubl. – на сухих ветках лещины, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24811.

Panellus stypticus (Bull.) P. Karst. – на сухих ветках лиственных пород, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24783.

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. – на трухлявой древесине среди мха, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA M-25107.

Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, ручей Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25118.

Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25168; бассейн ключа Ковалевский, кедрово-тисово-широколиственный лес, VLA M-25167.

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer – на валеже, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24771; бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-25632.

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer – на валеже, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24808.

Семейство **Marasmiaceae**

Baeospora myriadophylla (Peck) Singer – на валеже ильма, долина р. Большая Уссурка, устье ручья Центральный, широколиственный лес, VLA M-25668.

Hydropus floccipes (Fr.) Singer – на древесине, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25606.

Hydropus marginellus (Pers.) Singer – на валежном стволе, бассейн р. Большая Уссурка, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25185; бассейн ручья Кожаев, широколиственный лес, VLA M-25123.

Marasmiellus candidus (Fr.) Singer – на стволе липы, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, 16.08.2015, VLA M-25658.

Marasmius capillipes Sacc. – на листьях ясеня в подстилке, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-24815.

Marasmius insolitus Kiyashko et E.F. Malysheva – на подстилке, бассейн р. Большая Уссурка, пойменный кедровник, VLA M-25130.

Marsmius minutus Peck – на листьях ясеня в подстилке, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-25636.

Marasmius scorodonius (Fr.) Fr. – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-24816.

Marasmius siccus (Schwein.) Fr. – на подстилке, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», дубняк, VLA M-25104.

Marasmius macrocystidiosus Kiyashko et E.F. Malysheva – на подстилке, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25121.

Marasmius wynneae Berk. et Broome – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, широколиственный лес, VLA M-25186.

Megacollybia marginata R.H. Petersen, Morosova et J.L. Mata – на валеже, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25648.

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar – на валежной ветке в подстилке, бассейн ключа Ковалевский, кедрово-гисово-широколиственный лес, VLA M-25165.

Семейство **Mycenaceae**

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. – на древесине, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Кожаев, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24785; долина р. Большая Уссурка в устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25593.

Mycena laevigata Gillet – на валеже, долина р. Большая Уссурка, ручей Центральный, хвойно-широколиственный лес, M-25187; долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25680.

Mycena niveipes (Murrill) Murrill – на валеже, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25189.

Mycena olivaceoalcalina Singer – на древесине, бассейн ключа Ковалевский, широколиственный лес, VLA M-25810.

Mycena pelianthina (Fr.) Quél. – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-24796; долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25699.

Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner et Maire – на древесине, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25641.

Семейство **Lyophyllaceae**

Calocybe persicolor Fr. – на подстилке, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственные лес, VLA M-24769.

Hypsizigus ulmarius (Bull.) Redhead. – на валеже ильма, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24793.

Семейство **Physalacriaceae**

Mucidula brunneomarginata (Lj.N. Vassiljeva) R.H. Petersen – на валеже, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25784.

Mucidula mucida (Schrad.) Pat. – на клене, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму кедрово-широколиственный лес, VLA M-25657.

Семейство **Hydnangiaceae**

Laccaria laccata (Scop.) Cooke – на почве, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-24775.

Laccaria amethystina Cooke – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24797.

Семейство **Omphalotaceae**

Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling et Noordel. – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24772.

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill. – на подстилке, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24801; бассейн ключа Ковалевский, кедрово-тисово-широколиственный лес, VLA M-25181.

Семейство **Bondarzewiaceae**

Heterobasidion orientale Tokuda, T. Hatt. et Y.C. Dai – на валеже хвойной породы, бассейн ключа Ковалевский, тисовая роща, VLA M 24914; на валеже, устье р. Арму, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25255.

Семейство **Echinodontiaceae**

Laurilia sulcata (Burt) Pouzar – на валеже кедра, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24916.

Семейство **Hericiaceae**

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. – на дубе, кордон «Корейский», широколиственный лес, VLA M-26340.

Порядок **Russulales**

Семейство **Russulaceae**

Lactarius azonites (Bull.) Fr. – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24786.

Lactarius chrysorrheus Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25649.

Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24817.

Lactarius grandisporus Lj.N. Vassiljeva – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25645.

Lactarius piperatus (L.) Pers. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25647.

Lactarius quietus (Fr.) Fr. – на почве, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-25661.

Lactarius trivialis (Fr.) Fr. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25147.

Lactarius vellereus Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24764.

Lactarius vinaceorufescens A.H. Sm. – на почве, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25629.

Lactarius violascens (J. Otto) Fr. – на почве под липой и дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25639.

Lactarius volemus (Fr.) Fr. – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24784.

Russula albonigra (Krombh.) Fr. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25144.

Russula alutacea (Fr.) Fr. – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25131, -25159.

Russula aurea Pers. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25690.

Russula brunneola Burl. – на почве под дубом, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25136.

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24766; бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24805.

Russula decipiens (Singer) Bon – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25150.

Russula emetica (Schaeff.) Pers. – на почве под березой, долина р. Большая Уссурка, дубняк с березой, VLA M-25146.

Russula foetens Pers. – на почве, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-25646.

Russula fragilis (Fr.) Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25157.

Russula granulata Peck – на трухлявой древесине кедра, бассейн ключа Ковалевский, кедрово-тисово-широколиственный лес, 18.08.2015, VLA M-25133.

Russula grata Melzer – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24763.

Russula lactea Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25660.

Russula lilacea Quéf. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25826.

Russula mariae Peck – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25471.

Russula pectinatoides Peck – на почве, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25819; широколиственный лес, VLA M-24470.

Russula pseudodelica J.E. Lange – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24760, -24799.

Russula queletii Fr. – на почве под кедром, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24812; долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25702.

Russula vesca Fr. – на почве под дубом, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25126.

Russula virescens (Schaeff.) Fr. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25156.

Russula versicolor Jul. Schäff. – на почве, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25154; бассейн ключа Ковалевский, кедрово-широколиственный лес, VLA M-25158.

Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25142.

Семейство **Stereaceae**

Stereum gausapatum (Fr.) Fr. – на валеже, бассейн ключа Ковалевский, тисовая роща, VLA M-24931.

Stereum ostrea (Blume et T. Nees) Fr. – на валеже лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-24937.

Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat. – на коре лиственной породы, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M 24933; на коре липы, долина р. Большая Уссурка, ручей Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24941.

Порядок **Boletales**

Семейство **Boletaceae**

Boletus bicolor Peck – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25631.

Boletus edulis Bull. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25679.

Boletus chrysenteron Bull. – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24782.

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataile – на почве, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24789.

Leccinum extremiorientale (Lj.N. Vassiljeva) Singer – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24798.

Pulveroboletus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) Murrill – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24778.

Rheubarbariboletus armeniacus (Quél.) Vizzini, Simonini et Gelardi – на почве, бассейн р. Большая Уссурка, долинный кедровник, VLA M-25111.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25693; устье ручья Центральный, широколиственный лес, VLA M-25670.

Tylopuilus rubrobrunneus Mazzer et A.H. Sm. – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25362.

Tylopuilus alboater (Schwein.) Murrill – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25369.

Xerocomellus chrysenderon (Bull.) Šutara – на почве под дубом, долина р. Большая Уссурка окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25364.

Семейство Gyroporaceae

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25685.

Gyroporus punctatus Lj.N. Vassiljeva – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25683.

Семейство Suillaceae

Suillus placidus (Bonord) Singer – на почве, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24795.

Suillus spraguei (Berk. et M.A. Curtis) Kuntze – на почве под кедром, долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, кедрово-широколиственный лес, VLA M-24790.

Семейство Paxillaceae

Paxillus involutus (Basch) Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24800; на валежном стволе, там же, VLA M-225111.

Порядок Poriales

Семейство Lentinaceae

Lentinus martianoffianus Kalcbr. – на валеже лиственного, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Кожаев, широколиственный лес, VLA M-24794.

Pleurotus citrinopileatus Singer – на валеже ильма, долина р. Большая Уссурка, устье р. Арму, широколиственный лес, VLA M-24768.

Семейство Lentinellaceae

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. – на валеже, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24803; долина р. Большая Уссурка, Щучья протока, хвойно-широколиственный лес, VLA M-25700.

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner – на валеже хвойного, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24787.

Порядок Thelephorales

Семейство Thelephoraceae

Thelephora palmata (Scop.) Fr. – на почве, долина р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-24940; на почве, устье р. Арму, кедрово-широколиственный лес, VLA M 26342.

Подкласс **Auriculariomycetidae**
Порядок **Auriculariales**
Семейство **Auriculariaceae**

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. – на валеже, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24776.

Auricularia nigricans (Fr.) Birkebak, Loonay et Sánchez-García – на валеже, бассейн ключа Ковалевский, хвойно-широколиственный лес с тисом, VLA M-25662.

Elmerina hispida (Imazeki) Y.C. Dai et L.W. Zhou – на валежном стволе, бассейн р. Большая Уссурка, окрестности кордона «Корейский», широколиственный лес, VLA M-25112.

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. – на древесине, долина р. Большая Уссурка, бассейн ручья Центральный, хвойно-широколиственный лес, VLA M-24802.

Tremella fuciformis Berk. – на валежной ветке дуба, долина р. Большая Уссурка, широколиственный лес, VLA M-25164.

ЛИШАЙНИКИ

Планомерное изучение лишайников на территории юга Дальнего Востока было начато Л.А. Княжевой в конце 60-х годов XX века (Гурулева, Княжева, 1972; Княжева, 1973, 1978; Княжева, Семенова, 1979). Дальнейшие исследования лишенобиоты региона (Пчелкин, 1981, 1987; Княжева, Скирина, 1982; Скирина, Княжева, 1985, 1986, 1987а, б; Скирина, 1985, 1987, 1995, 1997, 1999; Чабаненко, 1984, 1988, 1990, 1997, 1999; Скирина, Родникова, 1999; Галанина, Скирина, 2000; McCune, Tchabanenko, 2001; и др.) были обобщены в сводке С.И. Чабаненко (2002). Эта монография и дополнительные данные по распространению лишайников (в т.ч. Галанина, 2004, 2007а, б, 2008; Скирина и др., 2007, 2009; Галанина, Яковченко, 2007; Galanina, 2006) были включены в первый чек-лист лишайников России (Урбанавичюс, 2010). В последнее десятилетие лишенологических исследований юга Дальнего Востока появились более полные списки отдельных территорий (Скирина, 2012, 2015а, б, 2016, 2017; Скирина, Родникова, 2014; Кочунова 2016; Галанина, Ежкин, 2018), в том числе мало или не изученных ранее (Черданцева и др., 2013; Яковченко и др., 2013), опубликованы флористические находки (Galanina et al., 2011; Kuznetsova et al., 2013; Галанина, Галанин, 2014; Ежкин, Галанина, 2014; Катаева, 2014; Vondrák et al., 2016; Kuznetsova, Dudov, 2017; Ezhkin, 2018; Ezhkin, Jørgensen, 2018; Ezhkin, Schumm, 2018; Konoreva et al., 2018а, б, 2019; Tchabanenko et al., 2018; Ежкин, 2019; Zhurbenko, Ohmura, 2019; Yakovchenko et al., 2019 (Большая Уссурка), выявлены новые местонахождения охраняемых, редких и слабоизученных видов (Скирина, Скирин, 2010, 2013, 2014; Davydov et al., 2011; Скирина, 2013; Скирина и др., 2016; Галанина и др., 2017; Galanina et al., 2018; Каганов, Ежкин, 2019), выполнены исследования отдельных систематических групп (Гагарина, 2017; Давыдов, 2017; Жданов, 2017; Ohmura et al., 2017; Sheard et al., 2017; Чабаненко, 2018; Galanina, Ezhkin, 2019; Konoreva et al., 2019). Благодаря более широкому использованию тонкослойной хроматографии и молекулярно-генетических методов идентифицированы трудные для определения таксоны и описаны новые для науки виды (Kondratyuk et al., 2011, 2013а, б, 2014; McCune et al., 2015; Zhurbenko et al., 2017; Gerasimova et al., 2018).

Биоразнообразие лишайников традиционно наиболее полно изучено на ООПТ, тем не менее специальных исследований лишенобиоты национального парка «Удэгейская легенда» не проводилось. В 2009 г. Л.С. Яковченко в результате рекогносцировочных исследований в составе геоботанического отряда была собрана небольшая коллекция лишайников, хранящаяся в настоящее время в гербарии Ботанического сада-института. Позже, в 2015 г., первым автором также был произведен сбор образцов на территории парка. В результате был составлен первый список видов лишайников национального парка, произрастающих в кедрово-широколиственных и долинных широколиственных лесах.

Определение образцов выполнено в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН в лаборатории ботаники. Изученный материал хранится в гербариях Ботанического сада-института ДВО РАН (VBGI) и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (VLA).

Всего выявлено на данный момент 77 видов лишайников, главным образом эпифитных. Виды, занесенные в Красную книгу Приморского края, отмечены звездочкой. В целом по видовому составу лишайнобиота долинных широколиственных и кедрово-широколиственных лесов национального парка «Удэгейская легенда» насыщена неморальными видами, характерными для пояса широколиственных лесов юга Дальнего Востока. Несомненно, богатство лишайнобиоты парка еще предстоит изучать в будущем.

Список видов

Anaptychia isidiata Tomim – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Betula*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-143; окрестности кордона «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-89; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-30, 39, 97, 255; там же, дубовый лес, на камнях, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-34, 103; кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Fraxinus*, *Juglans mandshurica*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-213, 196.

Anaptychia palmulata (Michx.) Vain. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-29, 38, 99.

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale – 1 км от кордона «Корейский», осыпь в дубовом лесу, на камнях. 19.08.2015. И.А. Галанина L-85.

Buellia sp. – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-139; там же, долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-87; кордон «Корейский», тисовая роща, на *Alnus*. 18.08.2015. И.А. Галанина L-125.

Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Caloplaca kiewkaensis Yakovcz., Galanina et S.Y. Kondr. – кордон «Корейский», тисовая роща, на *Populus koreana*. 18.08.2015. И.А. Галанина L-147.

Caloplaca oxneri S.Y. Kondr. et Söchting – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Populus tremula*, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Caloplaca ussuriensis Oxner, S.Y. Kondr. et Elix – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-42, 79, 249; 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Betula*, *Salix*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-68, 143; окрестности кордона «Корейский», долина р. Б. Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-53, 96.

Candelaria concolor (Dicks.) Stein – кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Betula costata*, *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-87, 115; кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на сухой древесине в опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина L-106; 2 км от кордона «Корейский»,

осиновый лес с дубом монгольским, на *Betula*, *Tilia*, *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-46, 48, 100, 238.

**Cetrelia pseudolivetorum* (Asahina) W.L. Culb. et C.F. Culb. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Вахумбинская тисовая роща, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, на сухой коре в опаде. 06.11.2009. Л.С. Яковченко; там же, Михайловская тисовая роща № 2, хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на *Picea*, *Taxus*. 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

Cetrelia braunsiana (Müll. Arg.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*, на опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина L-112; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-202; кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес на юго-восточном склоне, на *Betula costata*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-90.

Cetrelia cetrarioides (Delise) W.L. Culb. et C.F. Culb. – кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на ветвях *Pinus koraiensis* в опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина L-58; ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Picea* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-66; западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Вахумбинская тисовая роща, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, на поваленном замшелом стволе. 06.11.2009. Л.С. Яковченко.

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – 1 км от кордона «Корейский», осыпь в дубовом лесу, на почве на моховой подушке на границе леса и осыпи. 19.08.2015. И.А. Галанина L-128.

Collema sp. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Dendrioscicta wrightii (Tuck.) Moncada et Lücking – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, правый борт реки Большая Уссурка, высокая терраса между 1-й и 2-й Михайловскими тисовыми рощами, хвойно-широколиственный лес, на *Populus tremula*. 11.10.2010. Л.С. Яковченко.

Evernia mesomorpha Nyl. – кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, в опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина L-70.

Flavoparmelia caperata (L.) Hale – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Betula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-48; кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Pinus koraiensis* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-51, 113, 177; 25 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Prunus padus*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-215; западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловский прижим, отвесный каменистый замшелый утес по левому борту р. Большая Уссурка в верхнем течении, на древесине (валеж). 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

Fuscopannaria leucophaea (Vahl) P.M. Jørg. – западный макросклон хребта Сихотэ-Алинь, Николаевский ключ, смешанный хвойно-широколиственный лес с замшелыми камнями в верхней части склона, бадановая полянка, на камне. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Graphis scripta (L.) Ach. – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Betula*, *Acer*, *Abies*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-144, 93, 117; там же, пойменный кедрово-широколиственный лес, на старом дереве *Prunus padus* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-169.

Heterodermia diademata (Taylor) D.D. Awasthi – окрестности кордона «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес на юго-восточном склоне, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-179.

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – окрестности кордона «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-191, 181; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-98, 108; там же, дубовый лес, на камнях под пологом, 19.08.2015. И.А. Галанина L-104; кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Fraxinus*, *Juglans mandshurica*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-211, 195.

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловский прижим, отвесный каменистый замшелый утес по левому борту р. Большая Уссурка в верхнем течении, на древесине (валеж). 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

**Hypogymnia metaphysodes* (Asahina) Räsänen – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Вахумбинская тисовая роща, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, на поваленном замшелом стволе. 06.11.2009. Л.С. Яковченко.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – окрестности кордона «Корейский», тисовая роща, хвойно-широколиственный лес, на *Pinus*, в опаде. 18.08.2015. И.А. Галанина L-223; западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Вахумбинская тисовая роща, смешанный хвойно-широколиственный папоротниковый лес, на поваленном замшелом стволе. 06.11.2009. Л.С. Яковченко.

Lecanora allophana (Ach.) Nyl. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Lecanora chlarotera Nyl. – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-139.

Lecanora pachycheila Hue – кордон «Корейский», тисовая роща, на *Alnus*. 18.08.2015. И.А. Галанина L-125; ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Acer*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-241.

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловский прижим, отвесный каменистый замшелый утес по левому борту р. Большая Уссурка в верхнем течении, на древесине (валеж). 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

Lecanora sp. – кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-229. 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-139.

Lepra dactylina (Ach.) Hafellner. – кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-87.

Lepra multipuncta (Turner) Hafellner – 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», пойменный кедрово-широколиственный лес, на старом дереве *Prunus padus* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-167; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-78.

**Leptogium burnetiae* C.W. Dodge – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Lobaria quercizans Michx. – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина

**Lobaria retigera* (Bory) Trevis. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Николаевский ключ, хвойно-широколиственный лес с замшелыми камнями в верхней части склона, бадановая полянка, на замшелых камнях. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Lobaria isidiophora Yoshim. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловская тисовая роща № 2, хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на *Pinus koraiensis*. 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

**Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловская тисовая роща № 2, хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на *Taxus cuspidata*. 12.10.2010. Л.С. Яковченко.

**Lobaria scrobiculata* (Scop.) Nyl. et Cromb. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловский прижим, отвесный каменистый замшелый утес по левому борту р. Большая Уссурка в верхнем течении, на замшелых камнях. 08.11.2009. Л.С. Яковченко, Е.В. Малашкина.

Lobaria tuberculata Yoshim. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловский прижим, отвесный каменистый замшелый утес по левому борту р. Большая Уссурка в верхнем течении, на замшелых камнях. 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

Lobaria orientalis (Asahina) Yoshim. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Михайловская тисовая роща № 1, хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на *Quercus mongolica*. 08.11.2009. Л.С. Яковченко.

Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина; западный макросклон хребта Сихотэ-Алинь, Михайловская тисовая роща № 1, хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на *Quercus mongolica*. 08.11.2009. Л.С. Яковченко; там же, правый борт р. Большая Уссурка, высокая терраса между 1-й и 2-й Михайловскими тисовыми рощами, хвойно-широколиственный лес, на *Populus tremula*. 11.10.2010. Л.С. Яковченко.

Melanelixia huei (Asahina) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-208.

**Menegazzia terebrata* (Hoffm.) A. Massal. – кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на ветвях *Pinus koraiensis* в опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина L-52; ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на ветвях *Picea* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-62; западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, правый борт р. Большая Уссурка, высокая терраса между 1-й и 2-й тисовыми рощами, хвойно-широколиственный лес, на *Picea*. 11.10.2010. Л.С. Яковченко; там же, Николаевский ключ, смешанный хвойно-широколиственный лес с замшелыми камнями в верхней части склона, бадановая полянка, на камне. 07.11.2009. Л.С. Яковченко; там же, Вахумбинская тисовая роща, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, на поваленном замшелом стволе, сухих веточках, коре *Pinus koraiensis*. 06.11.2009. Л.С. Яковченко; там же, Ковалевская тисовая роща, хвойно-широколиственный лес, на веточках *Taxus cuspidata*. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale – кордон «Корейский», тисовая роща, на *Alnus*. 18.08.2015. И.А. Галанина L-187; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*, *Betula*, *Tilia*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-206, 49, 110, 185; кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*, на сухостое. 16.08.2015. И.А. Галанина L-225, 174; ключ Центральный, 20–25 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*, *Prunus padus*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-217, 222; западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Ковалевская тисовая роща, хвойно-широколиственный лес, на *Syringa amurensis*. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Myelochroa subaurulenta (Nyl.) Elix et Hale – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина

**Nipponoparmelia pseudolaevior* (Asahina) K.H. Moon, Y. Ohmura et Kashiw. – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Fraxinus*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-142.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Ковалевская тисовая роща, смешанный хвойно-широколиственный лес, на валеже. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Parmelia squarrosa Hale – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на ветвях *Picea* в опаде, *Phellodendron amurense*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-221, 240, 62.

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*, на *Prunus padus*, на ветках *Picea* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-61, 220, 231, 253; там же, кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*, *Pinus koraiensis*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-50, 229; кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес на юго-восточном склоне, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-180, 182.

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, окр. ключа Первый Островной, нижняя влажная часть склона, в овраге каменистые осыпи, на почве. 07.11.2009. Л.С. Яковченко; там же, Ковалевская тисовая роща, на валеже. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Peltigera hymenina (Ach.) Delise – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на камне под пологом. 19.08.2015. И.А. Галанина L-77, 83.

Pertusaria pertusa (L.) Tuck. – кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-234.

Phaeophyscia hirtuosa (Kremp.) Essl. – кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Fraxinus*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-163;

Phaeophyscia hispidula (Ach.) Essl. – кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*, *Betula costata*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-189, 95; кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Fraxinus*, на сухой древесине в опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина L-106, 175, 163; окрестности пос. Дерсу, берег р. Большая Уссурка, на старом дереве *Salix*. 15.08.2015. И.А. Галанина L-127; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Tilia*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-184.

Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-84.

Phaeophyscia squarrosa Kashiw. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Quercus mongolica*, *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-28, 40, 55, 199, 203; там же, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-35, 105; кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Juglans mandshurica*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-159, 210; кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-111, 178.

Phaeophyscia rubropulchra (Degel.) Moberg – кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес на юго-восточном склоне, на *Betula costata*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-86;

Physconia detersa (Nyl.) Poelt – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Tilia*, *Populus tremula*, *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-27, 33, 36, 54, 109, 239, 183.

Physconia hokkaidensis Kashiw. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-250, 205.

Physconia kurokawai Kashiw. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-60, кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-94;

Physconia subpulverulenta (Szatala) Poelt – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-37.

Polyblastidium hypoleucum (Ach.) Kalb – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Betula*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-108.

Polyblastidium microphyllum (Kurok.) Kalb – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*, *Betula*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-47, 201.

Porpidia cf. albocaerulescens (Wulfen) Hertel et Knoph – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Николаевский ключ, хвойно-широколиственный лес с замшелыми камнями в верхней части склона, бадановая полянка, на камне. 07.11.2009. Л.С. Яковченко.

Pseudocyphellaria crocata (L.) Vain. – западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, Вахумбинская тисовая роща, хвойно-широколиственный папоротниковый лес, на *Betula*. 06.11.2009. Л.С. Яковченко; там же, Михайловский прижим, отвесный каменистый замшелый утес по левому борту р. Большая Уссурка в верхнем течении, на замшелых камнях. 08.11.2009. Л.С. Яковченко, Е.В. Малашкина; там же, Михайловская тисовая роща № 2, хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на поваленном стволе. 10.10.2010. Л.С. Яковченко, Е.В. Малашкина.

**Pyxine soredata* (Ach.) Mont. – кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*, *Prunus padus*. 16.08.2015. И.А. Галанина L-226, 236; 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Abies*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-116; 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-32; кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина L-180; западный макросклон хр. Сихотэ-Алинь, правый борт р. Большая Уссурка, высокая терраса между 1-й и 2-й Михайловскими тисовыми рощами, хвойно-широколиственный лес, на *Populus*. 11.10.2010. Л.С. Яковченко; там же, Михайловская тисовая роща № 2, смешанный хвойно-широколиственный лес с преобладанием тиса остроконечного, на поваленном стволе. 10.10.2010. Л.С. Яковченко, Е.В. Малашкина.

Ramalina roesleri (Schaer.) Nyl. – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Fraxinus*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-138; кордон «Корейский», тисовая роща, на *Alnus*. 18.08.2015. И.А. Галанина L-187.

Rinodina ascociscana (Tuck.) Tuck. – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Rinodina chrysiata Sheard – 2 км от кордона «Корейский», осиновый лес с дубом монгольским, на *Populus tremula*. 19.08.2015. И.А. Галанина; кордон «Корейский», долина р. Большая Уссурка, дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 20.08.2015. И.А. Галанина; кордон «Слияние», кедрово-широколиственный лес, на *Phellodendron amurense*. 16.08.2015. И.А. Галанина.

Rinodina subalbida (Nyl.) Vain. – тисовая роща, кордон «Корейский», хвойно-широколиственный лес, на *Alnus*. 18.08.2015. И.А. Галанина.

Rinodina subpariata (Nyl.) Zahlbr. – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Quercus mongolica*, *Fraxinus*. 17.08.2015. И.А. Галанина.

Rinodina subminuta H. Magn. – кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на сухих ветках в опаде. 16.08.2015. И.А. Галанина.

Rinodina xanthophaea (Nyl.) Zahlbr. – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Pinus koraiensis*. 17.08.2015. И.А. Галанина.

Schimatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr. – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Betula*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-92.

Stereocaulon sp. – 2 км от кордона «Корейский», на осыпи в дубовом лесу. 19.08.2015. И.А. Галанина.

Tephromela atra (Huds.) Hafellner – 2 км от кордона «Корейский», дубовый лес, на *Quercus mongolica*. 19.08.2015. И.А. Галанина L-139; тисовая роща, кордон «Корейский», хвойно-широколиственный лес, на *Alnus*. 18.08.2015. И.А. Галанина L-124; кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Prunus padus*. 16.08.2015. И.А. Галанина; ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Acer*, *Fraxinus*. 17.08.2015. И.А. Галанина L-141, 242; там же, пойменный кедрово-широколиственный лес, на старом дереве *Prunus padus* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-166.

Usnea sp. – кордон «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на ветках *Pinus koraiensis* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина.

Varicellaria velata (Turner) I. Schmitt ex Lumbsch – ключ Центральный, 20 км вверх по течению р. Арму от кордона «Слияние», хвойно-широколиственный лес, на *Picea* в опаде. 17.08.2015. И.А. Галанина L-63.

ЦИАНОБАКТЕРИИ И ВОДОРОСЛИ

Водоросли являются первым звеном трофической цепи и одним из основных продуцентов органического вещества в водоемах. Водоросли можно назвать наиболее перспективным объектом для оценки состояния водных экосистем. Знание видового состава и особенностей функционирования первичного звена создает основу для рационального использования водоемов. В связи с этим весьма актуальна задача изучения природных, ненарушенных экосистем (в том числе и водных), резерватами которых являются заповедники и национальные парки. На этих территориях охраняются не только отдельные виды, но и природные комплексы, что особенно важно в отношении водорослей. Природные сообщества заповедников и национальных парков служат в качестве эталонных при оценке степени измененности аналогичных экосистем на незаповедной территории. Кроме того, инвентаризация всего генофонда каждой охраняемой территории включает в себя изучение всех групп организмов животного и растительного мира, в частности, от высших растений до микроскопических водорослей.

Водоросли – наиболее чувствительный и надежный индикатор состояния водных экосистем. Помимо важной биологической роли продуцентов органического вещества в водоемах, водоросли имеют большое значение при оценке биоразнообразия и мониторинге экологического состояния пресных водоемов. Целенаправленное изучение сообществ водорослей позволяет не только проследить сукцессию их видового состава, но и выявить особенности и закономерности изменений их структуры и продуктивности при изменениях окружающей среды. Кроме того, изучение качественных и количественных характеристик водорослевых сообществ позволяет решать задачи контроля санитарно-биологического состояния водоемов и определять возможные пути их регулирования.

Исследование водотоков рек Большая Уссурка, Дальняя и Арму, проведенное на стадии подготовки эколого-экономического обоснования, позволило подтвердить малонарушенный статус территории. Был составлен приведенный ниже конспект альгофлоры, аннотированный указанием мест отбора проб, фенологическими данными и сведениями о частоте встречаемости вида. Сбор альгологического материала был проведен в мае–июне и октябре 1991 г. Объем использованного материала – 62 пробы, в основном обрастания камней.

Аннотированный список цианобактерий и водорослей

Отдел *Cyanobacteria* – Цианобактерии

Geitlerinema amphibium (C. Agardh) Anagnostidis – водоем в долине р. Обильная, май, часто.

Homoeothrix janthina (Bornet et Flahault) Starmach – р. Арму, май, единично; р. Дальняя, июнь, нередко; ключ Спотыкач, октябрь, очень часто.

Leptolyngbya mucicola (Lemmermann) Anagnostidis et Komárek – р. Арму, вне воды, май, часто.

Phormidium autumnale (C. Agardh) Trevisan ex Gomont – р. Арму, май, нередко масса; октябрь, ст. 1, масса, ст. 2, масса; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, редко-нередко; р. Дальняя, июнь, масса; ключ Спотыкач, октябрь, нередко; левый безымянный приток р. Арму, май, нередко.

Phormidium corium (C. Agardh) Gomont – левый безымянный приток р. Арму, май, масса.

Phormidium favosum (Bory) Gomont – р. Арму, вне воды, май, очень часто.

Phormidium limosum (Dillwyn) P.C. Silva – водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Phormidium retzii (C. Agardh) Kützing ex Gomont – р. Арму, май, масса.

Phormidium terebriforme (C. Agardh ex Gomont) Anagnostidis et Komárek – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, нередко.

Scytonema mirabile (Dillwyn) Bornet – левый безымянный приток р. Арму, май, масса.

Отдел Bacillariophyta – Диатомовые водоросли

Achnantheidium minutissimum (Kützing) Czarnecki – р. Арму, май, нередко-часто; октябрь, ст. 1, часто; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, нередко; р. Полуденная, май, редко; р. Обильная, май, часто; р. Дальняя, июнь, нередко-часто; р. Микула, май, масса; левый безымянный приток р. Арму, май, редко.

Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot – р. Арму, май, единично-редко; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Amphora ovalis (Kützing) Kützing – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; ключ Спотыкач, октябрь, единично.

Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex A. Schmidt – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично; р. Микула, май, единично.

Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Brebissonia boeckii (Ehrenberg) E.O. Meara – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve – р. Арму, май, редко; июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Cocconeis placentula Ehrenberg – р. Арму, май–июнь, единично-нередко; октябрь, ст. 1, нередко, ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко-нередко; октябрь, ст. 2, редко; р. Малые Сибичи, октябрь, редко; р. Обильная, май, редко; р. Полуденная, май, единично; р. Микула, май, единично; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; кл. Спотыкач, октябрь, нередко; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Craticula cuspidata (Kützing) Mann – ключ Спотыкач, октябрь, единично.

Cyclotella meneghiniana Kützing – р. Арму, июль, редко; р. Большая Уссурка, ст. 2, октябрь, единично.

Symbella cymbiformis C. Agardh – р. Арму, июнь, редко; р. Дальняя, июнь, редко; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Cymbella neocistula Krammer – р. Арму, май, единично; октябрь, ст. 2, очень часто; р. Обильная, май, редко; р. Дальняя, июнь, редко; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck var. *tumida* – р. Арму, июнь, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, нередко; р. Малые Сибичи, октябрь, нередко.

Cymbella tumida var. *borealis* (Grunow) Cleve – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Cymbella turgidula Grunow – Арму, октябрь, ст. 2, редко; ст. 2, очень часто; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, очень часто; р. Дальняя, июнь, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, единично.

Cymbopleura cuspidata (Kützing) Krammer – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer – р. Арму, май, нередко; июнь, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко-нередко; р. Дальняя, июнь, нередко; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Denticula tenuis Kützing – р. Арму, июнь, единично.

Diatoma hiemalis (Lyngbye) Heiberg – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Крапивная, май, нередко; р. Микула, май, очень часто.

Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing – р. Арму, май, редко-очень часто; октябрь, ст. 1, единично; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, часто; р. Обильная, май, редко-часто; р. Полуденная, май, нередко; р. Крапивная, май, часто-очень часто; р. Микула, май, масса; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; ключ Спотыкач, октябрь, очень часто; левый безымянный приток р. Арму, май, нередко-масса; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Diatoma tenue C. Agardh – р. Арму, май–июнь, часто-очень часто; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-очень часто; р. Обильная, май, редко; р. Дальняя, июнь, редко-нередко.

Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt – р. Арму, май, единично-нередко; октябрь, ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Полуденная, май, единично; р. Микула, май, редко; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Diploneis smithii var. *pumila* (Grunow) Hustedt – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Encyonema minutum (Hilse ex Rabenhorst) Mann – р. Арму, май, редко-масса; октябрь, ст. 1, часто; ст. 2, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-масса; октябрь, ст. 2, часто; р. Малые Сибичи, октябрь, часто; р. Обильная, май, редко-очень часто; р. Полуденная, май, нередко; р. Крапивная, май, часто-очень часто; р. Микула, май, часто; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; ключ Спотыкач, октябрь, часто; р. Малые Сибичи, октябрь, часто; левый безымянный приток р. Арму, май, редко.

Encyonema perpusillum (A. Cleve) Mann – р. Дальняя, июнь, единично.

Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann – р. Арму, май, редко-масса; октябрь, ст. 1, часто; ст. 2, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-масса; октябрь, ст. 2, часто; р. Малые Сибичи, октябрь, часто; р. Обильная, май, редко-очень часто; р. Полуденная, май, нередко; р. Крапивная, май, часто; р. Микула, май, часто; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; ключ Спотыкач, октябрь, часто; водоем в долине р. Обильная, май, очень часто.

Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer – р. Арму, июнь, единично.

Eunotia bidens Ehrenberg – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Mills – р. Арму, май–июнь, редко-нередко; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, нередко.

Eunotia diodon Ehrenberg – р. Дальняя, июнь, единично.

Eunotia flexuosa (Brébisson) Kützing – р. Арму, май–июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Eunotia glacialis Meister – р. Арму, июнь, единично.

Eunotia incisa W. Smith ex Gregory – р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Eunotia minor (Kützing) Grunow – р. Арму, заводь, май, редко; р. Дальняя, июнь, редко.

Eunotia muscicola var. *tridentula* Nörpel-Schempp et Lange-Bertalot – р. Арму, заводь, май, редко.

Eunotia pectinalis (Kützing) Rabenhorst – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично.

Eunotia praeurupta Ehrenberg – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Fragilaria capucina Desmazières var. *capucina* – р. Арму, май, оч. часто; р. Обильная, май, редко.

Fragilaria capucina var. *mesolepta* (Rabenhorst) Rabenhorst – р. Арму, май, редко; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Fragilaria capucina var. *rumpens* (Kützing) Lange-Bertalot ex Bukhtiyarova – р. Арму, июнь, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, редко-нередко; октябрь, ст. 2, нередко; р. Дальняя, июнь, нередко.

Fragilaria capucina var. *vaucheriae* (Kützing) Lange-Bertalot – р. Арму, май–июнь, редко-часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко-нередко; октябрь, ст. 2, редко; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, редко-нередко; ключ Спотыкач, октябрь, редко; р. Малые Сибичи, октябрь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Fragilaria crotonensis Kitton – р. Арму, заводь, май, масса; р. Большая Уссурка, июнь, нередко; октябрь, ст. 2, часто.

Fragilariforma bicapitata (A. Mayer) Williams et Round – р. Арму, заводь, май, редко.

Frustulia amphipleuroides (Grunow) Cleve-Euler – р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, редко; р. Малые Сибичи, октябрь, единично.

Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni – р. Дальняя, июнь, единично; р. Обильная, май, единично; левый безымянный приток р. Арму, май, единично.

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni – р. Арму, май, единично; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, единично.

Gomphoneis olivaceum (Hornemann) Dawson ex Ross et Sims – р. Арму, июнь, нередко-масса; октябрь, ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-масса; октябрь, ст. 2, нередко; р. Обильная, май, часто; р. Малые Сибичи, октябрь, единично; р. Полуденная, май, часто; р. Микула, май, редко; р. Дальняя, июнь, нередко-очень часто; водоем в долине р. Обильная, май, очень часто.

Gomphoneis quadripunctatum (Oestrup) Dawson ex Ross et Sims – р. Арму, май–июнь, единично-часто; р. Обильная, май, единично; р. Полуденная, май, единично; р. Дальняя, июнь, часто.

Gomphonema acuminatum Ehrenberg – р. Арму, май–июнь, редко-нередко; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, нередко.

Gomphonema affine Kützing – р. Арму, май, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично; ключ Спотыкач, октябрь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst var. *angustatum* – р. Арму, май–июнь, редко-очень часто; октябрь, ст. 1, редко; ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, редко; р. Обильная, май, нередко-очень часто; р. Полуденная, май, единично; р. Крапивная, май, часто; р. Микула, май, нередко; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; ключ Спотыкач, октябрь, масса; водоем в долине р. Обильная, май, часто.

Gomphonema angustatum var. *linearis* Hustedt – р. Арму, заводь, май, редко.

Gomphonema angustum C. Agardh – р. Большая Уссурка, июнь, редко; октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Gomphonema gracile Ehrenberg – р. Большая Уссурка, июнь, редко; р. Дальняя, июнь, единично.

Gomphonema montanum Schumann var. *montanum* – р. Арму, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Gomphonema montanum var. *suecicum* Grunow – р. Арму, июнь, редко.

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing – р. Арму, май–июнь, нередко-часто; октябрь, ст. 1, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко-нередко; октябрь, ст. 2, редко; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; р. Микула, май, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, редко.

Gomphonema productum (Grunow) Lange-Bertalot et Reichelt – р. Арму, май, часто-очень часто; р. Большая Уссурка, июнь, редко-часто; р. Полуденная, май, часто; р. Обильная, май, редко; левый безымянный приток р. Арму, май, единично.

Gomphonema truncatum Ehrenberg – р. Арму, июнь, редко; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Gomphonema ventricosum Gregory – р. Арму, июнь, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Gomphonema vibrio var. *pumilum* (Grunow) R. Ross – р. Арму, июнь, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, редко; р. Полуденная, май, единично; р. Дальняя, июнь, редко-нередко.

Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst – водоем в долине р. Обильная, май, часто.

Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick var. *arcus* – р. Арму, май, редко-масса; октябрь, ст. 1, очень часто; ст. 2, редко; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-очень часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, очень часто-масса; р. Полуденная, май, масса; р. Микула, май, масса; р. Дальняя, июнь, единично-масса; р. Крапивная, май, масса; р. Малые Сибичи, октябрь, часто; ключ Спотыкач, октябрь, единично; левый безымянный приток р. Арму, май, масса; водоем в долине р. Обильная, май, очень часто.

Hannaea arcus var. *amphioxys* (Rabenhorst) Patrick – р. Дальняя, июнь, редко.

Hannaea arcus var. *rectus* (Cleve) M. Idei – р. Большая Уссурка, июнь, нередко-очень часто; р. Дальняя, июнь, единично-масса; левый безымянный приток р. Арму, май, часто-масса.

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow – р. Арму, май, единично; р. Полуденная, май, редко.

Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin et Witkowski – р. Арму, июнь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Karayevia laterostrata (Hustedt) Round et Bukhtiyarova – р. Полуденная, май, единично.

Luticola cohnii (Hilse) Mann – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Luticola mutica (Kützing) Mann – р. Микула, май, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, нередко; ключ Спотыкач, октябрь, единично.

Melosira varians C. Agardh – р. Арму, май, часто; июнь, редко; октябрь, ст. 1, редко; р. Большая Уссурка, июнь, редко; октябрь, ст. 2, часто; р. Дальняя, июнь, единично-очень часто; р. Малые Сибичи, октябрь, очень часто; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Meridion circulare (Greville) C. Agardh var. *circulare* – р. Арму, май–июнь, нередко-масса; р. Большая Уссурка, июнь, нередко-часто; р. Обильная, май, нередко; р. Полуденная, май, нередко; р. Дальняя, июнь, редко-нередко; р. Микула, май, масса; ключ Спотыкач, октябрь, единично; левый безымянный приток р. Арму, май, единично; водоем в долине р. Обильная, май, очень часто.

Meridion circulare var. *constrictum* (Ralfs) Van Heurck – р. Арму, май–июнь, нередко-часто; р. Большая Уссурка, июнь, редко; р. Дальняя, июнь, очень часто; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Navicula avenacea (Brébisson et Godey) Brébisson ex Grunow – р. Большая Уссурка, июнь, редко; р. Дальняя, июнь, редко; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Navicula cryptocephala Kützing – р. Арму, май–июнь, часто-очень часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко; октябрь, ст. 2, оч. часто; р. Обильная, май, редко; р. Полуденная, май, редко; р. Микула, май, единично;

р. Малые Сибичи, октябрь, единично; р. Дальняя, июнь, единично-часто; ключ Спотыкач, октябрь, редко; водоем в долине р. Обильная, май, нередко.

Navicula gregaria Donkin – р. Арму, заводь, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Navicula integra (W. Smith) Ralfs – р. Арму, заводь, июнь, единично.

Navicula menisculus Schumann – р. Арму, июнь, единично; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, редко; р. Дальняя, июнь, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, очень часто.

Navicula radiosa Kützing – р. Арму, май, очень часто; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, единично; ключ Спотыкач, октябрь, редко; водоем в долине р. Обильная, май, часто.

Navicula rhynchocephala Kützing – р. Арму, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Navicula slesvicensis Grunow – р. Арму, май, нередко-часто; р. Обильная, май, единично; водоем в долине р. Обильная, май, очень часто.

Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg – р. Арму, май, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко; октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, май, единично; водоем в долине р. Обильная, май, нередко.

Neidium affine (Ehrenberg) Pfitzer var. *affine* – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Neidium affine var. *ceylonicum* (Skvortzow) Reimer – р. Дальняя, июнь, единично.

Neidium dubium (Ehrenberg) Cleve (возможно var. *baicalense* Skvortzow) – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Neidium iridis (Ehrenberg) Cleve var. *iridis* – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Neidium iridis var. *diminutum* (Pantocsek) Wislouch et Kolbe – р. Дальняя, июнь, единично.

Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith – р. Большая Уссурка, июнь, нередко; октябрь, ст. 2, часто; р. Дальняя, июнь, редко.

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко; р. Полуденная, май, единично; ключ Спотыкач, октябрь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Nitzschia linearis (C. Agardh) W. Smith – р. Арму, май, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко; ключ Спотыкач, октябрь, нередко; р. Малые Сибичи, октябрь, единично; р. Обильная, май, единично; водоем в долине р. Обильная, май, редко.

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith – р. Арму, май–июнь, редко-очень часто; октябрь, ст. 1, единично; р. Большая Уссурка, июнь, часто; октябрь, ст. 2, часто; р. Дальняя, июнь, редко-очень часто; ключ Спотыкач, октябрь, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, очень часто; р. Обильная, май, редко; р. Микула, май, единично;

р. Полуденная, май, нередко; р. Крапивная, май, единично; водоем в долине р. Обильная, май, масса.

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow – р. Дальняя, июнь, нередко.

Pinnularia grunowii Krammer – р. Арму, июнь, единично; р. Большая Уссурка, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Pinnularia mesogongyla Ehrenberg – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve – р. Большая Уссурка, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Pinnularia rhombarea var. *biundulata* (O. Müller) Krammer – р. Арму, май, единично.

Pinnularia subgibba Krammer – р. Дальняя, июнь, единично.

Pinnularia sudetica Hilse – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg – р. Арму, май, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Placoneis elginensis (Gregory) Cox – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Placoneis gastrum (Ehrenberg) Mereschkowsky – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Planothidium haynaldii (Schaarschmidt) Lange-Bertalot – р. Арму, май–июнь, редко; р. Дальняя, июнь, редко.

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot f. *lanceolatum* – р. Арму, июнь, редко; р. Большая Уссурка, июнь, часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, редко; р. Микула, май, редко; р. Малые Сибичи, октябрь, редко.

Planothidium lanceolatum f. *ventricosa* (Hustedt) Bukhtiyarova – р. Арму, заводь, май, единично; р. Микула, май, редко; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Psammothidium bioretii (Germain) Bukhtiyarova et Round – р. Арму, май–июнь, редко; р. Дальняя, июнь, редко.; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et Stoermer – р. Арму, май–июнь, редко; октябрь, ст. 1, единично; р. Большая Уссурка, июнь, редко-нередко; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, нередко; р. Дальняя, июнь, нередко; р. Микула, май, нередко; водоем в долине р. Обильная, май, нередко.

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bertalot – р. Большая Уссурка, июнь, единично.

Rossithidium linearis (W. Smith) Round et Bukhtiyarova – р. Арму, май–июнь, редко-нередко; октябрь, ст. 1, часто; р. Большая Уссурка, июнь, редко-очень часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, редко; р. Дальняя, июнь, редко; р. Микула, май, единично.

Sellaphora laevissima (Kützing) Mann – р. Арму, май, редко; июнь, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Stauroneis anceps Ehrenberg – р. Арму, заводь, май, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, единично.

Stauroneis phoenicenteron Ehrenberg – р. Арму, май, единично.

Staurosira construens Ehrenberg f. *construens* – р. Арму, заводь, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично.

Staurosira construens f. *venter* (Ehrenberg) Bukhtiyarova – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Staurosirella leptostauron (Ehrenberg) Williams et Round – р. Арму, заводь, май, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, единично.

Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams et Round – р. Арму, май, единично.

Surirella angusta Kützing – р. Арму, май, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, единично-нередко; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Surirella biseriata Brébisson – р. Арму, июнь, единично.

Surirella brebissonii var. *kuetzingii* Krammer et Lange-Bertalot – р. Арму, май–июнь, единично-нередко; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко; р. Полуденная, май, редко.

Surirella minuta Brébisson – р. Арму, май, нередко; р. Большая Уссурка, июнь, редко; р. Дальняя, июнь, редко.

Surirella crumena Brébisson ex Kützing – р. Дальняя, июнь, единично.

Surirella pantocsekii Meister – р. Арму, июнь, единично; р. Большая Уссурка, июнь, единично; октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Surirella robusta Ehrenberg – р. Малые Сибичи, октябрь, единично.

Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Surirella tenera Gregory – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing – р. Арму, май, единично; заводь, масса; р. Большая Уссурка, июнь, часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Дальняя, июнь, нередко.

Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing – р. Арму, май, часто; заводь, масса; р. Большая Уссурка, июнь, часто; октябрь, ст. 2, единично; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, единично-нередко; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Ulnaria contracta (Oestrup) Morales et Vis – р. Арму, май, часто-очень часто; р. Обильная, май, единично; р. Дальняя, июнь, нередко-часто; р. Микула, май, очень часто; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Ulnaria inaequalis (H. Kobayasi) M. Idei – р. Арму, май–июнь, редко-масса; октябрь, ст. 1, масса; ст. 2, очень часто; р. Большая Уссурка, июнь, часто-очень часто; октябрь, ст. 2, нередко; р. Обильная, май, редко-нередко; р. Дальняя, июнь, единично-масса; р. Микула, май, единично; р. Малые Сибичи, октябрь, часто.

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère – р. Арму, май, единично-масса; октябрь, ст. 1, единично; ст. 2, единично; р. Большая Уссурка, июнь, часто; октябрь, ст. 2,

редко; р. Обильная, май, очень часто; р. Полуденная, май, часто; р. Дальняя, июнь, нередко-масса; р. Микула, май, очень часто; р. Крапивная, май, нередко; р. Малы Сибичи, октябрь, часто; ключ Спотыкач, октябрь, единично; водоем в долине р. Обильная, май, часто.

Отдел **Cryptophyta** – Криптофитовые водоросли

Cryptomonas ovata Ehrenberg – р. Арму, октябрь, редко.

Отдел **Heterokontophyta** – Разножгутиковые водоросли

Dinobryon sertularia Ehrenberg – р. Арму, заводь, май, очень часто.

Epiyxis utriculus (Ehrenberg) Ehrenberg – р. Арму, заводь, май, нередко.

Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan – р. Арму, май, масса; р. Обильная, май, масса; р. Крапивная, май, масса; р. Микула, май, часто-масса; р. Дальняя, июнь, масса; левый безымянный приток р. Арму, май, масса.

Ophiocytium parvulum A. Braun – р. Арму, заводь, май, нередко.

Tribonema aequale Pascher – р. Арму, май, нередко.

Tribonema viride Pascher – р. Арму, май, очень часто.

Tribonema vulgare Pascher – р. Арму, май, редко-очень. часто.

Vaucheria sp. ster. – р. Большая Уссурка, июнь, масса.

Отдел **Charophyta** – Харовые водоросли

Closterium acerosum (Schränk) Ehrenberg – р. Арму, май, единично.

Closterium diana Ehrenberg – водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Closterium parvulum Nägeli – р. Арму, июнь, единично.

Closterium tumidum Johnson – водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Cosmarium formosulum Hoff – р. Арму, июнь, единично; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Cosmarium punctulatum Brébisson – р. Арму, май, единично; р. Большая Уссурка, июнь, единично; р. Дальняя, июнь, редко.

Cosmoastrum punctulatum (Brébisson) Palamar-Mordvintseva – р. Арму, заводь, май, единично.

Klebsormidium rivulare (Kützing) Morison et Sheath – р. Арму, май, масса.

Koliella tatrae (Kol) Hindák – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, редко.

Mougeotia sp. ster. – р. Арму, июнь, редко.

Spirogyra sp. ster. – р. Арму, май, единично-часто; р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, редко; водоем в долине р. Обильная, май, единично.

Отдел **Chlorophyta** – Зеленые водоросли

Chaetophora elegans (Roth) C. Agardh – р. Большая Уссурка, июнь, масса.

Draparnaldia plumosa (Vaucher) C. Agardh – р. Большая Уссурка, июнь, масса.

Microspora pachyderma (Wille) Lagerheim – левый безымянный приток р. Арму, май, масса.

Oedogonium sp. ster. – р. Арму, июнь, редко.

Scenedesmus acutus Meyen – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Scenedesmus apiculatus (W. West et G.S. West) Chodat – р. Большая Уссурка, октябрь, ст. 2, единично.

Stigeoclonium subsecundum (Kützing) Kützing – р. Дальняя, июнь, нередко.

Stigeoclonium thermale A. Braun – р. Арму, май, единично.

Ulothrix tenuissima Kützing – р. Арму, май–июнь, единично-часто; октябрь, ст. 1, нередко; р. Полуденная, май, масса; р. Обильная, май, масса; р. Микула, май, нередко; р. Дальняя, июнь, нередко-часто.

Ulothrix zonata (Weber et Mohr) Kützing – р. Арму, май, нередко-масса; р. Большая Уссурка, июнь, часто; р. Крапивная, май, часто-масса; р. Обильная, май, нередко-масса; р. Микула, май, часто; р. Дальняя, июнь, нередко-масса.

Отдел **Rhodophyta** – Красные водоросли

Audouinella chalybea (Roth) Borg – р. Большая Уссурка, июнь, нередко; р. Дальняя, июнь, редко.

Отдел **Euglenozoa** – Эвгленовые водоросли

Phacus caudatus Hübner – р. Арму, май, единично.

Rhabdomonas costata (Korschikov) Pringsheim – ключ Спотыкач, октябрь, единично.

Trachelomonas intermedia Dangeard – р. Арму, май, редко.

Vacuolaria virescens Cienkowski – ключ Спотыкач, октябрь, нередко.

Таким образом, в водотоках рек Большая Уссурка, Дальняя и Арму обнаружено 10 видов цианобактерий и 153 вида водорослей из семи отделов (включая разновидности и формы – 162). По своей экологической пластичности, масштабам географического распространения и уровню биопродуктивности водоросли не имеют аналогов. Поскольку изменения, происходящие в водных экосистемах, отражаются, прежде всего, на составе альгоценозов, можно утверждать, что на стадии формирования как ООПТ национальный парк «Удэгейская легенда» по относительно слабой нарушенности природных комплексов мог быть сравним с заповедными территориями Приморского края. Дальнейшие исследования альгофлоры дадут подлинную картину и оценку произошедших изменений.

ГЕРПЕТОФАУНА

В бассейне верхнего и среднего течения р. Большая Уссурка, территория которого входит в состав национального парка «Удэгейская легенда», специальные герпетологические исследования ранее не проводились. Попутные сборы отдельных видов амфибий и рептилий носят единичный характер. В архиве парка хранятся несколько фотографий 2009 г., сделанных А.Б. Мурыгиным и О.М. Соколовой, которые, проводя на территории парка фотосъёмку природных объектов, повстречали несколько видов амфибий и рептилий. Фрагментарную информацию по распространению в парке отдельных видов амфибий и рептилий нам любезно предоставили сотрудники лесного отдела ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Л.А. Сибирина, Г.А. Гладкова и Г.Н. Бутовец, которые работали на его территории в течение 2014–2017 гг. Отсутствие серьёзных герпетологических работ привело к тому, что инвентаризацию представителей данных классов животных мы начали практически с нулевой отметки. Сбор первоначальной информации выполнен путём опроса специалистов-биологов, работавших ранее на исследуемой ООПТ. В конце мая 2017 г. были проведены специализированные полевые герпетологические исследования в юго-западной части «Удэгейской легенды». Достоверно отмечено 5 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся. По ряду видов была собрана информация о распространении и отдельных аспектах биологии. Систематика земноводных в настоящей работе приводится по международной герпетологической интернет-базе данных (Frost (ed.), 2018), систематика пресмыкающихся – по Э.В. Аднагулову (2017).

Класс *Amphibia* – Земноводные

Отряд *Caudata* Fisher et Waldheim, 1813 – Хвостатые земноводные

Семейство *Hynobiidae* Cope, 1859 – Углозубы

Род *Salamandrella* Dybowski, 1870 – Сибирские углозубы

Salamandrella tridactyla (Nikolsky, 1905) – приморский углозуб

Длина до 130 (чаще 86–122) мм, из которых около половины приходится на хвост. Хвост самок короче, чем самцов. Голова широкая, приплюснутая; хвост, сжатый с боков, лишён кожистых плавниковых складок. Конечности четырёхпалые, реже трёхпалые. Кожа гладкая. Окраска обычно тёмная, серо-коричневая или буроватая с широкой светлой продольной полосой на спине. Очень сходен с *S. keyserlingii*, но имеются некоторые отличия в размерах тела (в среднем меньше, чем *S. keyserlingii*, но различия в исследованных выборках достоверны лишь между самцами), относительной длине хвоста, относительной длине конечностей, числе костальных борозд по бокам тела (12–14), изменчивости числа пальцев (чаще попадаются трёхпалые особи) и структуре полового диморфизма (Дунаев, Орлова, 2017; Кузьмин, 2012).

Известен для Приморского края, Еврейской АО, южных районов Хабаровского края, востока Маньчжурии и севера Корейского полуострова. Точные границы

ареала не определены (Аднагулов, 2017; Кузьмин, 2012). Живёт среди опавшей листвы, под корой поваленных деревьев и камнями недалеко от водоёмов (Дунаев, Орлова, 2017).

В парке встречается повсеместно, населяет различные типы биотопов, в том числе влажные хвойные, смешанные и лиственные леса, где занимает самые разнообразнейшие станции.

Обычен, местами многочислен. В период размножения отмечался на нерестовых водоёмах в долине р. Большая Уссурка в районе Лаулинского перевала, по Якову ключу, по старицам затона ключа Широкий. В среднем насчитывалось 7,49 кладок на 1 м². Высокая численность на икрометании наблюдалась по Якову ключу (до 20,0 кладок на 1 м²).

На обследованной территории выход с зимовки *S. tridactyla* происходит не раньше последних чисел апреля. Сразу после схода снега углозубы идут в воду для размножения, используя для этого небольшие постоянные и временные водоёмы, придорожные каналы, изредка мелкие ручейки с медленным течением и наличием бочажков. Температура воды в начале размножения углозуба составляет +4–5 °С и ниже (Кузьмин, Маслова, 2005). Период икрометания обычно длится 3–4 недели. В парке начало икрометания углозубов приходится на начало мая, пик – на вторую половину мая. В третьей декаде мая мы наблюдали в основном кладки икры на средних стадиях развития, когда углозубы уже покинули нерестовые водоёмы. Свежие кладки икры были обнаружены только в районе Лаулинского перевала в бочажке холодного затенённого ключика (25.05.17 г.). Там же, на дне водоёма, находилась одна половозрелая (ad.) особь углозуба.

Суточная активность взрослых *S. tridactyla* в период размножения меняется в ходе сезона. В начале животные бывают активны в светлое время (с 10–11 до 18–19 ч). Затем активность смещается на сумерки, а в конце периода размножения, когда вода днём слишком нагрета, – на ночь. Самка прикрепляет икрятные мешки на погружённые в воду веточки, травинки или коряги на глубину 5–50 см. Кладка имеет вид пары прямых или спирализованных икрятных мешков, соединённых между собой коротким слизистым стебельком, служащим для прикрепления их к субстрату. Ко времени дробления икры стенки мешков становятся гладкими, а их длина увеличивается. С продолжающимся удлинением мешки спирализовываются в 1–1,5 оборота (Кузьмин, 2012). Часто на одном растении или ветви рядом располагаются несколько кладок, отложенных разными самками. Каждый мешок содержит в себе 10–85 икринок. В среднем одна кладка содержит около 80 яиц (Ярцев и др., 2016). Личинки лимнофильные, имеют хорошо выраженную спинную плавниковую складку. Скорость их развития зависит от температуры воды. В затенённых лесных водоёмах метаморфоз может затянуться до сентября.

Активность углозубов сумеречная и ночная. Личинки питаются планктонными рачками и личинками комаров. В период метаморфоза они не перестают питаться, хотя интенсивность снижается. Сеголетки и взрослые особи питаются почвенными беспозвоночными (черви, лёгочные моллюски, насекомые), хотя при случае охотятся и в воде. Половая зрелость наступает на третьем году жизни.

Максимальная продолжительность жизни достигает 23 лет. На зимовку углозубы уходят в конце сентября–октябре. Они зимуют на суше (чаще всего в гниющих стволах упавших деревьев, щелях в почве, иногда на большой глубине) группами по 5–10 особей, иногда поодиночке. Места зимовок взрослых углозубов располагаются в непосредственной близости от водоёмов (Дунаев, Орлова, 2017; Кузьмин, Маслова, 2005).

Угрозы для вида – потеря и деградация среды обитания (загрязнение почвы и нерестовых водоёмов). В настоящее время охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края (Maslova, 2016).

Отряд **Anura** Fischer von Waldheim, 1813 – **Бесхвостые земноводные**
Семейство **Bombinatoridae** Gray, 1825 – **Жерлянки**

Род **Bombina** Oken, 1816 – **Жерлянки**

Bombina orientalis (Boulenger, 1890) – дальневосточная жерлянка

Мелкое бесхвостое земноводное с длиной тела от 28 до 53 мм, в среднем – 39,9 см. Кожа спины с высокими и острыми бугорками. Брюхо гладкое с мелкими бугорками в области клоаки. Окраска верхней части тела разных особей коричневых или зелёных оттенков, иногда с тёмными пятнышками. Нижняя сторона красная, оранжевая или красно-оранжевая (изредка жёлтая) с чёрными пятнами неправильной формы, образующими крупный узор. Концы пальцев сверху красные или оранжевые. Самцы не имеют резонаторов и отличаются от самок наличием брачных мозолей на первом и втором пальцах передних конечностей. В «Удэгейской легенде» отмечается только лесная форма дальневосточной жерлянки *B. orientalis silvatica*, отличающаяся от луговой *B. orientalis praticola* как внешним видом, так и образом жизни (Коротков, 1972).

Населяет Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, большую часть Приморского края и отдельные места на юге Хабаровского края (Кузьмин, 2012). Лесная форма описываемого вида обитает в основном в хвойно-широколиственных, реже в чёрнопихтовых, дубовых и других лиственных лесах. Для откладки икры использует небольшие, мелкие, хорошо прогреваемые водоёмы с редкой растительностью и стоячей водой. В период размножения ведёт полуводный образ жизни, затем обитает на суше (Коротков, 1972).

В парке в типичных местообитаниях *B. orientalis* встречается повсеместно. В верховьях р. Большая Уссурка по долинным участкам обычна, местами многочисленна, в горах более редка. В начале периода размножения жерлянок на маршруте в 1 км можно встретить до 32 экз. По нерестовым водоёмам плотность в среднем 0,73 особи на 1 м².

Являясь термофильным видом, дальневосточная жерлянка покидает места зимовок позднее большинства других амфибий. В парке начало ее массового выхода в нерестовые водоёмы было зафиксировано в конце мая (26.05.17 г.). В это время почва уже хорошо прогрета, и показатели температуры воздуха в ночное время достигают значений + 10 °С. Период икрометания сильно растянут, даже в пределах одной популяции. У *B. orientalis*, обитающих в верховьях р. Большая

Уссурка, он начинается в последних числах мая и «волнами» продолжается до третьей декады июля. Мы зафиксировали первых жерлянок в амplexусе в утренние часы 26.05.2017 г. на участке дороги между кордоном «Корейский» и затоном ключа Широкий. Массовое токование и спаривание начались в этот же день после 15:00, когда воздух прогрелся выше 25 °С. Первые кладки икры были отмечены 29.05.2017 г. в дорожных водоёмах у подножья Лаулинского прижима. Все обнаруженные нерестовые водоёмы располагались под несомкнутым пологом леса на хорошо или частично освещённых участках (придорожные кюветы, дорожные лужи, колеи, ямы и т.п.).

Икра откладывается несколькими порциями неправильной формы от 2 до 45 шт. в каждой, иногда поодиночке. Суммарно одна самка откладывает 130–200 икринок, прикрепляя их к водной растительности, камням или ко дну. Эмбриональное развитие длится 5–7 суток. Головастики появляются в начале июня–конце июля. Развитие до метаморфоза занимает 50–55 суток. Выход сеголетков на сушу начинается с третьей декады июля и продолжается до сентября. Половая зрелость наступает при длине тела около 30 мм. Максимальная продолжительность жизни составляет 20 лет (Коротков, Короткова, 1981; Кузьмин, Маслова, 2005).

Суточный пик репродуктивной активности приходится на дневное время. В пострепродуктивный период жерлянки ведут скрытный образ жизни. Они активны в сумерках и ночью, днём прячутся в лесную подстилку, под камни, валежник или в норы грызунов. Головастики поедают детрит, водоросли, водные растения, в меньшей мере простейших и мелких рачков. Питание наземными беспозвоночными начинается до завершения метаморфоза, когда у жерлянок ещё имеется остаток хвоста. Взрослые особи поедают в основном сухопутных беспозвоночных, в период икрометания – преимущественно водных беспозвоночных. На зимовку уходят в конце сентября–октябре. Зимуют на суше в трухлявых пнях, кучах камней и листве, иногда в ручьях – одиночно или группами до 6 особей (Кузьмин, 2012).

Данных об антропогенном прессе на *B. orientalis* мало. Это вид, который хорошо приспособляется к жизни в сельскохозяйственном ландшафте. Угрозы для вида – потеря и деградация среды обитания (загрязнение водоёмов, вырубка лесов), гибель на дорогах во время сезонных миграций. С конца 1990-х гг. в Приморье происходит массовая нелегальная заготовка *B. orientalis* для медицинских целей гражданами КНР. Охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края, кроме заповедника «Ханкайский» (Кузьмин, 2012; Maslova, 2016). Внесена в Красную книгу Хабаровского края (Красная книга Хабаровского края, 2008).

Семейство **Bufo**nidae Gray, 1825 – **Жабы**

Род **Bufo** Garsault, 1764 – **Серые жабы**

Bufo gargarizans Cantor, 1842 – дальневосточная жаба

Наблюдается половой диморфизм по размерам. У самок длина тела равна 47–102 мм, у самцов – 53–77 мм. Кожа крупнобугорчатая. На вершинах бугорков имеются шипики. Сочленовные бугорки на 4-м пальце задней ноги парные.

От внутренней поверхности паротид на бока тела проходит тёмная полоса, разорванная в задней части на отдельные пятна. Цвет спины серый, коричневый, серо-оливковый или оливково-коричневый с тремя широкими продольными полосами. Брюхо грязно-белое или желтоватое без рисунка или с мелкими пятнышками в задней части. Самец также отличается наличием брачных мозолей на первом пальце передних конечностей, которые в период размножения могут развиваться также на втором или третьем пальцах, более длинными ногами, узкой головой и чаще встречающимся зеленоватым или оливковым оттенком на верхней стороне тела (Кузьмин, 2012).

Вид обитает в Японии, на северо-востоке Китая, в Корее и России, где населяет Дальний Восток на север до долины р. Амур. Широко распространена в Приморье и на Сахалине; в Приамурье – на запад до р. Зея. Северная граница ареала проходит в долине Амура и его притоков (Кузьмин, 2012). Населяет леса различного типа, а также их опушки, не избегая дубовых сопок и горных массивов, луга и поляны во влажных широколиственных лесах. Встречается и в антропогенном ландшафте – полях и огородах (Дунаев, Орлова, 2017).

В парке отмечается в своих типичных местообитаниях повсеместно. Согласно опросным сведениям и фотодокументам дальневосточная жаба является в исследуемой ООПТ обычным видом. Но мы за время проведения работ (2017 г.) встретили половозрелую особь *B. gargarizans* только один раз. Кроме того, водоёмы с её головастиками были обнаружены в районе затона ключа Широкий, а также в старице на одном из рукавов р. Большая Уссурка.

Из мест зимовок появляется в конце апреля–начале мая, когда температура почвы на глубине 20 см поднимается более чем на +7 °С, температура воздуха достигнет +16–22 °С, а воды +6–17 °С. На откладку икры идёт в глубокие, предпочтительно более 1 м, стоячие или слабо проточные водоёмы (старицы, озёра, пруды, речные рукава, канавы, заброшенные карьеры). Пары часто образуются ещё по пути в водоёмы. Амplexус подмышечный. Икрометание происходит в первой декаде мая. Икра откладывается в виде 2 икранных шнуров длиной от 1,5 до 5 м. Количество икринок в кладке от 1,2 до 12,5 тыс. шт., расположенных внутри икрального шнура в 1–3 ряда. Икранные шнуры обвиваются вокруг погружённой в воду растительности, веток и других объектов или лежат на дне. Эмбриогенез занимает 3–17 суток, личиночное развитие – 45–66 суток, в зависимости от температурного режима (Дунаев, Орлова, 2017; Кузьмин, Маслова, 2005).

В районе затона ключа Широкий мы обнаружили головастиков 26.05.17 г. на ранних стадиях развития (30–32-я стадии).

У головастиков дальневосточной жабы наблюдается своеобразное поведение (явление агрегативности) – организованное движение по водоёму колонной, состоящей из сотен особей, в течение длительного времени. Иногда фиксируются их скопления шарообразной формы, длительное время находящиеся в таком виде в толще воды (Кузьмин, Маслова, 2005). Мы отметили несколько подобных скоплений головастиков (на 34–39-й стадиях развития) в старице на западной границе парка.

Метаморфоз происходит в июле–начале августа. Длина сеголетка сразу после метаморфоза составляет 7–9 мм. Его окраска сначала тёмная, почти чёрная, затем он приобретает красно-коричневую расцветку, которая сохраняется практически до достижения половой зрелости, т.е. на 3–4-й год жизни. Средний возраст жизни составляет 5–6 лет, а её максимальная продолжительность достигает 11 лет (Кузьмин, 2012).

Дальневосточная жаба активна в утренних и вечерних сумерках и ночью. В пик репродуктивного периода токующие самцы и пары в амplexусе наблюдаются и в дневное время (наши данные). В пострепродуктивный период в дневное время они чаще всего укрываются в лесной подстилке, норах грызунов, под упавшими деревьями, в пустотах между корнями, а также в небольших, самостоятельно выкопанных норках. Взрослые особи питаются насекомыми, преимущественно жуками и перепончатокрылыми. Муравьи составляют очень важный компонент пищи, как и у многих других видов жаб. В меньших количествах потребляют моллюсков, многоножек, паукообразных. На зимовку уходят в конце сентября–октябре. Зимуют в норах грызунов, пустотах между корнями деревьев, под брёвнами в облесённых участках, подвалах, погребах. Иногда могут зимовать в реках и озёрах на глубине 1–1,5 м (Кузьмин, 2012).

Угрозы для вида – потеря и деградация среды обитания из-за загрязнения водоёмов, верховых и низовых пожаров, гибель на дорогах во время сезонных миграций. С конца 1990-х гг. в Приморье происходит регулярный нелегальный сбор этого вида для китайской и корейской традиционной медицины. Охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края (Maslova, 2016).

Семейство *Hylidae* Rafinesque, 1815 – Квакши

Род *Dryophytes* Fitzinger, 1843 – Дриофитес

Dryophytes japonicus (Günther, 1859) – дальневосточная квакша

Самое маленькое бесхвостое земноводное в Приморском крае: длина тела составляет 31–52 мм. Кожа спины гладкая, брюха – зернистая, сверху обычно без пятен. Окраска варьирует от ярко-зелёной до оливковой, светло-серой или бурой (в зависимости от цвета субстрата и температуры), иногда с тёмными пятнами. По бокам тела проходит тёмная полоса, которая может распадаться на точки и частично редуцироваться. Под глазом имеется тёмное пятно. Самцы имеют брачные мозоли на первом пальце передней ноги и одиночный крупный горловой резонатор, который в период покоя виден в виде мелких морщинистых складок на горле; обычно мельче самок (Кузьмин, Маслова, 2005; Дунаев, Орлова, 2017).

Вид обитает в Японии, на Корейском полуострове, в Северо-Восточном и Центральном Китае, северной части Монголии и на юго-востоке России – от Забайкалья до Приморья, Сахалина и южных Курильских островов. Населяет смешанные и широколиственные леса, заросли кустарников, луга и болота, меньше – лесостепь. В беслесных районах наблюдается в основном в старичных поймах, заросших кустарником (Кузьмин, 2012).

В парке обычный, местами многочисленный вид встречается в большинстве биотопов, исключая хвойные горные леса и гольцовые участки. В конце мая, в начале периода размножения *D. japonicus*, на маршруте отмечалось до 32 экз. на 1 км, по нерестовым водоёмам в среднем 0,73 особи на 1 м².

В среднем и верхнем течении р. Большая Уссурка дальневосточная квакша появляется после зимовки на нерестовых водоёмах во второй половине мая, когда ночная температура воздуха поднимается более +10 °С. Сначала выходят самцы, а затем через несколько суток – самки. Период размножения растянут с конца мая–начала июня до третьей декады июля. В 2017 г. начало токования самцов было отмечено 26 мая, когда дневная температура поднялась выше 22 °С, а температура воды – выше +16 °С. Первые самки, идущие к нерестовому водоёму, были зафиксированы 27 мая в районе кордона «Корейский».

Хоровое токование квакш продолжается до третьей декады июля, позднее раздаются только одиночные крики. Икрометания не происходит. Начало брачного токования приходится на вечернее время, начиная приблизительно с 21:00, и продолжается первую половину ночи до 00:03–00:04 (Кузьмин, Маслова, 2005). В 2017 г. начало токования *D. japonicus* фиксировалось с 26 по 29 мая в окрестностях кордона «Корейский» в промежуток с 20:40 до 21:00 ч.

В период икрометания квакши концентрируются вокруг нерестовых водоёмов, предпочитая стоячие, мелкие с хорошо прогреваемой водой. Самцы токуют как сидя на грунте вокруг водоёма, так и непосредственно в воде. При наступлении засушливой погоды процессы спаривания и икрометания могут временно прекращаться и возобновляться после прохождения осадков. Самка откладывает икру в основном в ночное время одиночно или комками. Кладки недавно отложенной икры плавают по поверхности нерестового водоёма, иногда крепятся к отдельным травинкам или веточкам, расположенным на поверхности воды или под ней. В них насчитывается от 7 до 134 яиц, в среднем 24,4 икринки. Общий средний объём кладки составляет 341–500 икринок (Кузьмин, 2012). Первые кладки икры на территории парка были обнаружены утром 28.05.2017 г. в окрестностях кордона «Корейский», т.е. она была отложена накануне ночью.

Продолжительность эмбрионального периода 2–4 суток, личиночного – от 1 до 1,5 месяца. Длина тела сеголетка сразу после метаморфоза 8–12 мм. Половая зрелость наступает на 3–4-м году жизни. Продолжительность жизни составляет 4–6 лет, а максимальный возраст достигает 11 лет (Кузьмин, 2012; Дунаев, Орлова, 2017).

Дневное время дальневосточная квакша проводит на травянистых растениях, кустарниках и подросте в подлеске, где её сложно заметить. Взрослые особи активно ловят добычу в сумерках. В состав их питания входят ночные насекомые, пауки, моллюски, многоножки и т.п. На зимовку уходят в сентябре–начале октября. Зимуют на суше: в почве, листовом опаде, норах грызунов, иногда в дуплах, под камнями и т.п. (Дунаев, Орлова, 2017).

Угрозы для вида – потеря и деградация среды обитания из-за загрязнения водоёмов и вырубki лесов, гибель на дорогах во время сезонных миграций.

Охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края (Maslova, 2016).

Семейство **Ranidae** Batsch, 1796 – **Лягушки**

Род **Rana** Linnaeus, 1758 – **Настоящие (бурые) лягушки**

Rana dybowskii Günther, 1876 – дальневосточная лягушка

Длина тела 36–96 мм. Спина почти гладкая, бока и бедра гладкие. Спинно-боковые складки обычно узкие. Височное пятно большое. Сверху сероватая, бурая, коричнево-оливковая с тёмными пятнами, которые иногда отсутствуют. В затылочной области часто присутствует треугольное пятно, направленное вершиной угла вперёд. Внешняя поверхность задних ног с тёмными поперечными полосами. Нижняя поверхность задних ног с бледным оранжево-розовым оттенком. Самцы обычно мельче самок, имеют резонаторы и брачные мозоли на 1-м пальце передней конечности, горло и брюхо бело-желтоватое, иногда с голубым оттенком. В нижней части брюха у самцов бывают тёмные пятна, горло белое. В отличие от самцов, у самок брюхо, часто и горло с красноватыми, коричневатými или розово-желтоватыми пятнами, чередующимися с голубыми пятнами; иногда самка коричневато-красная. В период размножения окраска самцов и самок становится ярче (Кузьмин, 2012).

Встречается в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове, на юго-востоке Восточной Сибири, в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Вид населяет преимущественно широколиственные, кедрово-широколиственные, хвойные и долинные лиственные леса (Кузьмин, 2012). В национальном парке «Удэгейская легенда» дальневосточная лягушка многочисленна и обитает повсеместно. В различных типах лесных водоёмов долины р. Большая Уссурка, на р. Малая Пихтовка и в пойменной части Якова ключа в 2017 г. наблюдалось большое количество ее головастиков.

Выход с зимовок, которые находятся в лесных горных речках и ручьях, у *R. dybowskii* в парке начинается с середины апреля и совпадает с окончательным сходом снежного покрова и образованием временных водоёмов. В это время дневная температура достигает +8–11 °С. Самцы приходят на нерестовые водоёмы раньше самок на 2–3 дня. Для икрометания выбирают мелкие, хорошо прогреваемые стоячие или медленно текущие водоёмы, особенно в начале периода размножения при суммарно низких температурах воздуха и воды. На поздних этапах размножения икра отчается также в глубоких затенённых лесных водоёмах (старницах, речных рукавах и т.п.). Период икрометания растянут со второй половины апреля до середины мая. Пары часто образуются ещё по пути в нерестовые водоёмы. Первые кладки икры делаются в прибрежной зоне хорошо освещённых и прогреваемых солнцем различных водоёмов – лесных луж, канав, изолированных участков старых русел ручьёв и речек. Это ведёт к большой смертности развивающихся эмбрионов. В начале периода размножения икрометание происходит и в дневное время, затем репродуктивная активность перемещается на вечерние

и ночные часы. С повышением температуры воздуха икрой заполняются и затемнённые лесные водоёмы (Кузьмин, Маслова, 2005).

В кладке 430–4000 яиц, в среднем 1200–2200, откладываемых одним большим комком, его диаметр после набухания 15–30 см. Продолжительность эмбрионального развития от 3 до 18 суток в зависимости от температуры (Кузьмин, 2012). Выклев первых головастиков *R. dybowskii* в верховьях р. Большая Уссурка зафиксирован в первой половине мая. В третьей декаде мая 2017 г. головастики дальневосточной лягушки на средних стадиях развития мы отмечаем в затоне ключа Широкий и у Лаулинского прижима (стадии 33–38-я). По нерестовым водоёмам, расположенным в пойме Якова ключа с северной экспозиции склона сопки и, как следствие, с большей затенённостью и более низкими температурными показателями, часть головастиков находилась на ранних стадиях развития (стадии 30–32-я).

Продолжительность личиночного периода от 23 до 65 суток. В нерестовых водоёмах с холодной водой метаморфоз может затянуться до первой декады сентября. Первые сеголетки появляются на суше в третьей декаде июня. Их длина в это время составляет 12–21 мм. Половая зрелость наступает на 2–3-й год жизни. Максимальный возраст оценён в 7–8 лет (Кузьмин, 2012).

На суше дальневосточная лягушка активна ранним утром, вечером и в первой половине ночи, но регулярно встречается и днём (Кузьмин, 2012). В конце мая 2017 г. взрослые особи уже покинули места размножения и разошлись по лесу. На маршрутах по пойменным участкам, при обследовании нерестовых водоёмов, мы фиксировали дальневосточных лягушек крайне редко. В пойме Якова ключа 25 мая на 2 км маршрута было отмечено только две лягушки – самка и неполовозрелая особь (sad.) *R. dybowskii*; 26 мая на 5 км маршрута встретился только 1 самец. При этом, проходя маршруты по лесным склонам, на 1 км пути мы наблюдали от 1 до 2 ad. и sad. особей вида. Сходную встречаемость дальневосточных лягушек на склонах сопки в окрестностях кордона «Корейский» наблюдали Г.А. Гладкова и Л.А. Сибирина (сотрудники лесного отдела ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН). В последние дни мая 2017 г. значительно повысилась дневная температура воздуха – до +26–28 °С. Это привело к частичной миграции лягушек в более увлажнённые участки леса. Так, 28 мая на прибрежной полосе устьевой части р. Малая Пихтовка, поросшей низкой травой, фиксировалось (в среднем) 5–6 экз. sad. *R. dybowskii* на 1 км маршрута.

В состав питания головастиков дальневосточной лягушки входят детрит, водоросли, водные растения, в меньшей мере простейшие, мелкие рачки и кладки углозуба. Взрослые особи кормятся различными беспозвоночными животными, поедая чаще всего жуков, гусениц, пауков, моллюсков и дождевых червей (Дунаев, Орлова, 2017).

На зимовку *R. dybowskii* уходит в октябре, когда первые морозы достигают –7 °С, но максимальная дневная температура ещё может подниматься до +20 °С. Зимует под водой, в основном в быстро текущих реках и ручьях с каменистым дном, по «зимовальным» ямам, иногда крупными скоплениями до

нескольких тысяч особей. Для лягушек, зимующих в водоёмах, опасны массовые заморы, возникающие при падении уровня воды и промерзании водоёмов до дна. Возможны зимовки на суше, например в листовом опаде, при этом для них губительны сильные морозы (Кузьмин, Маслова, 2005).

Угрозы для вида – потеря и деградация среды обитания в связи с загрязнением водоёмов и вырубкой лесов, гибель на дорогах во время сезонных миграций. Наибольшая опасность – браконьерский сбор. Дальневосточная лягушка в массе собирается браконьерами и переправляется в Китай для фармакологических потребностей. Охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края, кроме Ханкайского заповедника (Maslova, 2016).

Таким образом, в настоящее время достоверно известно, что на территории парка обитает 5 видов земноводных, относящихся к 5 родам, 5 семействам и 2 отрядам. Также в данной ООПТ по широким долинным участкам среднего течения р. Большая Уссурка с травянистой и кустарниковой растительностью и наличием стоячих водоёмов в незначительной степени возможно нахождение небольших «островных» (изолированных) популяций таких видов, как сибирская лягушка *Rana amurensis* Boulenger, 1886 и чёрнопятнистая лягушка *Pelophylax nigromaculatus* (Hallowell, 1861), которые ранее достоверно отмечались ближе к устьевой части реки (Емельянов, 1929; Коротков, 1974).

Класс Reptilia – Пресмыкающиеся

Отряд Squamata Oprel, 1811 – Чешуйчатые

Подотряд Sauria Mccarthy, 1802 – Ящерицы

Семейство Lacertidae Oprel, 1811 – Настоящие ящерицы

Род Takydromus Daudin, 1802 – Долгохвостки

***Takydromus amurensis* Peters, 1881 – амурская долгохвостка**

Длина тела – до 7,6 см. У взрослых ящериц хвост не менее чем в два раза длиннее туловища, тогда как у сеголеток он превышает длину тела в среднем в 1,6 раза (Портнягина, Маслова, 2017). Вес самцов достигает 5,4, а самок – 8,2 г (Коротков, 1985). Устойчивым определительным признаком является количество бедренных (паховых) пор. Наиболее часто отмечаются особи с тремя и четырьмя парами пор. Окраска сверху обычно коричневого, светло-коричневого, бурого, реже оливкового цвета, иногда с тёмными неправильной формы пятнами на спине. По бокам тела иногда тянется с переходом на хвост широкая тёмная, иногда почти чёрная полоса. По бокам шеи расположена короткая, иногда прерывистая светлая полоска. Снизу окраска синевато-зелёная или беловатая с жёлтым отливом; горло светлее. Молодые особи окрашены темнее взрослых.

Населяет Северо-Восточный Китай, Корею и о-в Цусима в Японии (Ананьева и др., 2004). В России достоверно встречается в Приморском крае, где широко распространена на севере до бассейна р. Бикин. По данным Ю.М. Короткова (1985), по западным отрогам Сихотэ-Алиня амурская долгохвостка якобы встречается до р. Амур, т.е. в Хабаровском крае, что подвергается сомнению (Аднагулов, 2017).

Встречается в широколиственных и кедрово-широколиственных лесах, а также в редколесьях, придерживается хорошо прогреваемых солнцем участков, в частности приречных галечников, лесных опушек и вырубков, обочин дорог и каменистых россыпей. Предпочитает склоны южной экспозиции (Portniagina, Maslova, 2019).

В парке в типичных для неё экотопах обитает повсеместно. Населяет горы и предгорья большей части территории парка; 27.05.17 3 экз. (2 ad. и 1 sad.) *T. amurensis* были зафиксированы нами на одной из осыпей, расположенных вдоль дороги на южном склоне сопки, в 1 км от кордона «Корейский». Также 29.05.17 сотрудники ФНЦ Биоразнообразие ДВО РАН отметили 1 ad. *T. amurensis* в дубняке ближе к вершине сопки, прилегающей к кордону «Корейский» (устн. сообщ., Г.А. Гладкова, Л.А. Сибирина).

Весеннее пробуждение начинается со второй половины апреля, а уход на зимовку происходит в начале октября. К спариванию приступает в конце апреля–начале мая (Портнягина, Маслова, 2017). Беременная самка *T. amurensis* была нами обнаружена в окрестностях кордона «Корейский» 28.05.17.

Яйца овальной формы, белые, их средний размер $10,6 \pm 0,1$ мм на $6,8 \pm 0,1$ мм. Инкубационный период длится 44–56 дней, а сеголетки с размером тела $23,5–25,3$ мм ($24,6 \pm 0,3$) начинают появляться в середине августа, самый ранний зафиксированный нами выход – 10 августа (Коротков, 1985; Портнягина, Маслова, 2017). Амурская долгохвостка питается различными мелкими беспозвоночными, в первую очередь пауками (Портнягина, Маслова, 2017).

В Приморском крае специальные меры охраны не требуются. В настоящее время охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края, кроме Ханкайского и Дальневосточного морского заповедников (Maslova, 2016). Занесена в третью категорию Красной книги Хабаровского края (2008) со статусом «редкий вид на периферии ареала» (Красная книга Хабаровского края, 2008).

Подотряд **Serpentes** Linnaeus, 1758 – **Змеи**
Семейство **Colubridae** Oprel, 1811 – **Ужовые**

Род **Elaphe** Fitzinger in Wagler, 1833 – **Лазяющие полозы**

Elaphe dione (Pallas, 1773) – узорчатый полоз

Наибольшие размеры: 1,0 м (Емельянов, 1929), 1,21 м (Коротков, 1985) 1,5 м. Характерна значительная вариабельность окраски и рисунка. Окраска спины серая различных оттенков, серовато-бурая, оливково-серая, красная, кирпично-красная или коричневая различных оттенков. Часто вдоль спины проходят 4 широкие, но не резко очерченные бурые полосы, из которых две средние переходят на хвост. Вдоль хребта тянутся узкие неправильной формы поперечные пятна тёмно-бурого или чёрного цвета. На голове чаще всего имеется характерный рисунок, напоминающий летящую птицу. Брюхо сероватое или бледно-желтоватое в многочисленных относительно мелких неправильных бурых или чёрных пятнах. Встречаются меланисты и однотонно окрашенные особи (Дунаев, Орлова, 2014).

Населяет значительную территорию Евразии от Украины и Поволжья до побережья Японского моря (Ананьева и др., 2004). В пределах России встречается

на юге европейской части, в южной Сибири и на юге Дальнего Востока, где имеет широкое распространение в южной и средней частях Хабаровского края, Амурской области и Приморском крае (Коротков, 1985; Дунаев, Орлова, 2017). Эвритопный вид. Места обитания чрезвычайно разнообразны: встречается в разреженных лиственных и хвойных лесах, речных поймах, кустарниковых зарослях, на огородах, в садах и межах среди полей. В лесах ведёт полудревесный образ жизни. Охотно заходит в воду, при этом прекрасно плавает и ныряет. В качестве убежищ использует норы грызунов, дупла деревьев, пустоты под камнями, трещины и промоины в почве (Емельянов, 1929; Коротков, 1985).

В подходящих биотопах парка обитает повсеместно. В 2017 г. единичные находки половозрелых особей *El. dione* мы фиксировали на следующих участках: под камнем на затоне ключа Широкий (26.05); в траве в дубняке на склоне сопки в окрестностях кордона «Корейский» (27.05); на поляне у берега р. Большая Уссурка на Усть-Арминской базе (28.05).

Активен с середины апреля. Для спаривания, которое продолжается с апреля по июль, собирается на «половых точках». Яйцекладки отмечаются с конца июня до второй половины августа. Одна самка откладывает от 2 до 24 яиц (Емельянов, 1929; Коротков, 1985). Яйца откладываются во влажную землю, перепревшую листву или труху сгнивших деревьев. Иногда несколько самок откладывают яйца в одно место, и в таких кладках обнаруживается до 120 яиц (Коротков, 1985). К моменту откладки яйца содержат хорошо развитые эмбрионы, и поэтому длительность инкубационного периода обычно не превышает 14–30 суток. Только что вышедшие из яйца молодые особи имеют длину около 20 см и по окрасу похожи на взрослых особей. Сеголетки появляются с конца июля по первую декаду октября. Половая зрелость наступает при длине тела не менее 40 см (Дунаев, Орлова, 2017; Коротков, 1985).

Основой питания являются мышевидные грызуны, а в годы депрессии мышевидных грызунов переходят на питание другими позвоночными животными (мелкие птицы, их яйца, птенцы, земноводные, рыбы, ящерицы и змеи) (Коротков, 1985). В случае опасности узорчатый полоз имитирует поведение щитомордников: производит быстрые движения кончиком хвоста, производя прерывистый своеобразный звук, напоминающий звучание трещотки; иногда меняет до треугольной формы продолговатую в спокойном состоянии голову, уплощая её; делает выпады всем телом, подобно ядовитой змее (Дунаев, Орлова, 2017; наши данные). Зимует в каменистых россыпях, норах, пустотах под корнями, часто совместно с другими видами змей (Коротков, 1985).

В Приморском крае специальные меры охраны не требуются. Но местное население часто убивает этих змей, называя их «ядовитыми медянками», щитомордниками или гадюками. В настоящее время охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края (Maslova, 2016).

Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) – амурский полоз

Самая крупная из змей региона длиной до 2 м. Голова сравнительно слабо отграничена от туловища. Окраска слабо изменчива. Верхняя сторона взрослых

особей чёрно-бурого, а чаще совершенно чёрного цвета с желтоватыми косыми поперечными полосами, которые по бокам тела раздваиваются. Брюхо одноцветно-жёлтое или жёлтое с тёмными пятнами. Молодые змеи окрашены иначе: сверху коричневатые, с широкими неправильными поперечными полосами, окаймлёнными чёрными и разделённые более узкими беловатыми полосами, чем они внешне напоминают среднего щитомордника (Коротков, 1985).

Населяет Северо-Восточный Китай и Корею, известна находка из Восточной Монголии (Ананьева и др., 2004). В пределах России обитает на территории Приморского и Хабаровского краёв до Комсомольска-на-Амуре, ЕАО и в Амурской области (Аднагулов, 2017; Дунаев, Орлова, 2017). Преимущественно лесная змея, встречающаяся на опушках, полянах, в зарослях кустарников, а также в глубине лесных массивов, нередко в деревнях, где держится под поленницами дров, в кучах сухого навоза, под соломой, на огородах, крышах и чердаках. Убежищами служат дупла деревьев, старые пни, кучи камней и норы грызунов. Встречается в различных типах леса, при этом ведёт полудревесный образ жизни. Неоднократно наблюдался на деревьях, иногда на высоте более 10 м над землёй. Выходит с зимовки во второй половине апреля. В национальном парке «Удэгейская легенда» в подходящих биотопах обитает повсеместно (Коротков, 1985).

Обычен, местами многочислен. В 2017 г. мы отмечали его в парке на следующих участках: 1 ad. *El. schrenckii* на линьке в дупле поваленного дерева на кордоне «Корейский» (24.05); 1 ad. *El. schrenckii* в дубняке ближе к вершине сопки, прилегающей к кордону «Корейский» (26.05, устн. сообщ., Г.А. Гладкова, Л.А. Сибирина); 4 ad. *El. schrenckii* на обширной поляне (около 100 x 100 м), поросшей низкой травой, у берега р. Большая Уссурка на Усть-Арминской базе (28.05). На последней точке в заброшенных строениях были обнаружены многочисленные выползки (линочные шкуры) этого вида.

В Приморье *El. schrenckii* начинают спариваться на «половых точках» с середины мая (Коротков, 1985). В «Удэгейской легенде» этот вид на спаривании был отмечен 18.06.2009. Размножается посредством откладки яиц. Одна самка откладывает от 7 до 24 яиц (Коротков, 1985), по другим данным их бывает до 30 (Емельянов, 1929). Откладка яиц происходит в основном в июле–начале августа. Яйца откладываются во влажную землю, песок, труху деревьев, кучи навоза. Молодые особи появляются в конце августа–начале сентября при длине тела от 210 до 475 мм и весе от 9,4 до 19 г. *El. schrenckii* питается мелкими млекопитающими (размером до крысы), некрупными птицами, их птенцами и яйцами. Зимует группами по 20–30 особей в дуплах деревьев, в каменистых россыпях (Дунаев, Орлова, 2017; Коротков, 1985).

В Приморском крае специальные меры охраны не требуются. В настоящее время охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края (Maslova, 2016). Занесён в третью категорию Красной книги Хабаровского края (2008) со статусом «редкий вид на периферии ареала с сокращающейся численностью» (Красная книга Хабаровского края, 2008).

Семейство *Viperidae* Laurenti, 1768 – Гадюковые змеиРод *Gloydus* Hoge et Romano-Hoge, 1981 – Азиатские щитомордники*Gloydus ussuriensis* (Emelianov, 1929) – уссурийский щитомордник

Длина тела взрослых особей обычно колеблется от 55 до 73 см, вес – до 141 г. Окраска сверху различных оттенков бурого, серого или коричневого цвета. На этом фоне по бокам туловища в той или иной мере отчётливо выделяется многочисленный ряд тёмных, разорванных сверху и снизу крупных эллиптических пятен со светлой серединой. По бокам тела на границе с брюхом имеется продольный ряд черноватых мелких пятен, расположенных на узком светлом поле, а само брюхо однотонно-серое (Дунаев, Орлова, 2017; Коротков, 1985).

Населяет Северо-Восточный Китай, северную часть Корейского полуострова и юг Дальнего Востока России от Читинской области до побережий Японского моря и Татарского пролива (Ананьева и др., 2004). В пределах России отмечен в бассейне Амура и Приморье. Эвритопный вид. Встречается как в лесных, так и в открытых биотопах. Предпочитает влажные местообитания в долинных лесах, встречается в нижней части сопок, покрытых широколиственными и кедрово-широколиственными лесами, избегает верхней части сопок, покрытых хвойниками. Весной появляется в апреле–начале мая и около полумесяца держится вблизи места зимовки, скрываясь в зимние убежища при опасности и похолоданиях. Летом от мест зимовки может удаляться на расстояние до 10 км, но осенью вновь возвращаться на старую зимовку (Коротков, 1985).

В национальном парке «Удэгейская легенда» в подходящих местообитаниях встречается почти повсеместно. Обычен, местами многочислен. В 2017 г. мы отмечали его в национальном парке на следующих участках: 1 sad. *G. ussuriensis* на дороге в 100 м от кордона «Корейский» (26.05); 1 ad. *G. ussuriensis* в дубняке ближе к вершине сопки, прилегающей к кордону «Корейский» (26.05, устн. сообщ., Г.А. Гладкова, Л.А. Сибирина); 1 ad. *G. ussuriensis* на дороге в районе затона кл. Широкий (27.05, устн. сообщ., Г.А. Гладкова, Л.А. Сибирина); 1 sad. *G. ussuriensis* с на дороге в 300 м от кордона «Корейский» (28.05); 1 sad. *G. ussuriensis* с на тропе у подножия сопки в районе Лаулинского прижима (29.05).

Спаривание происходит в апреле–мае. Оболочки яиц растворяются в половых путях самки, и молодые особи с длиной тела до 200 мм и массой 4–7 г появляются в конце августа–сентябре. У самок рождаются от 4 до 11 детёнышей (Коротков, 1985; Ананьева и др., 2004). Сезон активности заканчивается в октябре. Зимует чаще всего в каменных россыпях или подземных расщелинах скал на склонах южной экспозиции (Коротков, 1985).

Активен как в сумерках, так и днём. Питается преимущественно амфибиями, в меньшей мере мелкими грызунами. Охотно плавает и при случае ловит рыбу (Емельянов, 1929; Дунаев, Орлова, 2017). Ядовит, и в результате отравления развиваются некрозы, геморрагические отеки, обусловленные как повышением сосудистой проницаемости, так и нарушениями в системе свёртывания крови. Крайне редкие случаи смертельного исхода для человека всегда связаны с осложнением

хронических болезней: заболевания сердечнососудистой системы, цирроз печени, аллергическая реакция на отдельные компоненты змеиногo яда и т.п. Обычно для здорового человека отравление сопровождается отёком (разной степени) укушенной конечности, точечными геморрагическими кровоизлияниями, некрозом тканей в месте укуса. Как показывают архивные данные, при помещении в больницу срок протекания активной стадии болезни составляет не более 4–7 дней (Маслова и др., 2015).

Специальные меры охраны не требуются. В настоящее время охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края (Maslova, 2016). Необходим контроль со стороны соответствующих органов (таможенных, пограничных, внутренних дел) для пресечения попыток нелегального сбора и контрабанды в сопредельные азиатские страны как самих змей, так и их яда (Maslova, Lyapustin, 2005).

***Gloydus intermedius* (Strauch, 1868) – средний щитомордник**

Сравнительно крупный щитомордник плотного сложения. Общая длина тела достигает 80 см. Окраска сверху тёмная, красно-коричневая или светлее с многочисленными чередующимися коричневыми, тёмно-серыми или черными поперечными полосами, имеющими неправильные очертания. По бокам тела на границе с брюхом имеется продольный ряд тёмных пятен, иногда сливающихся с поперечными полосами в одну изломанную линию. Брюхо светло-коричневое, розоватое, иногда коричневое или однотонно-серое (Емельянов, 1929; Дунаев, Орлова, 2017).

Населяет Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров и юг Дальнего Востока России, где встречается на юге Хабаровского края (до низовьев р. Амур) и Амурской области (до Зейско-Буреинского междуречья) и в Приморском крае (Дунаев, Орлова, 2017). Обитает в горных лесах, предпочитая каменистые местообитания. Нередко населяет те же биотопы, что и уссурийский щитомордник, но менее связан с влажными местообитаниями (Коротков, 1985). В национальном парке «Удэгейская легенда» заселяет все подходящие для него местообитания, придерживаясь горных участков.

Обычен, местами многочислен. В архиве парка имеются фотографии, подтверждающие обилие *G. intermedius* на территории этой ООПТ. В мае 2017 г. мы данный вид не отметили, но следует сказать, что наши основные маршруты проходили в пойменных участках или по нижней части сопок. Обследование более удалённых, горных участков требует большего временного периода и отдельной экспедиции.

С зимовки выходит в апреле–начале мая. Спаривание происходит с середины мая, наиболее интенсивно в августе, продолжаясь и позднее, весь активный период. Молодые щитомордники в количестве от 2 до 11 рождаются в конце августа–сентябре (Коротков, 1985; Ананьева и др., 2004). Длина их тела составляет 19–25 см, а вес – 5,6–8,7 г. Половая зрелость наступает при длине тела около 50 см. Зимует средний щитомордник в россыпях и в подземных расщелинах скал на склонах гор (Емельянов, 1929; Дунаев, Орлова, 2017).

Щитомордник наиболее активен с вечера до утра, но весной и осенью нередко проявляет и дневную активность. Взрослые особи питаются в основном мелкими грызунами, в меньшей степени – ящерицами и птицами. На зимовку уходит в течение октября (Емельянов, 1929). Ядовит, укусы болезненны, но не смертельны. Крайне редкие случаи смертельного исхода для человека всегда связаны с осложнением хронических болезней: заболевания сердечнососудистой системы, цирроз печени, аллергическая реакция на отдельные компоненты змеиного яда и т.п. (Маслова и др., 2015).

Специальные меры охраны не требуются. В настоящее время охраняется во всех заповедниках и национальных парках Приморского края кроме Ханкайского заповедника (Maslova, 2016). Необходим контроль со стороны соответствующих органов (таможенных, пограничных, внутренних дел) для пресечения попыток нелегального сбора и контрабанды в сопредельные азиатские страны как самих змей, так и их яда (Maslova, Lyapustin, 2005).

Таким образом, в настоящее время для территории национального парка «Удэгейская легенда» достоверно отмечено 5 видов пресмыкающихся. Существует вероятность нахождения в пределах данной ООПТ ещё нескольких видов рептилий. Это, в первую очередь, японский уж *Hebius vibakari* (Voie, 1826), отмеченный в непосредственной близости от парка в окрестностях с. Дальний Кут (Maslova et al., 2018). Также инспектора «Удэгейской легенды» рассказывали о нескольких встречах на территории парка со змеёй, которую они называли «желтопузиком», похожей по их описанию на японского ужа. По широким долинным участкам с наличием стоячих водоёмов (стариц, озерков и т.п.) возможно существование небольших популяций «островного» типа таких видов, как корейская долгохвостка *Takydromus wolteri* (Fischer, 1885), тигровый уж *Rhabdophis lateralis* (Berthold, 1859) и краснопинный полоз *Oocatochus rufodorsatus* (Cantor, 1842), обитающих в нижнем течении р. Большая Уссурка (Коротков, 1985; Maslova et al., 2018). Для подтверждения этих предположений необходимо проведение дальнейших, более детальных исследований.

ЖУКИ-ЛИСТОЕДЫ

Жуки-листоеды (Coleoptera: Chrysomeloidea) – одна из крупнейших групп растительоядных жесткокрылых, которая в мировой фауне насчитывает 32,5 тыс. видов (Slipinski et al., 2011). Наибольшее видовое разнообразие жуков-листоедов характерно для субтропических и тропических широт, однако и в умеренных широтах фауна листоедов богата видами. В биоценозах они занимают одно из ведущих мест по численности. В настоящее время на территории Дальнего Востока России известно более 500 видов листоедов, из них для Приморского края – около 400 (Сергеев, 2018а). Ежегодно регистрируются находки новых родов и видов не только для региональных фаун, но и для науки (Медведев, 2010; Мосейко, 2017; Cho et al., 2016; Sergeev, 2019; и др.). Территория юга Дальнего Востока России не является исключением.

Благодаря своей многочисленности, тесной связи с кормовыми растениями и растительными сообществами жуки-листоеды являются удобным объектом для изучения различных экологических процессов, происходящих в природе. Среди листоедов известно большое число видов, вредящих сельскохозяйственным и лесным культурам, а также декоративным растениям и зерновым запасам. Ряд видов известен как опасные карантинные виды (Ижевский, 1995; Егоров, 1996; Мацишина, 2012; Сергеев, 2018б; Орлова-Беньковская, 2019; и др.).

Естественно, что наибольшее разнообразие видов листоедов выше в тех местах, которые максимально изъяты из хозяйственной деятельности. Известно, что природа и природные ресурсы Приморского края испытывают мощное антропогенное воздействие последние три десятилетия. При этом во многих ООПТ фауна, в том числе и фауна жуков-листоедов, остается крайне неравномерно изученной, а в ряде заповедных объектов – не изученной вообще. В настоящее время лишь в двух заповедниках Приморского края видовой состав листоедов выявлен в достаточно полном объеме. В Лазовском заповеднике известно около 230 видов листоедов (Легалов, 2009; Михайлов, Чащина, 2009; Медведев, 2010; Сергеев, 2018а), в Сихотэ-Алинском – более 210 (Сергеев, 2015, 2016а, 2018а, 2019). По фауне листоедов других ООПТ Приморского края, в том числе и национального парка «Удэгейская легенда», в настоящее время существуют лишь фрагментарные сведения.

В основу работы положен материал, собранный автором на исследуемой территории в 2014–2015 гг. в долинных лесах и пойменных лугах рек Большая Уссурка и Арму. Основной материал хранится в коллекции ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток. Также обобщены литературные данные, посвященные данной теме и опубликованные ранее (Сергеев, 2015, 2018, 2019). В работе также использованы коллекционные материалы: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (г. Владивосток) и Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) (далее в тексте – ЗИН). Распространение указанных ниже видов сверено по ряду опубликованных данных (Медведев, 1992, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014; Беньковский,

2015; Wieńkowski, 2004, 2019; Легалов, 2009; Михайлов, Чащина, 2009; Döberl, 2010; Сундуков, 2011; Сергеев, 2015, 2016а, б, 2017; Cho et al., 2016; Sergeev, 2019). Информация о кормовых растениях приведена согласно следующим публикациям (Медведев, 1992; Медведев, Рогинская, 1988; Егоров, 1996). В настоящее время мы располагаем сведениями о 52 видах жуков-листоедов из 32 родов, относящихся к 9 подсемействам и 1 семейству, обитающих на территории парка. Ниже приведен их аннотированный список. Данные далеко не полные. По нашему мнению, это не более 30% всей фауны листоедов «Удэгейской легенды».

Семейство **Chrysomelidae** – Жуки-листоеды

Подсемейство **Donaciinae** – Радужницы

Род **Donacia** Fabricius 1775

Donacia gracilipes Jacoby, 1885

Материал. Красноармейский р-н, верховья р. Большая Уссурка, р. Синанга, 21.VI.1995, 1 экз. (В.А. Мутин).

Распространение. Россия (полярный Урал, Восточная Сибирь, юг Дальнего Востока России, Сахалин, Южные Курилы), Япония, Северо-Восточный Китай, Монголия.

Кормовые растения: ежеголовник (*Sparganium sp.*).

Подсемейство **Criocerinae** – Трещалки

Род **Oulema** Des Gozis 1886

Oulema pygmaea Kraatz, 1879

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 24.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: дикорастущие влаголюбивые злаки.

Подсемейство **Cryptocephalinae** – Скрытоглавы

Род **Cryptocephalus** Geoffroy 1762

Cryptocephalus koltzei Weise, 1887

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 25.VII.2015, 3 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), Северный Китай, п-ов Корея, Монголия.

Кормовые растения: различные виды полыни (*Artemisia*).

Cryptocephalus gussakovskii Lopatin, 1952

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, ключ Четвертый, 23.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Приморский край).

Кормовые растения: не установлены.

Cryptocephalus regalis Gebler, 1830

Материал. НП «Удэгейская легенда», 19.VII.2009, 1 экз. (С.В. Овчинников) (ЗИН).

Распространение. Россия (Восточная Сибирь, юг Дальнего Востока), Северный Китай, п-ов Корея, Япония, Монголия.

Кормовые растения: встречается на цветах сложноцветных.

Cryptocephalus splendens (Kraatz, 1879)

Материал. Красноармейский р-н, верховья Арму, пихтово-еловый лес, 9.VII.1971, 1 экз. (Л.А. Ивлиев).

Распространение. Россия (юг Сибири, Приморский край, Сахалин).

Кормовые растения: различные розоцветные (*Potentilla*, *Spirea*, *Rosa*).

Cryptocephalus tetrathyrus Solsky, 1871

Материал. Красноармейский р-н, верховья Арму, старая вырубка в пихтово-еловом лесу, 6.VII.1971, 1 экз. (Л.А. Ивлиев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), п-ов Корея.

Кормовые растения: лещина, ольха.

Подсемейство **Eumolpinae** – Эумольпины

Род *Bromius* Chevrolat in Dejean, 1836

Bromius obscurus (Linnaeus, 1758)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, ключ Четвертый, 27.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока).

Кормовые растения: различные виды кипреев, щавельник, виноград.

Род *Colasposoma* Laporte, 1833

Colasposoma daurica Mannerheim, 1849

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойменный луг р. Большая Ус-сурка, 1.VII.2014, 10 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Забайкалье, юг Дальнего Востока, Сахалин), п-ов Корея, Северный Китай, Монголия.

Кормовые растения: различные виды вьюнковых и сложноцветных.

Род *Syneta* Dejean 1835

Syneta betula amurensis Pic, 1901

Материал. Красноармейский р-н, долина р. Арму, 26.VII.2015, 4 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока, Сахалин).

Кормовые растения: береза, ольха.

Подсемейство **Chrysomelinae** – Хризомелины

Род *Chrysolina* Motschulsky 1860

Chrysolina aurichalcea (Gebler in: Mannerheim, 1825)

Материал. Красноармейский р-н, долина р. Арму, 23.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (европейская часть, Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Курилы, Сибирь), Европа, Средняя и Юго-Восточная, Монголия, Китай, Япония.

Кормовые растения: сложноцветные и злаки.

Chrysolina polita adamsi (Baly, 1879)

Материал. Красноармейский р-н, долина р. Арму, 24.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).
Распространение. Россия (юг Сибири, юг Дальнего Востока, Сахалин), Европа, Монголия, Северо-Восточный Китай.

Кормовые растения: различные яснотковые.

Chrysolina virgata (Motschulsky, 1860)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 3.VII.2014, 2 экз; ср. течение р. Арму, 27.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Северный Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: различные виды зюзника.

Род ***Chrysomela*** Linnaeus 1758***Chrysomela lapponica*** Linnaeus, 1758

Материал. Красноармейский р-н, верховья р. Арму, пихтово-еловый лес, 9.VII.1971, 1 экз. (Л.А. Ивлиев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока), Европа, Средняя Азия, Монголия, Северная Корея, Северный и Северо-Восточный Китай, Япония.

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Chrysomela populi Linnaeus, 1758

Материал. Красноармейский р-н, ключ Зимовейный, 28.VI.1970, 2 экз. (Кононов); ср. течение р. Арму, 22.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока).

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Chrysomela cuprea Fabricius, 1775

Материал. Красноармейский р-н, Рошинский лесхоз, лесосека в кедрово-широколиственном лесу, 3.VII.1970, 1 экз. (Л.А. Ивлиев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока).

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Род ***Entomoscelis*** Chevrolat in Dejean, 1836***Entomoscelis orientalis*** Motschulsky, 1860

Материал. Красноармейский р-н, окр.с. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 4.VII.2014, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Сибири, юг Дальнего Востока, Сахалин).

Кормовые растения: различные виды гречишных.

Род ***Gastrolina*** Baly, 1859***Gastrolina thoracica*** Baly, 1864

Материал. Красноармейский р-н, окр.с. Дерсу, долина р. Большая Уссурка, 3.VII.2014, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Япония, Северо-Восточный Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: орех маньчжурский.

Gastrolina peltoidea (Gebler, 1832)

Материал. Красноармейский р-н, долина р. Арму, 25.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).
Распространение. Россия (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Южные Курилы), Япония, Северо-Восточный Китай.

Кормовые растения: ольха.

Род ***Gastrophysa*** Chevrolat in Dejean, 1836

Gastrophysa atrocyanea (Motschulsky, 1860)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 23.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Монголия, Индокитай (Вьетнам), п-ов Корея, Китай, Япония.

Кормовые растения: гречишные и гвоздиковые.

Род ***Gonioctena*** Chevrolat in Dejean, 1836

Gonioctena fulva Motschulsky, 1860

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 2.VII.2014, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Сибири, юг Дальнего Востока), Восточный Китай, Индокитай (Вьетнам).

Кормовые растения: леспедеца двуцветная.

Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802)

Материал. Красноармейский р-н, долина р. Синанга, 7.VI.1969, 1 экз. (В.Г. Кузнецов).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока), Кавказ, Казахстан, Северо-Восточный Китай, Монголия, Северная Америка.

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Gonioctena gracilicornis (Kraatz, 1879)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 5.VII.2014, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (европейская часть, Сибирь, Дальний Восток, Сахалин), Северная Европа (Финляндия, Швеция, Норвегия).

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Gonioctena sibirica (Weise, 1893)

Материал. Красноармейский р-н, ключ Зимовейный, кедрово-широколиственный лес, 13.VI.1968, 2 экз. (Д.Г. Кононов).

Распространение. Россия (европейская часть, Сибирь, Дальний Восток), Монголия.

Кормовые растения: черемуха, рябина.

Gonioctena viminalis rufa (Kraatz, 1879)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 5.VII.2014, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Сибири, Дальний Восток), Северо-Восточный Китай, Монголия.

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Род *Phaedon* Megerle von Mühlfeld in Dahl, 1823

Phaedon cochlearia (Fabricius, 1792)

Материал. Красноармейский р-н, верховья р. Арму, поляна в пихтово-еловом лесу, 8.VII.1974, 1 экз. (Л.А. Ивлиев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Япония, п-ов Корея, Китай, Индокитай (Медведев, 1992; Михайлов, Чашина, 2009; Сергеев, 20166; Sergeev, 2019).

Кормовые растения: дикорастущие и культурные крестоцветные.

Род *Phratora* Chevrolat in Dejean, 1836

Phratora atrovirens (Cornelius, 1857)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 24.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Сибирь, Дальний Восток), Европа, Монголия.

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Phratora laticollis (Suffrian, 1851)

Материал. Красноармейский р-н, р. Синанга, пихтово-еловый лес, 24.VIII.1969, 1 экз. (Кузнецов); ср. течение р. Арму, 24.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Дальний Восток, Сахалин), Европа, Кавказ, Казахстан, Монголия, Северный Китай, Япония.

Кормовые растения: различные виды ивовых.

Род *Plagiodesa* Chevrolat in Dejean, 1836

Plagiodesa versicolora (Laicharting, 1781)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, поляна среди пихтово-елового леса, 6.VII.1971, 6 экз., там же, на березе, 8.VII.1974, 1 экз. (Ивлиев); ср. течение р. Арму, 22.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока, Сахалин, Южные Курилы).

Кормовые растения: различные виды ив.

Род *Plagiosterna* Motschulsky, 1860

Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758)

Материал. Красноармейский р-н, верховья р. Арму, пихтово-еловый лес, 16.VIII.1967, 1 экз., там же, 6–11.VII.1971 4 экз. (Л.А. Ивлиев); ср. течение р. Арму, 24.VII.2015, 3 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока, Сахалин, Южные Курилы).

Кормовые растения: ольха.

Подсемейство **Galerucinae** – Галеруцины

Род *Agelasa* Motschulsky, 1860

Agelasa nigriceps Motschulsky, 1860

Материал. Красноармейский р-н, долина р. Иман, с. Сидатун, кедрово-широколиственный лес на сопке, 24.VI.2001, 1 экз. (Г.Ш. Лафер).

Распространение. Россия (Приморский край, Сахалин, Южные Курилы), Япония, п-ов Корея, Китай.

Кормовые растения: актинидия коломикта.

Род *Agelastica* Chevrolat in Dejean, 1836

Agelastica coerulea Baly, 1874

Материал. Красноармейский р-н, Рощинский лесхоз, р. Синанга, смешанный лес, 11.VI.1967, 2 экз. (Л.А. Ивлиев); ср. течение р. Арму, 22.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Камчатский край, Амурская область, Приморский край), Япония, п-ов Корея, Китай, Северная Америка.

Кормовые растения: ольха.

Род *Atrachya* Chevrolat, 1836

Atrachya menetriesi (Faldermann, 1835)

Материал. Красноармейский р-н, Рощинский лесхоз, р. Синанга, 22.07.1967, 3 экз. (Ивлиев); ср. течение р. Арму, 25.VII.2015, в массе (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока, Сахалин, Южные Курилы), Япония, п-ов Корея, Китай.

Кормовые растения: травянистые растения разных семейств, но личинки и имаго предпочитают бобовые.

Род *Galerucella* Crotch, 1873

Galerucella flavescens (Weise, 1887)

Материал. Красноармейский р-н, р. Синанга, вдоль дороги, смешанный лес, на клене, 6.X.1969, 1 экз. (В.Г. Кузнецов).

Распространение. Россия (юг Амурской области, Приморский край). Япония (Медведев, 1992; Сергеев, 2016а, б).

Кормовые растения: липа амурская.

Galerucella grisescens (Joanis, 1866)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 27.VII.2015, 3 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Сибирь, юг Дальнего Востока, Сахалин, Южные Курилы), Европа, Китай, Монголия, Япония.

Кормовые растения: различные виды гречишных и розоцветных.

Galerucella maculicollis (Motschulsky, 1854)

Материал. Красноармейский р-н, р. Арму, ключ Серебряный, долинный широколиств лес, 15.VI.1967, 1 экз. (Л.А. Ивлиев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), Япония, Китай, Корея.

Кормовые растения: вязы.

Род *Lochmaea* Weise, 1883

Lochmaea capraea Linnaeus, 1758

Материал. Красноармейский р-н, 10 км западнее с. Таежное, 10.IX.1996, 1 экз. (И.В. Середкин); ср. течение р. Арму, 26.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Сахалина).
Кормовые растения: различные виды ив и берез.

Подсемейство **Alticinae** – **Алтицины**, или **земляные блошки**

Род *Chaetocnema* Stephens 1831

Chaetocnema concinna (Motschulsky, 1860)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 23.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока).

Кормовые растения: дикорастущие и культурные гречишные.

Chaetocnema concinnicollis Baly, 1874

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 23.VII.2015, 3 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), Япония, п-ов Корея, Китай.

Кормовые растения: различные виды злаков.

Род *Crepidodera* Chevrolat in Dejean 1836

Crepidodera picipes (Weise, 1887)

Материал. Красноармейский р-н, окр.п. Рошино, р. Синанга, 6.VI.1964, 1 экз. (В.Г. Кузнецов).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Китай, п-ов Корея (Медведев, 1992; Сергеев, 2016а).

Кормовые растения: различные виды ив.

Crepidodera obscuripes (Heikertinger, 1912)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 22.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Читинская область, Амурская область, Приморский край), Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: различные виды ив.

Род *Hemipyxis* Chevrolat in Dejean, 1836

Hemipyxis plageoderoides Motschulsky, 1860

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 23.VII.2015, 4 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), Япония, Китай, Юго-Восточная Азия.

Кормовые растения: различные виды яснотковых, подорожниковых и норичниковых.

Род *Luperomorpha* Weise, 1887

Luperomorpha funesta Baly, 1874

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 27.VII.2015, 3 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Приморского края), Япония, Восточный Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: не установлены.

Род *Neocrepidodera* Heikertinger 1911

Neocrepidodera obscuritarsis (Motschulsky, 1859)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 22.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край, Сахалин), Япония, Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: различные виды полыни.

Род *Philopona* Weise, 1903

Philopona vibex (Erichson, 1834)

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, ключ Четвертый, 27.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Еврейская АО, Амурская область, Приморский край), Япония, Китай, п-ов Корея, Юго-Восточная Азия.

Кормовые растения: различные виды подорожников.

Род *Phyllotreta* Chevrolat in Dejean 1836

Phyllotreta kurbatovi Medvedev, 2010

Материал. Красноармейский р-н, окр.с. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 5.VII.2014, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Приморский край).

Кормовые растения: различные виды крестоцветных.

Phyllotreta undulata (Kutschera, 1860)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 1.VII.2014, 3 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока).

Кормовые растения: различные виды крестоцветных.

Род *Stenoluperus* Ogloblin, 1936

Stenoluperus nipponensis (Laboissiere, 1913)

Материал. Красноармейский р-н, р. Синанга, на цветущей сирени, 25.VI.1967, 1 экз. (Л.А. Ивлиев); окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 3.VII.2014, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока, Сахалин, Южные Курилы), Китай, п-ов Корея, Япония.

Кормовые растения: различные виды ив и цветы розоцветных.

Подсемейство **Hispinae** – **Хиспины**, или **Шипоноски**

Род *Aspidimorpha* Норе 1840

Aspidimorpha difformis (Motschulsky, 1861)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойменный луг р. Большая Уссурка, 1.VII.2014, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Япония, п-ов Корея, Китай.

Кормовые растения: повой вздутый.

Род *Cassida* Linnaeus 1758*Cassida amurensis* (Kraatz, 1879)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 1.VII.2014, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Китай, п-ов Корея.

Кормовые растения: вьюнковые.

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 23.VII.2015, 2 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (от европейской части до Дальнего Востока, включая Сахалин и Курилы).

Кормовые растения: различные виды маревых.

Cassida piperata Hore, 1842

Материал. Красноармейский р-н, ср. течение р. Арму, 23.VII.2015, 1 экз. (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (Амурская область, Приморский край), Япония, п-ов Корея, Китай, Тайвань, Юго-Восточная Азия (Филлипины).

Кормовые растения: различные виды маревых и амарантовых.

Подсемейство **Bruchinae** – **Зерновки**Род *Bruchidius* Schilsky 1905*Bruchidius lautus* (Sharp, 1886)

Материал. Красноармейский р-н, окр. пос. Дерсу, пойма р. Большая Уссурка, 5.VII.2014, в массе (М.Е. Сергеев).

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), Китай, Япония.

Кормовые растения: горошек мышиный.

ПРЯМОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ

Прямокрылые (Orthoptera) – это относительно небольшой отряд насекомых с неполным превращением. В мире к настоящему времени известно чуть более 28 тыс. видов, распространенных главным образом в тропиках и субтропиках (Cigliano et al, 2020). В Приморском крае обитает 111 видов прямокрылых (Стороженко, 2017), из которых для бассейна р. Большая Уссурка было отмечено всего 2 вида кузнечиков (Tettigoniidae), 1 вид сверчков (Gryllidae), 1 вид прыгунчиков (Tetrigidae) и 4 вида саранчовых (Acrididae) (Bey-Bienko, 1932; Стороженко, 1980, 1986, 1988, 2004; Storozhenko, 1991, 1994; Storozhenko et al., 1994), тогда как из Сихотэ-Алинского заповедника отмечено 22 вида (Стороженко, Сергеев, 2015). Самцы подавляющего большинства видов прямокрылых способны воспроизводить звуки для приманивания самок, а их пение оживляет природу в дневное и вечернее время.

Материалом для исследования послужили сборы сотрудников лаборатории энтомологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, проведенные в 1990–2015 гг. в следующих точках:

- I** – устье р. Арму, 13–17.06.1990 (С.Ю. Стороженко);
- II** – окр.с. Дерсу, 21–24.08.1990 (С.Ю. Стороженко);
- III** – окр.с. Дерсу, 19–27.08.1991 (В.Н. Макаркин);
- IV** – р. Арму, 50 км ВСВ с. Дерсу, 16.09.1991 (Ю.А. Чистяков);
- V** – среднее течение р. Арму, верховья р. Бол. Пихтовая, 18.09.1991 (Ю.А. Чистяков);
- VI** – р. Арму, г. Высокая, 1700 м, 30.08.1990 (В.С. Сидоренко);
- VII** – 36 км ниже с. Мельничное, 18.07.1991 (В.С. Сидоренко);
- VIII** – 5 км 3 с. Вострецово, 8.08.2010 (С.Ю. Стороженко);
- IX** – с. Незаметное, 7 км СЗ с. Вострецово, 1.08.2013 (С.Ю. Стороженко);
- X** – окр.с. Рощино, 9–10.08.2008 (С.Ю. Стороженко);
- XI** – среднее течение р. Арму, 45°47'04" N, 135°41'779" E, 21–27.2015 (М.Е. Сергеев).

Ниже приводится список видов, в котором семейства и подсемейства даны в соответствии с принятой в настоящее время системой отряда (Cigliano et al., 2020), а роды и виды – в алфавитном порядке. Весь исследованный материал хранится в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (г. Владивосток).

Отряд **Orthoptera**

Подотряд **Ensifera**

Семейство **Tettigoniidae**

Подсемейство **Tettigoniinae**

Род **Atlanticus** Scudder, 1859

Atlanticus (Atlanticus) brunneri (Pylnov, 1914)

Материал. IX – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); СВ Китай, Корея.

Обитает на опушках леса, заходит по осветленным участкам под полог дубняков. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с конца июля до конца августа. Хищник.

Род *Chizuella* Furukawa, 1950

Chizuella bonneti (Bolivar, 1890)

Материал. IX – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); СВ и В Китай, Корея, Япония.

Обитает на полянах и опушках леса, изредка заходит по осветленным участкам под полог леса. Личинки с середины мая до конца июня, имаго с конца июня до конца августа. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Питание смешанное, наряду с мелкими членистоногими употребляет листья и генеративные органы трав.

Род *Gampsocleis* Fieber, 1852

Gampsocleis ussuriensis Adelung, 1910

Материал. IX – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг В Сибири и Дальнего Востока, включая Сахалин и Курилы); Монголия, СВ Китай, Корея, Япония.

Встречается на лугах. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. В Приморье имаго с июля до сентября. Хищник, но также может питаться генеративными органами и листьями трав.

Род *Paratlanticus* Ramme, 1939

Paratlanticus ussuriensis (Uvarov, 1926)

Материал. IV – 1 ♀; V – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Хабаровского края, Приморский край); СВ Китай, С Корея.

Встречается преимущественно по опушкам леса. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с июля до середины октября. Хищник.

Род *Sphagniana* Zeuner, 1941

Sphagniana ussuriensis (Uvarov, 1926)

Материал. II – 1 ♂; III – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); СВ Китай, С Корея.

Встречается преимущественно по опушкам леса, полянам и на осветленных местах под пологом леса. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с июля до конца сентября. Питание смешанное.

Род *Tettigonia* Linnaeus, 1758

Tettigonia ussuriensis Uvarov, 1939

Материал. II – 1 ♂, 1 ♀; III – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока, но отсутствует на Сахалине и Курилах); СВ Китай, Корея.

Держится на деревьях и кустарниках преимущественно по опушкам леса. Яйца

откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с середины августа до начала октября. Хищник, питается преимущественно другими членистоногими.

Подсемейство **Conocephalinae**

Род *Conocephalus* Thunberg, 1815

Conocephalus (Amurocephalus) chinensis (Redtenbacher, 1891)

Материал. III – 1 ♀.

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока); Монголия, С и В Китай, Корея, Япония.

Предпочитает влажные места, держится на злаках. Яйца откладывает в узлы кущения злаков. Зимует в стадии яйца. Имаго с конца июля августа до сентября. Хищник, питается мелкими членистоногими и наземными моллюсками.

Conocephalus (Anisoptera) fuscus (Fabricius, 1793)

Материал. IX – 1 ♀; XI – 1 ♀.

Распространение. Транспалеарктический вид (от Европы и С Африки до Приморья и СВ Китая, но отсутствует на Сахалине, Курилах и в Японии).

Ранее приводился из России как *Conocephalus discolor* (Стороженко, 2004). Встречается по берегам стоячих водоемов на камыше и крупных злаках. Яйца откладывает в узлы кущения злаков. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Питается мелкими членистоногими и наземными моллюсками.

Род *Ruspolia* Schulthess, 1898

Ruspolia dubia (Redtenbacher, 1891)

Материал. IX – 1 ♀.

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока), В Китай, Корея, Япония.

Ранее приводился из России как *Ruspolia jezoensis* (Стороженко, 2004). Встречается на лугах и по опушкам леса, держится на травах. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с конца августа по конец сентября. Хищник.

Подсемейство **Phaneropterinae**

Род *Phaneroptera* Audinet-Serville, 1831

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Материал. VIII – 1 ♂, 1 ♀; IX – 1 ♂.

Распространение. Транспалеаркт (от Европы до Японии).

Встречается на лугах и по опушкам леса, держится на кустарниках и широколиственных травах. Растительноядный вид. Специализированный фитофил. Плоские яйца откладывает в кромку листовой пластинки растений. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе–сентябре. Фитофаг.

Семейство **Gryllidae**

Подсемейство **Gryllinae**

Род *Teleogryllus* Chopard, 1961

Teleogryllus (Brachyteleogryllus) infernalis (Saussure, 1877)

Материал. II – 1 ♂, 1 ♀; III – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); Китай, Корея, Япония.

На сухих лугах и по опушкам леса. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с августа до конца сентября. Широкий олигофаг, питается продуктами растительного и животного происхождения.

Подсемейство **Oecanthinae**

Род *Oecanthus* Audinet-Serville, 1831

Oecanthus longicauda Matsumura, 1904

Материал. II – 1 ♀; III – 1 ♂, 1 ♀; X – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Приамурья, Приморье); Китай, Корея, Япония.

Встречается на лугах и по опушкам леса, держится на кустарниках и травах, довольно обычен в зарослях полыни. Самцы выгрызают небольшие отверстия в листьях и, располагаясь с нижней стороны листа, используют их при пении в качестве резонатора. Яйца откладывает в стебли растений. Зимуют яйца. Имаго в августе–сентябре. Растительноядный вид.

Подсемейство **Nemobiinae**

Род *Dianemobius* Vickery, 1973

Dianemobius fascipes (Walker, 1869)

Материал. III – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); Китай, Корея, Япония, ЮВ Азия, Индонезия, Индия, Непал, Шри-Ланка.

В Приморском крае представлен подвидом *D. fascipes nigrofasciatus* (Matsumura, 1904). Преимущественно на полянах и сухих лугах. Обычен. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Позднелетний вид: личинки в июле, имаго с конца июля по начало октября. Питается растительными остатками.

Род *Polionemobius* Gorochoy, 1983

Polionemobius taprobanensis (Walker, 1969)

Материал. II – 1 ♀; VIII – 1 ♂, 1 ♀;

Распространение. Россия (юг Хабаровского края, Приморье); Китай, Япония, ЮВ Азия, Индонезия, Индия, Шри-Ланка.

Обычен на сухих лугах и полянах. Держится на поверхности почвы и среди разрезанной травы. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Позднелетний вид: имаго с середины июля по начало октября. Фитофаг, но предпочитает увядшие и отчасти ферментированные листья.

Род *Pteronemobius* Jacobson, 1905

Pteronemobius gorochovi Storozhenko, 2004

Материал. II – 2 ♂, 2 ♀; III – 1 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); Корея.

Встречается на полянах и лугах на почве и среди низкой травы. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Позднелетний вид: личинки в июле, имаго с конца июля по начало октября. Питается растительными остатками.

Pteronemobius yezoensis (Shiraki, 1913)

Материал. I – 1 ♂, 1 ♀.

Распространение. Россия (Приморский край, Кунашир); Корея, Япония.

Держится на поверхности почвы и среди разреженной травы. Яйца откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Раннелетний вид: личинки в мае, имаго в июне. Растительноядный вид, предпочитает чуть увядшие растительные остатки.

Семейство **Gryllotalpidae**

Подсемейство **Gryllotalpinae**

Род ***Gryllotalpa*** Latreille, 1802

Gryllotalpa orientalis Burmeister, 1839

Материал. X – 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье, Кунашир); Китай, Корея, Япония, Ю и ЮВ Азия, Индонезия, Австралия.

Живет в почве, роет норы. Встречается в течение всего вегетационного периода. Имаго в августе летят на свет. Зимуют личинки средних возрастов и имаго в почве на глубине 40–60 см. Питание смешанное: корни растений и мелкие беспозвоночные. Вредит на огородах картофелю и овощным культурам.

Подотряд **Caelifera**

Семейство **Tridactylidae**

Подсемейство **Tridactylinae**

Род ***Xya*** Latreille, 1809

Xya japonica De Haan, 1844

Материал. II – 2 ♂, 2 ♀; XI – 1 ♂, 4 ♀.

Распространение. Россия (юг Приамурья, Приморье); В Китай, Корея, Япония.

Роющий геобионт, строит галереи из мелкодисперсной почвы по берегам водоемов. Живет небольшими семьями, состоящими из нескольких взрослых насекомых и личинок.

Семейство **Tetrigidae**

Подсемейство **Tetriginae**

Род ***Tetrix*** Latreille, 1802

Tetrix japonica (I. Bolivar, 1887)

Материал. II – 1 ♂, 2 ♀; III – 3 ♂, 1 ♀; VIII – 1 ♀; XI – 1 ♂, 5 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); Монголия, Китай, Корея, Япония.

Самый обычный и массовый вид тетригид, встречающийся практически во всех открытых биотопах. Держится на поверхности почвы, под растительными остат-

ками, нередко у воды. Имаго отмечены в течение всего вегетационного периода. Яйца откладывает в почву. Зимуют имаго и личинки среднего возраста. Дейтритофаг, питается в основном продуктами распада органических веществ.

Семейство **Acrididae**Подсемейство **Oxyinae**Род ***Oxya*** Audinet-Serville, 1831***Oxya maritima*** Mistshenko, 1951

Материал. IX – 1 ♂, 1 ♀; X – 1 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); СВ Китай, Корея.

Обитает преимущественно на увлажненных лугах. Зимует в стадии яйца. Поздне-летний вид, имаго в августе–октябре. Фитофаг, питается злаками.

Подсемейство **Podisminae**Род ***Ognevia*** Ikonnikov, 1911***Ognevia longipennis*** (Shiraki, 1910)

Материал. II – 1 ♂, 1 ♀; III – 2 ♂, 1 ♀; VII – 1 ♂; IX – 1 ♂, 2 ♀; XI – 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); Монголия, СВ Китай, Корея, Япония.

Встречается преимущественно по обочинам лесных дорог, на опушках и вдоль берегов рек и ключей. Кубышка с яйцами в почве. Зимует в стадии яйца. Имаго в июне–сентябре. Фитофаг, предпочитает листья кустарников и деревьев. В годы массового размножения этот вид наносит существенный вред кустарникам и под-росту деревьев.

Род ***Prumna*** Motschoulsky, 1859***Prumna montana*** (Storozhenko, 1991)

Материал. VI – 5 ♂, 4 ♀.

Распространение. Приморский край.

Эндемик, г. Высокая.

Prumna prinnoa (Motschoulsky, 1846)

Материал. II – 2 ♂, 1 ♀; III – 2 ♂, 4 ♀; VII – 2 ♂, 1 ♀; IX – 2 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока от Красноярского края до Сахалина и Курил); Монголия, СВ Китай.

Держится преимущественно по опушкам леса. Яйца откладывает в почву группами в виде кубышки. Зимует в стадии яйца. Имаго с июня до конца лета. Фитофаг. В отдельные годы личинки и взрослые образуют небольшие кулижки и повреждают овощные культуры на огородах, примыкающих к опушкам леса.

Prumna prinnoides Ikonnikov, 1911

Материал. III – 1 ♂, 3 ♀.

Распространение. Россия (юг Хабаровского края, Приморье); Корея.

Образ жизни как у предыдущего вида.

Prumna ussuriensis Tarbinsky, 1930

Материал. III – 1 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (Приморский край); СВ Китай (*Хэйлунцзян*).

Особенности биологии и экологии как у *Prumna primnoa*.

Род ***Zubovskya*** Dovnar-Zapolsky, 1933

Zubovskya koeppeni (Zubowsky, 1900)

Материал. III – 1 ♂, 3 ♀; IX – 2 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (Сибирь и Дальний Восток); Монголия, СВ Китай.

В Приморском крае представлен подвидом *Z. koeppeni parvula* (Ikonnikov, 1911).

Обитает на полянах, лугах и по опушкам леса. Обычен. Кубышку с яйцами откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго с конца июля до середины сентября.

Фитофаг, предпочитает листья трав и кустарников.

Подсемейство **Eupreopocnemidinae**

Род ***Shirakiacris*** Dirsh, 1957

Shirakiacris shirakii (I. Bolivar, 1914)

Материал. VIII – 1 ♂, 1 ♀.

Распространение. Россия (Приморский край); В Китай, Корея, Япония.

Встречается на лугах и по опушкам разреженных лесов (Стороженко, 1987). Яйца

откладывает в почву в виде кубышки. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе–сентябре. Фитофаг.

Подсемейство **Gomphocerinae**

Род ***Arcyptera*** Audinet-Serville, 1839

Arcyptera orientalis Storozhenko, 1988

Материал. III – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье); СВ Китай, С Корея.

Обитает на открытых местах и по опушкам леса, предпочитает участки с разреженной растительностью. Яйца откладывает в почву группами в виде кубышки.

Зимует в стадии яйца. Имаго в августе. Фитофаг.

Род ***Chorthippus*** Fieber, 1852

Chorthippus caliginosus Mistshenko, 1951

Материал. VII – 1 ♂; IX – 4 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); Монголия, С Китай.

Встречается на злаково-разнотравных лугах. Яйца откладывает в почву в виде кубышки. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Chorthippus hammarstroemi (Miram, 1907)

Материал. III – 4 ♂, 1 ♀.

Распространение. Россия (Сибирь и Дальний Восток, Якутия). Монголия, СВ и В Китай, Корея.

Обитает на лугах и по опушкам леса. Яйца откладывает в почву в виде кубышки. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг, предпочитает листья трав.

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)

Материал. I – 1 ♂; III – 1 ♀; IX – 2 ♂; X – 2 ♂, 1 ♀.

Распространение. Россия (северная половина европейской части, Сибирь, Дальний Восток); Европа (от Франции до Румынии и Финляндии), Казахстан, С и СЗ Монголия, СВ Китай, С Корея.

Встречается на злаково-разнотравных лугах. Яйца откладывает в почву в виде кубышки. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род ***Chrysochraon*** Fischer, 1853

Chrysochraon dispar (Germar, 1834)

Материал. IX – 2 ♂, 1 ♀.

Распространение. Широко распространен в Палеарктике, но отсутствует на Сахалине, Курилах и в Японии.

В Приморском крае представлен подвидом *Ch. dispar major* Uvarov, 1925. Встречается на лугах и по опушкам леса. Кубышки откладывает в почву или растительные остатки. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род ***Euchorthippus*** Tarbinsky, 1925

Euchorthippus unicolor (Ikonnikov, 1913)

Материал. IX – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Хабаровского края, Приморский край); С и В Китай, Корея.

Обитает на лугах и полянах. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе–сентябре. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род ***Euthystira*** Fieber, 1853

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

Материал. IX – 2 ♂, 1 ♀.

Распространение. Транспалеарктический вид (от Атлантического до Тихого океана).

В Приморском крае представлен номинативным подвидом. Обитает на полянах и лугах. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род ***Glyptobothrus*** Chopard, 1951

Glyptobothrus maritimus (Mistshenko, 1951)

Материал. II – 1 ♀; III – 1 ♀; IX – 1 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (юг европейской части, Сибирь, Дальний Восток); Монголия, С Китай, Корея, Япония.

В Приморском крае представлен номинативным подвидом. Встречается среди разреженной растительности. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–сентябре. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род *Gomphocerus* Thunberg, 1815

***Gomphocerus kudia* Caudell, 1927**

Материал. VI – 1 ♀.

Распространение. Россия (юг Хабаровского края, Приморье, Сахалин); СВ Китай, С Корея.

Типичный обитатель высокогорий Сихотэ-Алиня, обычен в поясе гипсохтонных тундр и у верхней границы лесов. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род *Megaulacobothrus* Caudell, 1921

***Megaulacobothrus aethalinus* (Zubowsky, 1899)**

Материал. III – 2 ♂, 1 ♀; IX – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока от Алтая до Сахалина и Курил); СВ Казахстан, Монголия, СВ Китай, Корея.

Предпочитает опушки леса, где держится среди кустарников и трав. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг.

Род *Mongolotettix* Rehn, 1928

***Mongolotettix japonicus* (I. Bolivar, 1898)**

Материал. VII – 1 ♂, 1 ♀; XI – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); СВ Казахстан, Монголия, СВ Китай, Корея, Япония.

В Приморском крае представлен номинативным подвидом. Обитает на полянах и по опушкам леса. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Род *Podismopsis* Zubowsky, 1899

***Podismopsis genicularibus* (Shiraki, 1910)**

Материал. I – 5 ♂; VI – 8 ♂, 4 ♀.

Распространение. Россия (Якутия, юг Дальнего Востока включая Сахалин и Курилы); СВ Китай, Корея, Япония.

Встречается главным образом на опушках и полянах в долинных широколиственных лесах. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–сентябре. Фитофаг.

***Podismopsis ussuriensis* Ikonnikov, 1911**

Материал. IX – 9 ♂, 3 ♀.

Распространение. Россия (юг Дальнего Востока, за исключением Сахалина и Курильских островов); Монголия, СВ Китай, С Корея.

Представлен подвидом *P. ussuriensis micra* Вей-Вьенко, 1932, известным из Среднего и Северного Сихотэ-Алиня. Обитает в редкостойных лиственничниках. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в июле–августе. Фитофаг.

Род *Schmidtia* Storozhenko, 2002

***Schmidtia schmidtii* (Ikonnikov, 1913)**

Материал. II – 2 ♂, 1 ♀; III – 1 ♀; VII – 5 ♂, 3 ♀; VIII – 2 ♀; IX – 1 ♂, 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); Монголия, СВ Китай, Корея, Япония.

Встречается главным образом по берегам рек и на опушках леса. Предпочитает песчаные почвы с редкой растительностью. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе. Фитофаг, предпочитает злаки.

Подсемейство **Locustinae**

Род *Celes* Saussure, 1884

Celes skalozubovi Adelung, 1906

Материал. VIII – 2 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); С Казахстан, Монголия, С и СВ Китай, Корея, Япония.

В Приморском крае представлен подвидом *C. skalozubovi akitanus* (Shiraki, 1910). Держится среди редкой растительности на каменисто-щебенистых хорошо прогреваемых участках. Редок. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе и начале сентября. Фитофаг.

Род *Epacromius* Uvarov, 1942

Epacromius pulverulentus (Fischer-Waldheim, 1846)

Материал. II – 1 ♂, 1 ♀; III – 1 ♀.

Распространение. Россия (юг европейской части, Восточное Предкавказье, степи и лесостепи Сибири от Алтая до Приморья); юг Европы, Казахстан, Монголия, Китай; Корея; С Индия.

Встречается на сухих лугах. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе. Фитофаг.

Род *Mecostethus* Fieber, 1852

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)

Материал. II – 1 ♂, 1 ♀; III – 2 ♂, 3 ♀; IX – 2 ♂; IX – 1 ♂, 1 ♀.

Распространение. Транспалеаркт. Россия (юг европейской части, С Кавказ, юг Сибири и Дальнего Востока от Алтая до Приморского края); Европа, Малая Азия, Кавказ, Казахстан, С Китай, Корея, Япония.

Встречается на лугах и лесных полянах, где держится на травянистых растениях. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе. Фитофаг.

Род *Oedaleus* Fieber, 1853

Oedaleus infernalis Saussure, 1884

Материал. II – 1 ♂, 1 ♀; III – 4 ♂, 6 ♀; VII – 3 ♂, 3 ♀.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока); Монголия, Китай, Корея, Япония.

Держится среди редкой растительности на каменисто-щебенистых хорошо прогреваемых участках по опушкам леса. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе–сентябре. Фитофаг.

Род *Stethophyma* Fischer, 1853

Stethophyma magister (Rehn, 1902)

Материал. IX – 1 ♂.

Распространение. Россия (юг Сибири и Дальнего Востока от Красноярского края до Кунашира); Монголия, СВ Китай, Корея, Япония.

Встречается на лугах, лесных полянах и опушках, где держится на травянистых растениях. Кубышки откладывает в почву. Зимует в стадии яйца. Имаго в августе. Фитофаг.

Таким образом, в долине р. Большая Уссурка отмечено 45 видов прямокрылых насекомых, что составляет 40,5% от фауны Приморского края. Семейство Tettigoniinae представлено 9 видами из 8 родов и 3 подсемейств (Tettigoniinae – 5 видов из 5 родов, Conopcephalinae – 3 вида из 2 родов, Phaneropterinae – 1 вид, 1 род); семейство Gryllidae – 6 видами из 5 родов (Gryllinae – 1 вид и 1 род, Oecanthinae – 1 вид и 1 род, Nemobiinae – 4 вида из 3 родов); семейство Gryllotalpidae – 1 видом и 1 родом из номинативного подсемейства; семейство Tridactylidae – 1 видом и 1 родом из номинативного подсемейства; семейство Tetrigidae – 1 видом и 1 родом из номинативного подсемейства; семейство Acrididae представлено 27 видами из 21 рода и 5 подсемейств (Oxyninae – 1 вид и 1 род; Podisminae – 6 видов из 3 родов; Eupreproscemidinae – 1 вид и род; Gomphocerinae – 14 видов из 11 родов, Locustinae – 5 видов из 5 родов). Впервые из этого района указываются 37 видов. Следует отметить, что эндемиком Красноармейского района является *Prumna montana*, а по долине Большой Уссурки проходит северная граница распространения вида *Prumna ussuriensis* и южная – саранчовых *Prumna primnoa* и *Podismopsis ussuriensis micra*, что позволяет рассматривать этот район в качестве второстепенного биогеографического рубежа на западном макросклоне Сихотэ-Алиня.

Благодарности

Авторы благодарят директора НП «Удэгейская легенда» Б.И. Литвинова, сотрудников парка – С.В. Кавера, О.В. Кавера и А.В. Капитулина за содействие в проведении полевых работ, а также Г.М. Шаульского (Приморский край, п.г.т. Терней), Г.А. Мосейко (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург), В.Ю. Баркалова и С.А. Шабалина (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток) за научные консультации и содействие в работе с коллекционным материалом.

Работа выполнялась при поддержке грантов РФФИ: 17-04-01486, 18-04-00120, 18-04-00278 и 19-54-50010ЯФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аблакатова А.А. Микофлора и основные грибные болезни плодово-ягодных растений юга Дальнего Востока. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.
- Агрофизические методы исследования почв. М.: Наука, 1966. 260 с.
- Аднагулов Э.В. Аннотированный список земноводных и пресмыкающихся Дальнего Востока России // Современная герпетология. 2017. Т. 17, вып. 3/4. С. 95–123.
- Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. Л.: Колос, 1976. 280 с.
- Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. М.: АБФ, 1998. 576 с.
- Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г., Даревский И.С., Рябов С.А., Барабанов А.В. Атлас пресмыкающихся северной Евразии. СПб.: ЗИН, 2004. 232 с.
- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970. 487 с.
- Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. М.: Изд-во МГУ, 1989. 336 с.
- Бакланов П.Я., Берсенев Ю.И., Борисова В.Н., Голов В.И., Елпатьевский П.В., Жуков А.В., Кислицин Л.В., Крупская Л.Т., Кручинина Л.М., Секисов Г.В., Богатов В.В., Ровнянская Н.К., Качур А.Н., Косолапов А.В., Аникиев В.В., Свинухов В.Г., Чудаева В.А., Иванов В.П., Короткий А.М., Краева М.И., Крылов А.Г., Мошков А.В., Рензин О.М., Розенберг В.А., Романов М.Т., Скрыльчик Г.П., Тащи С.М., Турецкий В.С., Юсупов В.П. Долговременная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 года. Экологическая программа. Т. 2. Владивосток: Дальнаука, 1993. 301 с.
- Баркалов В.Ю., Коробков А.А., Цвелев Н.Н. Сем. Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1992. Т. 6. С. 9–413.
- Барыкина Р.П., Веселова Т.Д., Девятов А.Г., Джалилова Х.Х., Ильина Г.М., Чубатова Н.В. Основы микротехнических исследований в ботанике. Справочное руководство. М.: Изд-во МГУ, 2000. 127 с.
- Беньковский А.О. Жизнь листоедов-радужниц (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae). Ливны: Изд-во Мухаметов Г.В., 2015. 380 с.
- Берсенев Ю.И. Особо охраняемые природные территории Приморского края / Берсенев Ю.И., Цой Б.В., Явнова Н.В.; Упр. Росприроднадзора по Приморскому краю, Всемирный фонд дикой природы (WWF). Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия, Дальневосточный филиал, 2006. 64 с.
- Богатов В.В., Дейл Микелл, Розенберг В.А., Воронов Б.А., Краснопеев С.М., Трой Мерилл. Стратегия сохранения биоразнообразия Сихотэ-Алиня. Владивосток, 2000. 136 с.
- Богачева А.В. Дискомицеты как часть растительных сообществ заповедников Приморского края // Комаровские чтения, 1998. Вып. 45. С. 73–88.

Большаков А.В., Белобров В.П., Шишов Л.Л. Словник. Термины, их краткое определение, справочные материалы по почвенной экологии, географии и классификации почв. М.: Почв. ин-т. им В.В. Докучаева, 2004. 138 с.

Боркин Л.Я., Орлов Н.Л. Новые данные по распространению амфибий и рептилий Дальнего Востока // Вопросы герпетологии. Т. 4. Л.: ЗИН АН СССР, 1977. С. 45–47.

Бромлей Г.Ф., Костенко В.А. Биоценотические связи птиц, млекопитающих и кедра корейского в Приморском крае // Фауна и экология наземных позвоночных юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1974. С. 5–41.

Будищев А.Ф. Описание лесов части Приморской области // Записки Сибирского отд. ИРГО, 1867. № 9–10. С. 95–474.

Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике. Л.: Наука, 1969. 232 с.

Васильев Н.Г. Ильмовые и ясеневоы леса бассейна р. Уссури и ведение хозяйства в них // Материалы по изучению лесов Сибири и Дальнего Востока. Красноярск, 1963а. С. 51–58.

Васильев Н.Г. Леса из тополя Максимовича в бассейне р. Уссури // Сообщ. ДВ филиал СО АН СССР, 1963б. Вып. 21. С. 33–38.

Васильев Н.Г. Краткий очерк лесной растительности бассейна реки Имана // Комаровские чтения, 1964. Вып. 12. С. 3–25.

Васильев Н.Г. Долинные широколиственные леса Сихотэ-Алиня. М.: Наука, 1977. 116 с.

Васильев Н.Г. Ясеневоы и ильмовые леса советского Дальнего Востока. М.: Наука, 1979. 320 с.

Васильев Я.Я. Лесные ассоциации Спутинского заповедника Горнотаежной станции // Тр. Горнотаежной станции Дальневосточного филиала АН СССР, 1938. Т. 2. С. 5–136.

Васильева Л.Н., Назарова М.М. Грибы макромицеты как компоненты лесных фитоценозов юга Приморского края // Комплексные стационарные исследования лесов Приморья. Л.: Наука, 1967. С. 122–164.

Великанов Л.Л., Сидорова И.И. Экологические проблемы защиты растений от болезней. Итоги науки и техники. Сер. «Защита растений». Т. 6. М.: Изд-во МГУ, 1988. 143 с.

Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 238 с.

Водяницкий Ю.Н. Тяжелые металлы и металлоиды в почвах. М.: ГНУ Почвенный институт им В.В. Докучаева РАСХН, 2008. 165 с.

Воронин А.Д. Основы физики почв. М.: Изд-во МГУ, 1986. 235 с.

Вышин И.Б. Сем. Ятрышниковые, орхидные – Orchidaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1996. Т. 8. С. 301–339.

Гагарина Л.В. Семейство Coenogoniaceae // Флора лишайников России: род *Prototarmelia*, семейства Coenogoniaceae, Gyalectaceae и Umbilicariaceae / отв. ред. М.П. Андреев, Д.Е. Гимельбрант. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. С. 26–30.

Галанина И.А. Анализ распределения видов лишайников по постоянным пробным площадям в Сихотэ-Алинском заповеднике // Комаровские чтения. 2004. Вып. 56. С. 142–234.

Галанина И.А. Особенности распределения эпифитных лишайников на дубе монгольском и дубе зубчатом на юге Хасанского района // Сибирский экологический журнал. 2007а. № 1. С. 69–81.

Галанина И.А. Лихенобиота эпифитных лишайников на дубе монгольском (*Quercus mongolica*) и дубе зубчатом (*Q. dentata*) и особенности ее эколого-географического распределения в южном Приморье // Комаровские чтения. 2007б. Вып. 54. С. 262–310.

Галанина И.А. Синузии эпифитных лишайников. Владивосток: Дальнаука, 2008. 238 с.

Галанина И.А., Галанин А.В. *Byssoloma subdiscordans* (Nyl.) P. James на Дальнем Востоке России // *Turczaninowia*. 2014. Т. 17 (3). С. 33–37.

Галанина И.А., Ежкин А.К. Лишайники // Микобиота дальневосточных дубняков. Владивосток: Дальнаука, 2018. С. 127–191.

Галанина И.А., Ежкин А.К., Яковченко Л.С., Гимельбрант Д.Е., Желудева Е.В., Скирина И.Ф. *Physcia alnophila* (Vain.) Loht. et al. на Дальнем Востоке России // *Turczaninowia*. 2017. Т. 20 (1). С. 99–106.

Галанина И.А., Скирина И.Ф. Лишайники // Мониторинг растительного мира Сихотэ-Алинского биосферного заповедника: разнообразие, динамика, мониторинг. Владивосток, 2000. С. 62–67.

Галанина И.А., Яковченко Л.С. Эпифитные лишайники дуба зубчатого (*Quercus dentata*) в Приморском крае // Новости систематики низших растений. 2007. Т. 41. С. 181–192.

Гапиенко О.С. Функциональная роль макро- и микромицетов в деструкции растительных остатков // Биология, систематика и экология грибов в природных экосистемах и агрофитоценозах. Материалы междунар. конф. Минск: ИООО «Право и экономика», 2004. С. 56–59.

Геохимия тяжелых металлов в природных и техногенных ландшафтах / под ред. А.А. Глазовской. М.: Изд-во МГУ, 1983. 196 с.

Гладкова Г.А., Бутовец Г.Н., Манько Ю.И., Захаров С.М. Исследование химического состава снеговых вод в связи с региональной деградацией пихтово-еловых лесов в Приморском крае // География и природные ресурсы. 1993. № 2. С. 58–62.

Гладкова Г.А., Сибирина Л.А. Охраняемые виды сосудистых растений и грибов на территории национального парка «Удэгейская легенда» // Вестник КрасГАУ, 2016. № 2 (125). С. 148–154.

Глушко С.Г. Показатели хода роста тиса остроконечного в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока // Леса и лесообразовательный процесс на Дальнем Востоке: материалы междунар. конф. Владивосток, 1999. С. 85–86.

Грачева Р.Г. Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова // Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации // Инфосфера-НИА Природа. М., 2012. С. 435–439.

Громыко Л.Т., Громыко М.Н. Закономерности формирования подстилки в поясе дубовых лесов Сихотэ-Алинского заповедника // Результаты охраны и изучения природных комплексов Сихотэ-Алиния. Владивосток: ОАО «Примполиграфкомбинат», 2005а. С. 145–152.

Громыко Л.Т., Громыко М.Н. Формирование подстилки на первых послепожарных стадиях сукцессионных процессов в кедровых лесах // Материалы VII Дальневост. конф. по заповедному делу. Биробиджан, 18–21 октября 2005 г. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2005б. С. 91–92.

Гурулева Н.И., Княжева Л.А. Лишайники заповедника «Кедровая падь» // Флора и растительность заповедника «Кедровая падь». Владивосток, 1972. С. 168–170.

Давыдов Е.А. Семейство Umbilicariaceae // Флора лишайников России: род *Protoparmelia*, семейства Coenogoniaceae, Gyalectaceae и Umbilicariaceae / отв. ред. М.П. Андреев, Д.Е. Гимельбрант. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. С. 66–127.

Добровольский Г.В., Урусевская И.С., Алябина И.О. Карта почвенно-географического районирования, масштаб 1 : 15 000 000 // Национальный атлас почв Российской Федерации / под ред. И.О. Алябина, Г.В. Добровольский, И.С. Урусевская и др. М.: АСТ Астрель, 2011. С. 198–201.

Добрынин А.П. Дубовые леса российского Дальнего Востока (биология, география, происхождение). Владивосток: Дальнаука, 2000. 260 с.

Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. Земноводные и пресмыкающиеся России. Атлас-определитель. М.: Фитон+, 2017. 328 с.

Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. Змеи. Виды фауны России: атлас-определитель. М.: Фитон XXI, 2014. 120 с.

Дурынина Е.П., Великанов Л.Л. Почвенные фитопатогенные грибы. М.: Изд-во МГУ, 1984. 107 с.

Егоров А.Б. Сем. Bruchidae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Владивосток: Дальнаука, 1996. Т 3 (3). С. 140–158.

Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока: Гифомицеты. Л.: Наука, 1986. 192 с.

Ежкин А.К. Дополнения к лишенобиоте заповедника «Курильский» (о-в Кунашир) // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН, 2019. Вып. 22. С. 36–43.

Ежкин А.К., Галанина И.А. Дополнения к лишенобиоте острова Сахалин // Новости систематики низших растений, 2014. Т. 48. С. 233–248.

Емельянов А.А. Змеи Дальнего Востока // Записки Владивостокского отдела Государственного русского географического общества. Владивосток: Издание Владивостокского отдела Государственного русского географического общества, 1929. Т. 3 (1). 207 с.

Емельянов А.А. Амфибии и рептилии советского Дальнего Востока: дис. ... д-ра биол. наук, 1944. 260 с.

Ефимов. Н.В. Справочник таксатора. Хабаровск, 1955. 85 с.

Жданов И.С. Род *Protoparmelia* // Флора лишайников России: род *Protoparmelia*, семейства *Scolecogoniaceae*, *Gyalectaceae* и *Umbilicariaceae* / отв. ред. М.П. Андреев, Д.Е. Гимельбрант. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. С. 15–25.

Иванов Б.А. Центральный Сихотэ-Алинский разлом. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1972. 114 с.

Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М.: Наука, 1976. 200 с.

Ивашкевич Б.А. Что сделано и что надо сделать в области изучения лесов Дальнего Востока // Производительные силы Дальнего Востока. Растительный мир. Хабаровск; Владивосток: Книжное дело, 1927. Вып. 3. С. 21–52

Ивашов В.П. Биогеохимия внутрипочвенного выветривания. М.: Наука, 1993. 379 с.

Ивашов В.П. Ландшафтно-геохимические исследования на базальтовых массивах. Владивосток: Дальнаука, 2003. 325 с.

Ижевский С.С. Опасный вредитель кукурузы на пороге России // Защита растений. 1995. Т. 9. С. 34–35.

Ильина Л.С., Карпачевский Л.О., Северин А.К., Зологпаревский Ю.В. Майзенберг М.С. Почвообразование на курумах // Деградация и восстановление лесных почв. М.: Наука, 1991. С. 53–67.

Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир. 1989. 440 с.

Каганов В.В., Ежкин А.К. Новые местонахождения редких и охраняемых лишайников с острова Сахалин // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. 2019. Вып. 21. С. 1–8.

Кадастровая информация национального парка «Удэгейская легенда» за 2009–2012 г. URL: <http://ud-legend.ru/park/o-parke/> (дата обращения: 19.12.2016).

Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений // Труды Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. 1993. Вып. 9. С. 1–120.

Карпачевский Л.О. Почвообразование в горах Сихотэ-Алиня. М.: ГЕОС, 2012. 138 с.

Карта сейсмического районирования СССР. М., 1983.

Катаева О.А. *Ramalina sekika* Asahina (Ramalinaceae) – новый для России вид с Дальнего Востока // Новости систематики низших растений. 2014. Т. 48. С. 256–263.

Кириленко Т.С. Определитель почвенных сумчатых грибов. Киев: Наук. думка, 1978. 264 с.

Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

Княжева Л.А. Лишайники юга Приморского края // Комаровские чтения, 1973. Вып. 20. С. 34–46.

Княжева Л.А. Лишайники // Флора и растительность Уссурийского заповедника. М., 1978. С. 115–126.

Княжева Л.А., Семенова Е.А. К лишенофлоре Уссурийского заповедника. Сем. Lecanogaseae. // Изучение флоры и растительности Дальнего Востока. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1979. С. 83–90.

Княжева Л.А., Скирина И.Ф. Лишайники // Растительный и животный мир Сихотэ-Алинского заповедника. М.: Наука, 1982. С. 44–47.

Ковда В.А., Васильевская В.Д. Исследование содержания микроэлементов в почвах Приамурья // Почвоведение. 1958. № 12. С. 68–76.

Кожевников А.Е. Биологическое разнообразие сосудистых растений российского Дальнего Востока: основные флористико-систематические параметры // Вестник ДВО РАН. 2003. № 3. С. 39–53.

Кожевников А.Е. Сем. Санталовые – Santalaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1995. Т. 7. С. 241–244.

Кожевников А.Е. Сем. Сытевые – Surgeraceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1988. Т. 3. С. 175–403.

Кожевников А.Е., Кожевникова З.В. Таксономический состав и особенности природной флоры Приморского края // Комаровские чтения. 2014. Вып. 62. С. 7–62.

Колесников Б.П. О кустарниковой форме тиса остроконечного (*Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc. ex Endl.) // Вестник ДВФ СО АН СССР. 1935. С. 31–45.

Колесников Б.П. Конспект лесных формаций Приморья и Приамурья / академику В.Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. м.; Л., 1956а. С. 286–305.

Колесников Б.П. Природное районирование Приморского края // Вопросы сельского и лесного хозяйства. Вып. 1. Владивосток, 1956б. С. 5–16.

Колесников Б.П. Столетие первой экспедиции по изучению лесов Приморья и Приамурья // Вопросы сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Владивосток: ДВ филиал СО АН СССР, 1961. Вып. 3. С. 5–11.

Колесников Б.П. Растительность // Южная часть Дальнего Востока. М.: Наука, 1969. С. 206–250.

Коропачинский И.Ю. Сем. Сосновые – Pinaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Т. 4 / ред. С.С. Харкевич. Л.: Наука, 1989. С. 9–20.

Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской России. Новосибирск: Изд-во СО РАН. Филиал «Гео», 2002. 707 с.

Коротков Ю.М. К биологии дальневосточной жерлянки, восточного и палласова щитомордника в Приморском крае // Зоологические проблемы Сибири. Новосибирск, 1972. 302 с.

Коротков Ю.М. Амфибии и рептилии Приморского края (систематика, распространение, экология): автореф. дис. ... канд. биол. наук. Владивосток, 1974. 213 с.

Коротков Ю.М. Наземные пресмыкающиеся Дальнего Востока СССР. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1985. 135 с.

Коротков Ю.М., Короткова Е.Б. Экология дальневосточной жерлянки (*Bombina orientalis*) // Редкие и исчезающие животные суши Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 46–51.

Кочунова Н.А. Ксилотрофные базидиальные грибы Зейского заповедника (Амурская область) // Комаровские чтения. 2016. Вып. 64. С. 119–137.

Красная книга Приморского края. Животные. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Владивосток, 2005. 448 с.

Красная книга Российской Федерации. Животные. М.: Астрель, 2001. С. 315–325.

Красная книга Приморского края. Растения. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. Владивосток: АВК «Апельсин», 2008. 688 с.

Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

Красная книга Хабаровского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных: официальное издание / Мин-во природных ресурсов Хабаровского края, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. Хабаровск: ИД «Приамурские ведомости», 2008. С. 507–522.

Крестов П.В. Редкие сообщества лесной растительности среднего течения реки Большая Уссурка // Арсеньевские чтения. 1992. Вып. 6. С. 281–283.

Крестов П.В. Редкие растительные сообщества в широколиственно-хвойном поясе бассейна реки Большая Уссурка (Средний Сихотэ-Алинь) // Ботанический журнал. 1993а. Т. 78 (8). С. 107–115.

Крестов П.В. Эколого-фитоценотическая характеристика лесов широколиственно-хвойного пояса среднего течения реки Большая Уссурка (Приморский край) // Ботанический журнал. 1993б. Т. 78 (4). С. 116–122.

Крестов П.В., Верховат В.П. Редкие растительные сообщества Приморья и Приамурья. Владивосток: ДВО РАН, 2003. 200 с.

Кузмичев С.А. О месте грибов в биогеоценозах Земли // Проблемы региональной экологии, 2007. Т. 4. С. 138–141.

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. 370 с.

Кузьмин С.Л., Маслова И.В. Земноводные российского Дальнего Востока. М.: КМК, 2005. 434 с.

Куренцов А.И. Зоогеографические результаты поездки в Средний Сихотэ-Алинь // Доклады АН СССР, 1935 Т. 4 (9). С. 357–359.

Куренцов А.И. Чешуекрылые бассейна рр. Имана и Колумбе // Вестник ДВФ АН СССР. 1935. № 13. С. 49–69.

Куренцова Г.Э. Реликтовые растения Приморья. Л.: Наука, 1968. 72 с.

Легалов А.А. Семейство Bruchidae – Зерновки // Насекомые Лазовского заповедника. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 181–182.

Леса Дальнего Востока глазами первопроходцев / сост.: Ю.И. Манько, А.Ж. Пуреховский; под науч. ред. Ю.И. Манько. СПб: Изд. Д.В. Львов, 2016. 512 с.

Лугаускас А.Ю. Микромицеты окультуренных почв Литовской ССР. Вильнюс: Мокслас, 1988. 263 с.

Лугаускас А.Ю., Микульскене А.И., Шляужене Д.Ю. Каталог микромицетов – биодеструкторов полимерных материалов. М.: Наука, 1987. 340 с.

Луферов А.Н., Стародубцев В.Н. Сем. Лютиковые – Ranunculaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1995. Т. 7. С. 9–145.

Любарский Л.В., Васильева Л.Н. Дереворазрушающие грибы Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1975. 164 с.

Маак Р.К. Путешествие по долине реки Уссури. Т. 1. Издательство: Книга по требованию, 2011. С. 238.

Маак Р.К. Путешествие по долине реки Уссури. О растительности Уссурийской страны. Т. 2. Издательство: Книга по требованию, 2012. С. 384.

Максимович К.И. Амурский край (географический очерк). Приложение № 2 ко II т. Записок Имп. Академии наук, 1862. 90 с.

Манько Ю.И., Дон Ку Ли. Проблема сохранения биоразнообразия в лесах Приморского края // Сибирский экологический журнал. 2005. № 4. С. 589–596.

Мартыненко А.Б., Бочарников В.Н. Экологическое районирование Дальнего Востока // Известия РАН. Сер. географическая. 2008. № 2. С. 76–84.

Марфенина О.Е. Микробиологические аспекты охраны почв. М.: Изд-во МГУ, 1991. 120 с.

Маслова И.В., Чернобровин А.Д., Загладова М.В. Взаимоотношения людей и змей в Приморском крае // IX Междунар. экол. форум, 29–30 октября 2015 г. Ч. 2. Владивосток: ДВФУ, 2015. С. 148–153.

Мацишина Н.В. Особенности биологии и экологии колорадского жука *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1872) (Coleoptera, Chrysomelidae) в Приморском крае: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Владивосток: БАЛС, 2012. 20 с.

Медведев Л.Н. Семейство Chrysomelidae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. СПб.: Наука, 1992. Т. 3, вып. 2. С. 533–602.

Медведев Л.Н. К фауне жуков-листоедов (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) Амурской области и Хабаровского края // Труды Государственного природного заповедника «Буреинский». Хабаровск, 2008. Вып. 4. С. 63–77.

- Медведев Л.Н. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Еврейской автономной области // Региональные проблемы. 2009. Вып. 12. С. 41–45.
- Медведев Л.Н. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Лазовского заповедника // Евразийский энтомологический журнал. 2010. Т. 9 (3). С. 485–488.
- Медведев Л.Н. К фауне жуков-листоедов (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) Буреинского нагорья // Труды Государственного природного заповедника «Буреинский». 2012. Вып. 5. С. 49–56.
- Медведев Л.Н. К фауне жуков-листоедов Сибири и Дальнего Востока России // Региональные проблемы. 2014. Т. 17 (1). С. 35–39.
- Медведев Л.Н., Рогинская Е.Я. Каталог кормовых растений листоедов СССР. М.: Изд-во ИЭМЭЖ АН СССР, 1988. 190 с.
- Методы изучения лесных сообществ. Спб.: НИИ химии СПбГУ, 2002. 240 с.
- Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. М.: Изд-во МГУ, 1988. 220 с.
- Михайлов Ю.Е., Чащина О.Е. Chrysomelidae sensu lato – Листоеды // Насекомые Лазовского заповедника. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 178–189.
- Мосейко А.Г. Трещалки группы *Duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны России и сопредельных стран // Энтомологическое обозрение. 2017. Т. 76 (2). С. 339–349.
- Мухина Л.Н. Микробиоты – патогены голубики высокорослой // Бюллетень Главного ботанического сада. 1986. Вып. 143. С. 63–67.
- Назаркина А.В. Литологические особенности и гидрофизические свойства почв долин рек Сихотэ-Алиня. Владивосток: Дальнаука, 2008. 142 с.
- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Сер. 3. Ч. 1–6. Вып. 26. Приморский край. Л.: Гидрометеиздат, 1988. 416 с.
- Недолужко В.А. Сем. Ивовые – Salicaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1995. Т. 7. С. 145–212.
- Ознобихин В.И., Синельников Э.П., Рыбачук Н.А. Классификация и агропроизводственные группировки почв Приморского края. Владивосток: БПИ ДВО РАН, 1994. 94 с.
- Орлова-Беньковская М.Я. Справочник по чужеродным жесткокрылым европейской части России. Справочник. Ч. 1. Ливны: Изд-во Мухаметов Г.В., 2019. 550 с.
- Охотина М.В. К уточнению границ ареалов некоторых амфибий и рептилий Приморья // Сообщения Дальневосточного филиала им. В.Л. Комарова СО АН СССР. Владивосток: ДВФ СО СССР, 1959. Вып. 11. С. 139–143.
- Павлова Н.С., Безделева Т.А. Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1996. Т. 8. С. 28–125.
- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. 528 с.
- Перова Н.В., Горбунова И.А., Королюк А.Ю. Особенности биоты макромицетов в сообществах мезофильно-травяных березово-сосновых лесов Южной Сибири // Сибирский экологический журнал. 2003. Т. 4. С. 433–443.

Полевой определитель почв. М.: Почвенный институт им В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

Портнягина Е.Ю., Маслова И.В. Отдельные аспекты биологии *Takydromus wolteri* и *Takydromus amurensis* // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21). С. 61–66.

Пробатова Н.С. Сем. Мятликовые – Poaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1985. Т. 1. С. 89–382.

Пробатова Н.С., Крестовская Т.В. Сем. Яснотковые – Lamiaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1995. Т. 7. С. 294–379.

Пчелкин А.В. Лишайники-эпифиты некоторых лесообразующих пород Сихотэ-Алинского заповедника // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Л., 1981. Т. 4. С. 86–93.

Пчелкин А.В. Новые и интересные таксоны лишайников-эпифитов Дальнего Востока // Новости систематики низших растений. 1987. Т. 24. С. 166–168.

Растворова О.Г. Физика почв (практическое руководство). Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 96 с.

Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Изд-во МГУ, 1983. 321 с.

Рубцова Т.А. Флора Еврейской автономной области. Хабаровск: Антар, 2017. 241 с.

Селиванов И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Советского Союза. М: Наука, 1981. 232 с.

Семенищева Е.Ю., Маслова И.В. О распространении ящериц рода *Takydromus* в южных районах российского Дальнего Востока // Казанская наука. 2010. Вып. 8, № 1. С. 40–45.

Сергеев М.Е. К изучению жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) особо охраняемых территорий Приморского края // Кавказский энтомологический бюллетень. 2015. Т. 11 (1). С. 49–55.

Сергеев М.Е. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae: Megalopodidae) Сихотэ-Алинского заповедника // Чтения памяти А.И. Куренцова. Владивосток, 2016а. Вып. 27. С. 107–114.

Сергеев М.Е. Материалы к фауне жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae: Megalopodidae: Orsodacnidae) заповедника «Кедровая падь» // Амурский зоологический журнал, 2016б. Вып. 8. С. 37–42.

Сергеев М.Е. Материал к фауне жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae: Megalopodidae) Ханкайского заповедника // Труды Мордовского природного заповедника имени П.Г. Смиловича, 2017. Вып. 19. С. 189–205.

Сергеев М.Е. Роль сети ООПТ в сохранении биоразнообразия жуков-листоедов (Coleoptera: Megalopodidae, Chrysomelidae, Orsodacnidae) Приморского края // Материалы конф. «Вклад ООПТ в экологическую устойчивость регионов: современное состояние и перспективы». Кологрив, 2018а. С. 234–240.

Сергеев М.Е. Новая находка *Paridea angulicollis* (Motschulsky, 1854) (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) в Приморском крае // Российский журнал биологических инвазий. 2018б. Вып.3. С. 116–118.

Сергеев М.Е. Жуки-зерновки (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) Сихотэ-Алинского заповедника // Чтения памяти А.И. Куренцова. Владивосток, 2019. Вып. 30. С. 122–128.

Сибирина Л.А., Гладкова Г.А., Бутовец Г.Н., Крониковская Н.Д. Реликтовый кедрово-елово-тисовый лес с лиственными породами в национальном парке «Удэгейская легенда» // Вестник ДВО РАН. 2015. № 5. С. 70–77.

Скирина И.Ф. Лихенофлора пихтово-еловых лесов с тисом на восточных склонах Среднего Сихотэ-Алиня // Сихотэ-Алинский биосферный район. Экологические исследования. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. С. 21–27.

Скирина И.Ф. Лишайники западных склонов Среднего Сихотэ-Алиня: препр. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. 24 с.

Скирина И.Ф. Лишайники Сихотэ-Алинского биосферного района. Владивосток: Дальнаука, 1995. 132 с.

Скирина И.Ф. Лихенологические исследования в заповедниках // III Дальневост. конф. по заповедному делу. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 106.

Скирина И.Ф. Лихенологические и лихеноиндикационные исследования в заповеднике «Кедровая падь» // Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 1999. Вып. 4. С. 129–134.

Скирина И.Ф. Список лишайников Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) // Новости систематики низших растений. 2012. Том 46. С. 202–216.

Скирина И.Ф. Новые местонахождения охраняемых лишайников юга Дальнего Востока России // Turczaninowia. 2013, 16 (2): 84–87.

Скирина И.Ф. Список лишайников заповедника «Бастак» // Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2015а. № 4. С. 28–87.

Скирина И.Ф. Список лишайников Сихотэ-Алинского заповедника // Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2015б. № 3. С. 10–103.

Скирина И.Ф. Лишайники // Растения, грибы и лишайники Сихотэ-Алинского заповедника. Дальнаука: Владивосток, 2016. С. 458–525.

Скирина И.Ф. 2017. Список лишайников заповедника «Кедровая падь» // Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 1 (10) С. 83–121.

Скирина И.Ф., Галанина И.А., Осипов С.В., Дудник А.В. Данные о лишайниках Буреинского заповедника // Труды Государственного природного заповедника «Буреинский». 2007. Вып. 3. С. 80–84.

Скирина И.Ф., Княжева Л.А. Лишайники восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня: препр. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. 41 с.

Скирина И.Ф., Княжева Л.А. Лихенофлора пихтово-еловых лесов восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня // Брио-лихенологические исследования в СССР. Апатиты: АН СССР, 1986. С. 111–112.

Скирина И.Ф., Княжева Л.А. Лихенофлора дубняков восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня // Брио-лихенологические исследования в СССР. Апатиты: АН СССР, 1987а. С. 44–49.

Скирина И.Ф., Княжева Л.А. Лишайники на рододендроне Фори в лесах Среднего Сихотэ-Алиня // Сихотэ-Алинский биосферный район: фоновое состояние природных компонентов. Владивосток: ДВО АН СССР, 1987б. С. 40–44.

Скирина И.Ф., Родникова И.М. Лихенофлора Уссурийского заповедника // Геохимия ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез: тез. Междунар. симп. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. С. 203–204.

Скирина И.Ф., Родникова И.М. Список лишайников островов и прибрежных участков Дальневосточного морского биосферного заповедника // Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2014. № 2. С. 92–122.

Скирина И.Ф., Родникова И.М., Скирин Ф.И. Видовой состав лишайников Приханкайской равнины (Приморский край) // Новости систематики низших растений. 2009. Т. 43. С. 213–228.

Скирина И.Ф., Салохин А.В., Царенко Н.А., Скирин Ф.В. Новые местонахождения редких и охраняемых лишайников острова Сахалин // Turczaninowia. 2016. Т. 19, вып. 2. С. 54–63.

Скирина И.Ф., Скирин Ф.В. Дополнительные сведения о лишайниках Приморского края (Южный Сихотэ-Алинь) // Имуннопатология. Аллергология. Инфектология. 2010. № 1. С. 128–129.

Скирина И.Ф., Скирин Ф.В. Дополнения к лишайнобиоте юга Дальнего Востока России) // Современная ботаника в России / Рус. ботан. о-во: труды XIII съезда; Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна: материалы конф., Тольятти 16–22 сентября 2013. Тольятти: Кассандра, 2013. Т. 1: Эмбриология. Палеоботаника. Биосистематика. С. 178–179.

Скирина И.Ф., Скирин Ф.В. Редкие и слабоизученные лишайники Приморского края (Дальний Восток России) // Turczaninowia. 2014. Т. 17, № 2. С. 49–52.

Смицкая М.Ф. Экологические группы пецицевых грибов и их роль в почвообразовании // Систематика, экология и физиология почвенных грибов. Киев: Наук. думка, 1975. С. 91–92.

Солодухин Е.Д. Деревья, кустарники и лианы советского Дальнего Востока. Уссурийск: ПримСХИ, 1962. 221 с.

Сосудистые растения советского Дальнего Востока / отв. ред. С.С. Харкевич. СПб.: Наука, 1985–1996. Т. 1–8.

Справочник для учета лесных ресурсов Дальнего Востока. Хабаровск: ФГУ ДальНИИЛХ, 2010. 528 с.

Справочник по климату СССР. Вып. 26. Приморский край. Ч. 1. Солнечная радиация. Л.: Гидрометиздат, 1966а. 72 с.

Справочник по климату СССР. Вып. 26. Приморский край. Ч. 2. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометиздат, 1966б. 220 с.

Стороженко В.Г. Микоценоз и микоценология. Теория и эксперимент. Тула: Гриф и К, 2012. 192 с.

Стороженко С.Ю. Обзор фауны кузнечиковых (Orthoptera, Tettigonioidea) Дальнего Востока // Таксономия насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1980. С. 10–19.

Стороженко С.Ю. Ревизия рода *Zubovskya* Dov.-Zap. (Orthoptera, Acrididae) // Труды Зоологического института АН СССР. 1986. Т. 143. С. 47–58.

Стороженко С.Ю. Наземные ортоптероидные насекомые (Orthopteroidea) Дальневосточного государственного морского заповедника // Новые данные по систематике насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1987. С. 4–10.

Стороженко С.Ю. Обзор рода *Arcyptera* Aud.-Serv. (Orthoptera, Acrididae) // Труды Зоологического института АН СССР, 1988. Т. 178. С. 47–55.

Стороженко С.Ю. Длинноусые прямокрылые насекомые (Orthoptera: Ensifera) азиатской части России. Владивосток: Дальнаука, 2004. 280 с.

Стороженко С.Ю. Прямокрылые насекомые (Orthoptera) Дальнего Востока России и сопредельных стран // Чтения памяти А.И. Куренцова. 2017. Вып. 28. С. 46–53.

Стороженко С.Ю., Сергеев М.Е. К фауне прямокрылых насекомых (Orthoptera) Сихотэ-Алинского заповедника // Амурский зоологический журнал. 2015. Т. 7. Вып. 3. С. 220–222.

Сукачѳ В.Н. Биогеоценология и фитоценология // Доклады АН СССР. 1945. Т. 47 (6). С. 447–449.

Сукачѳ В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. М.: Изд. АН СССР, 1961. 144 с.

Сундуков Ю.Н. Предварительный список насекомых (Insecta) и пауков (Aranei) // Фауна национального парка «Зов тигра». Аннотированные списки видов. Владивосток, 2011. С. 117–119.

Терехова В.А. Микромицеты в экологической оценке водных и наземных экосистем. М: Наука, 2007. 215 с.

Томилин Б.А. Проблемы изучения грибов как компонентов биогеоценозов // Изучение грибов в биогеоценозах: тез. док. симп., Москва, 1977. Л.: Наука, 1977. С. 3–5.

Уранов А.А. О сопряженности компонентов растительного ценоза // Учёные записки Московского педагогического института, факультет естествознания. 1935. Вып. 1. С. 59–84.

Урбанавичюс Г.П. Список лишенофлоры России. СПб.: Наука, 2010. 194 с.

Флора российского Дальнего Востока: Дополнения и изменения к изданию «Сосудистые растения советского Дальнего Востока». Т. 1–8 (1985–1996) / отв. ред. А.Е. Кожевников и Н.С. Пробатова. Владивосток: Дальнаука, 2006. 456 с.

Харкевич С.С. Сем. Крыжовниковые – Grossulariaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1988. Т. 3. С. 115–131.

Хохряков А.П., Мазуренко М.Т. Сем. Вересковые – Ericaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1991. Т. 5. С. 119–166.

Цвелев Н.Н. Сем. Водноореховые – Trapaeeae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1995. Т. 7. С. 241–244.

Цвелев Н.Н. Сем. Вудсиевые – Woodsiaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1991. Т. 5. С. 81–87.

Цвелев Н.Н. Сем. Гречиховые – Polygonaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1989. Т. 4. С. 25–122.

Цыбек А.А. Лиственные породы Дальнего Востока, пути их использования и воспроизводства. Хабаровск: Кн. изд-во, 1956. 327 с.

Цирюлик А.В., Шевченко С.В. Грибы лесных биогеоценозов. Киев: Выща шк., 1989. 45 с.

Чабаненко С.И. Лихенофлора острова Петрова // Исследования природного комплекса Лазовского госзаповедника. М., 1984. С. 5–13.

Чабаненко С.И. Виды рода *Lobaria*, охраняемые в Лазовском заповеднике // Тез. докл. 11-го симп. микологов и лишенологов прибалт. республик и Белоруссии. Таллин, 1988. С. 183–186.

Чабаненко С.И. Лишайники // Флора, мико- и лишенобиота Лазовского заповедника. Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. С. 167–191.

Чабаненко С.И. Новые и редкие виды Лазовского заповедника // III Дальневост. конф. по заповедному делу. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 128–129.

Чабаненко С.И. Заметки о роде *Hypogymnia* охраняемых территорий юга российского Дальнего Востока // IV Дальневост. конф. по заповедному делу. Владивосток: Дальнаука, 1999. С. 168–169.

Чабаненко С.И. Коспект флоры лишайников юга российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2002. 232 с.

Чабаненко С.И. Обзор видов рода *Nipponoparmelia* (Parmeliaceae) России // Новости систематики низших растений. 2018. Т. 52 (2). С. 435–444.

Частухин В.Я. Экологический анализ распада растительных остатков в еловых лесах // Почвоведение. 1945. № 2. С. 10–23.

Частухин В.Я. Экологический анализ распада растительных остатков в молодых сосновых насаждениях // Почвоведение. 1948. № 2. С. 13–28.

Частухин В.Я., Николаевская М.А. Биологический распад и ресинтез органических веществ в природе. Л., 1969. 326 с.

Черданцева В.Я., Бакалин В.А., Яковченко Л.С., Чой С.С. Бриофлора и лишенобиота горы Литовка (Ливадийский хребет, российская Манчжурия) // Комаровские чтения. 2013. Вып. 61. С. 9–49.

Черемисинов Н.А., Негруцкий С.Ф., Лешковцева И.И. Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников. М., 1970. 392 с.

Шемаханова Н.М. Микотрофия древесных пород. М., 1962. 375 с.

Шенников А.П. О фитоценологических исследованиях шляпочных грибов // Советская ботаника. 1943. № 2. С. 5–17.

Шишкин И.К. Материалы к флоре бассейна р. Имана (ДВК, Хабаровский край) // Записки Владивостокского отделения РГО. Владивосток, 1930. Т. 5, вып. 2. С. 5–173.

Шмаков А.И. Определитель папоротников России. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. 108 с.

Шубин В.И. Микоризные грибы северо-запада европейской части СССР (экологическая характеристика). Петрозаводск, 1988. 175 с.

Яковченко Л.С., Галанина И.А., Малашкина Е.В., Бакалин В.А. Мохообразные и лишайники малонарушенных лесных сообществ в Нижнем Приамурье (российский Дальний Восток) // Комаровские чтения. 2013. Вып. 60. С. 9–68.

Якубов В.В. Недолужко В.А., Шанцер И.А., Тихомиров В.Н., Румянцев С.Д. Розовые // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1996. Т. 8. С. 125–246.

Ярцев В.В., Куранова В.Н., Маслова И.В., Крюков В.Х. Географическая и межвидовая изменчивость размеров кладок и размеров самок углозубов рода *Salamandrella* (Amphibia: Caudata, Hynobiidae) // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2016. № 2 (34). С. 126–149.

Anton K.-W. Chrysomeloidea: Bruchinae // Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Stenstrup: Apollo Books, 2010. Vol. 6. P. 339–354.

Baral H.O. Die Apikalapparat der Helotiales. Eine lichtmikroskopische Studie über Arten mit Amyloidring // Zeitschrift für Mykologie. 1987a. V. 53. P. 119–135.

Baral H.O. Lugol's solution/IKI versus Melzer's reagent: hemiamyloidity, a universal feature of the ascus wall // Mycotaxon. 1987b. Vol. 29. P. 399–450.

Baral H.O. Vital versus herbarium taxonomy; morphological differences between living and dead cells of ascomycetes, and their taxonomic implications // Mycotaxon. 1992. Vol. 46 (2). P. 333–390.

Bey-Bienko G. Ja. Orthoptera palaeartica critica. XI. The group Chrysochraontes (Acrid.) // Eos. 1932. Vol. 8 (1). P. 43–92.

Bieńkowski A.O. Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe. New key to subfamilies, genera and species. Moscow: Mikron-print, 2004. 278 p.

Bieńkowski A.O. Chrysolina of the world-2019 (Coleoptera: Chrysomelidae). Taxonomic review. Livny: Mukhametov G.V. Publ., 2019. 920 p.

Cho H.-W., Kippenberg H., Borowiec L. Revision of the *Gonioctena nivosa* species-group (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae) in the Holarctic region, with description of two new species // ZooKeys. 2016. Vol. 596. P. 87–128.

Cigliano M.M., Braun H., Eades D.C., Otte D. 2020. Orthoptera Species File Online. Version 5.0/5.0. Available from: <http://Orthoptera.SpeciesFile.org>. (Accessed: 23 March 2020).

Dai, Y.-C., Wang Z., Binder M., Hibbett D.S. Phylogeny and a new species of Sparassis (Polyporales, Basidiomycota): evidence from mitochondrial atp6, nuclear rDNA and rpb2 genes // Mycologia. 2006. Vol. 98. P. 584–592.

- Danielson R.M. Ectomycorrhiza formation by the operculate discomycete *Sphaerosporella brunnea* (Pezizales) // *Mycologia*. 1984. Vol. 76. P. 454–461.
- Davydov E.A., Tchabanenko S.I., Makryi T.V., Khanin V.A. The second confirmed record of *Umbilicaria pulvinaria* (Lichenized Ascomycota) since its original description in 1914 // *Turczaninowia*. 2011. Vol. 14 (2). P. 119–122.
- Döberl M. Chrysomeloidea: Alticinae // *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Stenstrup: Apollo Books, 2010. Vol. 6. P. 491–563.
- Hanson H.C. A comparison of methods of botanical analysis of the native prairie in western North Dakota // *J. Agric. Res.* 1934. Vol. 49 (9). P. 17–21.
- Hawksworth D.L. *Mycologist's Handbook*. Surrey: CAB International, 1974. 231 p.
- Frost D. [1998–2018]. *Amphibian Species of the World 6.0: an online reference*. Version 5.4. Electronic Database. <http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/index.php/> The American Museum of Natural History, New York, USA, accessed April 18, 2018.
- Ezhkin A.K. *Megalospora porphyritis* (Tuck.) R.C. Harris, a new record for Russia // *Botanica Pacifica*. 2018. Vol. 7 (2). P. 143–145.
- Ezhkin A.K., Jørgensen P.M. New Records of Pannariaceae (Lichenized Ascomycota) from Sakhalin and the Kuril Islands, Russian Far East // *Evansia*. 2018. Vol. 35 (2). P. 43–52.
- Ezhkin A.K., Schumm F. New and noteworthy records of lichens and allied fungi from Sakhalin Island, Russian Far East, II // *Folia Cryptogamica Estonica*. 2018. Vol. 55. P. 45–50.
- Galanina I.A. Epiphytic Lichens of Vladivostok Botanical Garden (Primorskii Krai, Russia) // *Annals of the Tsukuba Botanical Garden*. 2006. Vol. 25. P. 25–42.
- Galanina I.A., Ezhkin A.K. Genus *Rinodina* in the Kuril Islands (Russian Far East) // *Turczaninowia*. 2019. Vol. 22 (4). P. 5–16.
- Galanina I.A., Ezhkin A.K., Yakovchenko L.S. New records of *Rinodina megistospora* (Physciaceae, lichenized Ascomycota) from north-eastern Asia // *Novitates Systematicae Plantarum non Vascularium*. 2018. Vol. 52 (1). P. 133–139.
- Galanina I.A., Yakovchenko L.S., Tsarenko N.A., Spribille T. Notes on *Rinodina excrescens* Vainio in the Russian Far East (Physciaceae, lichenized Ascomycota) // *Herzogia*. 2011. Vol. 24 (1). P. 59–64.
- Gerasimova J.V., Ezhkin A.K., Beck A. Four new species of *Bacidia* s.s. (Ramalinaceae, Lecanorales) in the Russian Far East // *The Lichenologist*, 2018. Vol. 50 (6). P. 603–625.
- Kabata-Pendias A. *Trance elements in soil and plants*. Taylor and Francis Group, LLC, 2011. 534 p.
- Kondratyuk S.Y., Elix J.A., Galanina I.A., Yakovchenko L.S., Karnefelt I., Thell A. Four new *Caloplaca* species (Teloschistaceae, Ascomycotina) // *Folia Cryptogamica Estonica*. 2011. Vol. 48. P. 17–23.
- Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Tschabanenko S., Skirina I., Galanina I., Oh S.-O., Hur J.-S. *Caloplaca kedrovopadensis* sp. nova and some new lichens from the Primorsky region, Russia // *Acta Botanica Hungarica*. 2014. Vol. 56 (1–2). P. 1–16.

Kondratyuk S.Y., Lököš L., Zarei-Darki B., Moniri M.H., Tchabanenko S.I., Galanina I., Yakovchenko L., Hooshmand F., Ezhkin A.K., Hur J.-S. Five new *Caloplaca* species (Teloschistaceae, Ascomycota) from Asia // *Acta Botanica Hungarica*. 2013a. Vol. 55 (1–2). P. 41–60.

Kondratyuk S.Y., Tschabanenko S.I., Elix J.A., Oh S.O., Thell A., Hur J.S. *Nipponoparmelia perplicata* sp. nov. (Parmeliaceae, Ascomycota) from eastern Asia // *Mycotaxon*. 2013b. Vol. 126. P. 37–44.

Konoreva L., Chesnokov S., Kuznetsova E., Stepanchikova I. Remarkable records of *Micarea* from the Russian Far East and significant extension of *Micarea laeta* and *M. microareolata* range // *Botanica*. 2019. Vol. 25 (2). P. 186–201.

Konoreva L., Chesnokov S., Stepanchikova I., Frolov I., Gagarina L., Tchabanenko S. Discovery of *Coenogonium isidiatum* (Coenogoniaceae, Ostropomycetidae) disjunct in northeastern Asia // *Opuscula Philolichenum*. 2018a. Vol. 17. P. 322–329.

Konoreva L.A., Tchabanenko S.I., Ezhkin A.K., Schumm F., Chesnokov S.V. New and noteworthy lichen and allied fungi records from Sakhalin Island, Far East of Russia // *Herzogia*. 2018b. Vol. 31 (1). P. 276–292.

Kuznetsova E.S., Dudov S.V. New records of lichens from the Zeysky Nature Reserve (Amur Region, Russia) // *Folia Cryptogamica Estonica*. 2017. Vol. 54. P. 51–58.

Kuznetsova E.S., Motiejūnaitė J., Galanina I.A., Yakovchenko L.S. *Bacidia suffusa* and *Taeniolella punctata* new to the Russian Far East // *Graphis scripta*. 2013. Vol. 25. P. 51–55.

Lopatin I.K., Aleksandrovich O.R., Kostantinov A.S. Check list of leaf-beetle (Chrysomelidae, Coleoptera) of the Eastern Europe and northern Asia. Olsztyn: Mantis, 2004. 336 p.

Maslova I.V. The protection of amphibians and reptiles in the Russian Far East // *Nature Conservation Research. Заповедная наука*. 2016. Vol. 1 (3). P. 26–35.

Maslova I.V., Lyapustin S.N. Illegal export of amphibian and reptilians from Russian Far East to countries of Asia Region – the situation at present // *Herpetologia Petropolitana: Proceedings of 12 th Ordinary Meeting of Societas Europaea Herpetologica*. St.-Petersburg: Zoological Institute RAS, 2005. P. 191–192.

Maslova I.V., Portnyagina E. Yu., Sokolova D.A., Vorobieva P.A., Akulenko M.V., Arseniy S. Portnyagin A.S., Alexey A. Somov A.A. Distribution of rare and endangered amphibians and reptiles in Primorsky Krai (Far East, Russia) // *Nature Conservation Research. Заповедная наука*. 2018. Vol. 3 (1). P. 61–72.

McCune B., Tchabanenko S. *Hypogymnia arcuata* and *H. sachalinensis*, two new lichens from East Asia // *Bryologist*. 2001. Vol. 104 (1). P. 146–150.

McCune B., Tchabanenko S., Wei X.L. *Hypogymnia papilliformis* (Parmeliaceae), a new lichen from Far East Russia and China // *The Lichenologist*. 2015. Vol. 47 (2). P. 117–122.

Ohmura Y., Skirina I., Skirin F. Contribution to the knowledge of the genus *Usnea* (Parmeliaceae, Ascomycota) in southern Far East Russia // *Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Ser. B*. 2017. Vol. 43 (1). P. 1–10.

Pfister D.H. A synopsis of the North American species of *Byssonectria* (Pezizales) with comments on the ontogeny of two species // *Mycologia*. 1993. Vol. 85. P. 952–962.

Pfister, D.H. *Orbilia fimicola*, a nematophagous discomycete and its *Arthrobotrys* anamorph // *Mycologia*. 1994. Vol. 86 (3). P. 451–453.

Pfister D.H. A further note on *Byssonectria* (Pezizales) // *Mycotaxon*. 1995. Vol. 53. P. 431–432.

Pfister D.H., Liftik M.E. Two *Arthrobotrys* anamorphs from *Orbilia auricolor* // *Mycologia*. 1995. Vol. 87 (5). P. 684–688.

Portniagina E. Yu., Maslova I.V., Han S.H. Habitat and altitudinal distribution of two lizard species of genus *Takydromus* from the Northeast Asia (Far East of Russia, Republic of Korea) // *Russian Journal of Herpetology*. 2019. Vol. 26, N 1. P. 8–16.

Sergeev M.E. The leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Far Eastern State Marine Reserve, Primorskii krai // *Far Eastern Entomologist*. 2019. Vol. 375. P. 11–19.

Sheard J.W., Ezhkin A.K., Galanina I.A., Himelbrant D., Kuznetsova E., Shimizu A., Stepanchikova I., Thor G., Tønsberg T., Yakovchenko L.S., Spribille T. The lichen genus *Rinodina* (Physciaceae, Caliciales) in north-eastern Asia // *The Lichenologist*. 2017. Vol. 49 (6). P. 617–672.

Slipinski S.A., Leschen R.A.B., Lawrence J.F. Order Coleoptera // *Zootaxa*. 2011. Vol. 3148. P. 203–208.

Storozhenko S. Two new species of the genus *Primnoa* Fisher-Waldheim, 1846, from the Soviet Union (Orthoptera, Acrididae) // *Entomofauna*. 1991. Bd 12, H. 14. P. 165–170.

Storozhenko S. Review of Orthoptera of the Eastern Palearctica: Genus *Tettigonia* Linnaeus (Tettigoniidae, Tettigoniinae) // *Far Eastern Entomologist*. 1994. N3. P. 1–20.

Storozhenko S. Yu., Ichikawa A., Uchida M. Review of Orthoptera of the Eastern Palearctica: Genus *Tetrix* Latreille (Tetrigidae, Tetriginae). Part 1 // *New Entomol*. 1994. Vol. 43 (1–2). P. 6–19.

Tchabanenko S.I., Konoreva L.A., Chesnokov S.V. Lichens collected in the Sakhalin Botanical Garden: New records to Russia, the Russian Far East and Sakhalin Island // *Botanica Pacifica*. 2018. Vol. 7 (1). P. 71–79.

The IUCN Red List of Threatened Species. URL: <http://www.iucnredlist.org/>

Uetz P., Freed P., Hošek J. (Eds.). The Reptile Database. Available at: <http://reptile-database.org> (Retrieved: 24.08.2019).

Verkley G.J.M. A monograph of the genus *Pezicula* and its anamorphs // *Studies in Mycology*. 1999. Vol. 44. P. 1–180.

Vondrák J., Frolov I., Davydov E.A., Urbanavichene I., Chesnokov S., Zhdanov I., Muchnik E., Konoreva L., Himelbrant D., Tchabanenko S. The extensive geographical range of several species of Teloschistaceae: evidence from Russia // *The Lichenologist*. 2016. Vol. 48 (3). P. 171–189.

Vujanovic V., Brisson J.A comparative study of endophytic mycobiota in leaves of *Acer saccharum* in eastern North America // *Mycological Progress*. 2002. Vol. 1 (2). P. 147–154.

Wallwork H.A. *Tapesia* teleomorph for *Pseudocercospora herpotrichoides*, the cause of eyespot of wheat // Australasian Pl. Pathol. 1987. Vol. 16 (4). P. 92–93.

Wallwork H., Spooner B.M. *Tapesia yallundae* – the teleomorph of *Pseudocercospora herpotrichoides* // Trans. Br. mycol. Soc. 1988. Vol. 91 (4). P. 703–705.

Weber E., Bresinsky A. Polyploidy in discomycetes // Persoonia. 1992. Vol. 14 (4). P. 553–563.

Wicklow D.T., Hirschfield B.J. Competitive hierarchy in postfire Ascomycetes // Mycologia. 1979. Vol. 71. P. 47–54.

Yakovchenko L.S., Davydov E.A., Paukov A.G., Ohmura Y. New records of lichens from the Russian Far East. I. *Fuscidea submollis* and other arctic-alpine species // Turczaninowia. 2019. Vol. 22 (3). P. 91–96.

Zhao Y-J., Hosoya T., Baral H.-O., Hosaka K., Kakishima M. *Hymenoscyphus pseudoalbidus*, the correct name for *Lambertella albida* reported from Japan // Mycotaxon. 2012. Vol. 122. October–december. P. 25–41.

Zheng H-D., Zhuang W-Y. *Hymenoscyphus albidoides* sp. nov. and *H. pseudoalbidus* from China // Mycological Progress. 2013. P. 1–14.

Zhurbenko M.P., Ezhkin A.K., Skirina I.F., Ohmura Y. *Dactylospora anziae*, a new lichenicolous ascomycete on *Anzia* from East Asia // Folia Cryptogamica Estonica, 2017. Vol. 54. P. 13–16.


Zhurbenko M.P., Ohmura Y. New and interesting records of lichenicolous fungi from the TNS herbarium: Part I // Opuscula Philolichenum, 2019. Vol. 18. P. 74–89.

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ


В книге использованы фотографии
В.Ю. Баркалова, А.В. Богачевой, Е.М. Булах, Н.В. Бухаровой,
И.А. Галаниной, Г.А. Гладковой, И.В. Масловой, А.Б. Мурьгина,
Л.А. Сибириной, М.Е. Сергеева, О.М. Соколовой, С.Ю. Стороженко
и архив Национального парка «Удэгейская легенда»




Влажный кедрово-широколиственный лес с тисом



Дубняк леспедецевый. Правый берег р. Б. Уссурка



Рододендрово-мелкоосоковый кедровник с дубом. Лаулинский прижим



Тис остроконечный на пробной площади 1-2014



Чозениевый лес низкой поймы Большой Усурки



Ясенево-ильмовый лес. Тенникова база



Acer tegmentosum
Клен зеленокорый



Actinidia kolomikta
Актинидия коломикта



Adiantum pedatum
Адиантум стоповидный



Anemonoides amurensis
Ветровочник амурский



Arisaema amurense
Однопокровница, или аризема амурская



Artemisia sylvatica
Полынь лесная



Aruncus dioicus
Волжанка двудомная



Asineuma japonicum
Свободноцветка, или азинеума японская



Asparagus schoberioides
Спаржа шобериевидная



Aster maackii
Астра Маака



Athyrium sinense
Кочедыжник китайский



Atractylodes ovata
Веретенник яйцевидный



Berberis amurensis
Барбарис амурский



Betula platyphylla
Береза плосколистная



Calamagrostis brachytricha
Вейник короткохолодный



Calla palustris
Белокрыльник болотный



Caltha palustris
Калужница болотная



Calystegia inflata
Повой вздутый



Campanula cephalotes
Колокольчик головковый



Carex capituliformis
Осока головковидная



Carex cryptocarpa
Осока скрытоплодная



Caulophyllum robustum
Стеблелист мощный



Celastrus flagellaris
Древогубец плетнеобразный



Chamaedaphne calyculata
Болотный мирт чашечный



Chamaenerion angustifolium
Иван-чай узколистный



Chamaepericlymenum canadense
Дерен канадский



Chelidonium asiaticum
Чистотел азиатский



Aizopsis middendorffiana
Живучник, или очиток Миддендорфа



Chloranthus japonicus
Хлорант японский



Chrysosplenium pilosum
Селезеночник волосистый



Cirsium schantarense
Бодяк шантарский



Clematis fusca
Ломонос бурый



Clematis mandshurica
Ломонос маньчжурский



Codonopsis lanceolata
Колокольник ланцетный, или кодонопсис
ланцетный



Anaphalis margaritacea
Анафалис жемчужный



Convallaria keiskei
Ландыш Кейске




Corydalis ambigua
Хохлатка сомнительная



Corylus heterophylla
Лещина разнолистная



Cuscuta japonica
Повилика японская



Cypripedium macranthon
Венерин башмачок крупноцветковый



Delphinium maackianum
Живокость Маака



Disporum viridescens
Диспорум зеленеющий



Doellingeria scabra
Доллингерия шершавая




Dryopteris expansa
Щитовник расширенный



Eleutherococcus senticosus
Свободногодник колючий



Eleutherococcus sessiliflorus
Свободногодник сидячецветковый



Eranthis stellata
Шибатерантис звездчатый



Filipendula palmata
Лабазник дланевидный



Fimbripetalum radians
Бахромчатолепестник лучистый



Fragaria orientalis
Земляника восточная



Fraxinus mandshurica
Ясень маньчжурский



Gentiana scabra
Горечавка шероховатая



Geranium eriostemon
Герань волосистотычинковая



Heimerocallis middendorffii
Красоднев Миддендорфа



Hylomecon vernalis
Лесной мак весенний



Hypericum ascyron
Зверобой большой



Impatiens furcillata
Недотрога вильчатая



Coniogramme intermedia
Кониограмма средняя



Iris uniflora
Касатик одноцветковый



Corydalis gigantea
Хохлатка гигантская



Plagiorhegma dubia
Косоплодник сомнительный



Juglans mandshurica
Орех маньчжурский



Kalimeris incisa
Калимерис надрезанный



Lamium barabatum
Яснотка бородатая



Lathyrus humilis
Чина приземистая



Ligularia fischeri
Бузульник Фишера



Ligustrina amurensis
Трескун амурский



Lilium pensylvanicum
Лилия пенсильванская



Corydalis speciosa
Хохлатка прекрасная



Lycopodium annotinum
Плаун годичный



Dryopteris fragrans
Щитовник пахучий



Lythrum salicaria
Дербенник ивовый



Maackia amurensis
Маакия, или окатник амурский



Maianthemum dilatatum
Майник широколистный



Menispermum dahuricum
Луносемянник даурский



Mentha canadensis
Мята канадская



Menyanthes trifoliata
Вахта трехлистная



Moehringia lateriflora
Мерингия бокоцветная



Naumburgia thyrsiflora
Наумбургия кистецветковая, или кизляк



Neomolinia mandshurica
Новомолиния маньчжурская




Iris ensata
Касатик мечевидный



Osmundastrum asiaticum
Чистоустник азиатский



Oxalis acetosella
Кислица обыкновенная



Oxycoccus palustris
Клюква болотная



Leptorumohra amurensis
Лепторумора амурская



Paeonia lactiflora
Пион молочноцветковый



Paeonia obovata
Пион обратнойцевидный



Pedicularis resupinata
Мытник перевернутый



Phellodendron amurense
Бархат амурский



Philadelphus tenuifolius
Чубушник тонколистный



Phleum pratense
Тимофеевка луговая



Phtheirospermum chinense
Фтейроспермум китайский




Oreorchis patens
Горноятрышник раскидистый



Potentilla fragarioides
Лапчатка земляниковидная



Pseudostellaria sylvatica
Звездчаточка лесная



Quercus mongolica
Дуб монгольский



Rabdosia excisa
Прутьевик вырезной



Phyllitis japonica
Листовник



Rhododendron mucronulatum
Рододендрон остроколючный



Ribes mandshuricum
Смородина маньчжурская



Rosa amblyotis
Шиповник тупоушковый



Rubia cordifolia
Марена сердцелистная



Rubus crataegifolius
Рубус боярышниковый, или малина



Salix caprea
Ива козья



Salix pierottii
Ива Пьеро



Salix schwerinii
Ива Шверина



Schisandra chinensis
Лимонник китайский




Serratula mandshurica
Серпуха маньчжурская



Sorbaria sorbifolia
Рябинник рябинолистный



Swida alba
Свидина белая



Selaginella tamariscina
Плаунок тamarисковый



Taxus cuspidata
Тис остроконечный



Tilia amurensis
Липа амурская



Tilia mandshurica
Липа маньчжурская



Vincetoxicum acuminatum
Ластовень заостренный



Trommsdorfia ciliata
Троммдорфия реснитчатая



Truellum thunbergii
Колючестебельник Тунберга



Typha latifolia
Рогоз широколистный



Urtica angustifolia
Крапива узколистная



Vaccinium uliginosum
Голубика болотная, или гонобобель



Veronica longifolia
Вероника длиннолистная



Viburnum sargentii
Калина Саржента (плоды)



Viburnum sargentii
Калина Саржента (цветы)



Vicia amurensis
Горошек амурский



Viola acuminata
Фиалка приостренная



Viola collina
Фиалка холмовая



Viola mandshurica
Фиалка маньчжурская



Viola selkirkii
Фиалка Селькирка



Viscum coloratum
Омела окрашенная



Vitis amurensis
Виноград амурский



Woodsia ilvensis
Вудсия эльбская



Woodsia polystichoides
Вудсия многорядниковая



Agaricus placomyces



Agaricus xantholepis



Amanita caesarea



Amanita flavipes



Amanita virosa



Clitocybe gibba



Clitocybe hydrogramma



Crepidotus mollis



Cystodermella cinnabarina



Cytidia salicina



Fomitopsis pinicola



Fomitopsis rosea



Ganoderma carnosum



Gaslerina vittaeformis



Gyroporus punctatus



Hygrophorus russula



Hymenochaete intricata



Irpex lacteus



Lactarius grandisporus



Lactarius volemus



Lenzites betulina



Lycoperdon mammiforme



Marasmius scorodonius



Megacollybia marginata



Pholiota aurivella



Russula aurea



Russula brunneola



Russula cyanoxantha



Russula vesca



Schizophyllum commune



Stereum ostrea



Thelephora palmata



Trametes versicolor



Trametopsis cervina



Tylopilus alboater



Tylopilus rubrobrunneus



Ascocoryne sarcoides



Belonidium sulphureum



bisporella citrina



Chlorencoelia macrospora



Chlorencoelia torta



Chlorencoelia versiformis



Chlorociboria aeruginascens



Ciboria batschiana



Dendrodochium gracile



Dendrodochium toxicum




Flavoscypha cantharella




Flavoscypha phlebophora



Helvella crispa



Helvella cupuliformis



Helvella elastica



Helvella ephippium



Helvella lacunosa



Helwaya mucida



Humaria hemisphaerica



Hyalorbilia inflatula



Hymenoscyphus fructigenus




Hymenoscyphus imberbis



Hymenoscyphus pileatus




Hymenoscyphus caudatus



Hymenoscyphus fraxineus



Hymenoscyphus herbarum



Hymenoscyphus imberbis



Hymenoscyphus phyllogenus



Hymenoscyphus salicellus



Hymenoscyphus scutula



Hyphodiscus incrustatus



Lachnellula subtilissima



Leotia lubrica



Microstoma protractum



Mollisia cinerea



Nectria cinnabarina



Neobulgaria pura



Orbilia delicatula



Orbilia epipora (Nyl.) P. Karst




Orbilia luteorubella



Otidea alutacea



Otidea grandis



Otidea cochleata



Pachyella babingtonii



Pezicula rubi



Peziza arvernensis



Peziza badia




Pezizella vulgaris



Phaeohelotium epiphyllum



Phaeohelotium vernum




Phialina separabilis



Pyrenopeziza benesuada



Pyronema alborosella



Rodwayella citrinula



Sarcoscypha coccinea




Scutellinia crinita



Scutellinia heterosculpturata



Scutellinia parvispora



Scutellinia pennsylvanica



Scutellinia crinita



Scutellinia heterosculpturata



Scutellinia parvispora



Scutellinia pennsylvanica



Scutellinia scutellata



Scutellinia setosa



Scutellinia umbrorum




Stictis radiata



Tarzetta catinus



Tolyptocladium capitatum



Velutaria lignicola



Volutella ciliata



Wynnea macrospora



Candelaria concolor



Myelochroa aurulenta



Polyblastidium hypoleucum



Rinodina ascociscana



Schimatomma pericleum



Tephromela atra



Elaphe schrenckii
Амурские полозы на спаривании



Takydromus amurensis
Беременная самка амурской долгохвостки



Bufo gargarizans
Дальневосточная жаба



Bombina orientalis
Дальневосточная жерлянка



Rana dybowskii
Дальневосточная лягушка



Rana dybowskii
Дальневосточная лягушка



Elaphe schrenckii
Молодой амурский полоз
с ювенильной окраской



Salamandrella tridactyla
Приморский углозуб



Dryophytes japonicus
Самец дальневосточной квакши



Gloydius intermedius
Средний щитомордник



Elaphe dione
Узорчатый полоз



Gloydius ussuriensis
Уссурийский щитомордник




Agelasa nigriseps



Agelastica coerulea



Aspidimorpha difformis



Cassida amurensis



Cassida nebulosa



Chorthippus montanus



Chrysomela populi



Chorthippus hammarstroemi



Cryptocephalus regalis



Euchorthippus unicolor



Gampsocleis sedakovii



Gastrolina peltoides



Glyphobotrus maritimus



Gryllotalpa orientalis



Ruspolia dubia



Mecostethus parapleurus



Megaulacobothrus aethalinus



Nigrogryllus sibiricus



Oecantus longicauda



Oxya maritima



Paratlanticus ussuriensis



Phaedon cochlearia



Phaneroptera falcata



Plagiosterna aenea



Prumna ussuriensis



Schmidtiacris schmidti



Sphagniana ussuriana



Tetrix japonica



Tettigonia ussuriana



Zubovskya koeppeni

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

РАСТЕНИЯ

- Abies nephrolepis* 76, 135, 136, 141
Acalypha australis 92
Acanthopanax sessiliflorum 103
Acer barbinerve 101, 162
Acer ginnala 101
Acer mono 101, 136, 140
Acer tegmentosum 101, 140
Acer ukurunduense 101, 140
Acetosa pratensis 86
Achillea millefolium 114, 134
Achillea ptarmica 118
Achillea sibirica 118
Achnatherum extremiorientale 128
Aconitum arcuatum 78
Aconitum barbatum 78
Aconitum desoulavyi 78
Aconitum macrorhynchum 78
Aconitum sczukinii 78, 163
Aconitum stoloniferum 78
Aconitum volubile 78
Actaea acuminata 78, 163
Actaea erythrocarpa 79
Actinidia kolomikta 90, 135, 162
Adenocaulon adhaerescens 114
Adenophora latifolia 113
Adenophora pereskiifolia 113, 163
Adenophora verticillata 113, 163
Adiantum pedatum 71, 163
Adonis amurensis 79
Adoxa moschatellina 109, 163
Agastache rugosa 110
Agrimonia pilosa var. *viscidula* 95
Agrimonia viscidula 95
Agrimonia striata 95, 163
Agropyron repens 129
Agrostis clavata 128
Agrostis trinii 128
Aizopsis aizoon 94
Aizopsis middendorffiana 94
Aizopsis selskiana 94
Ajania pallasiana 114
Ajuga multiflora 110
Aleuritopteris argentea 71, 136
Alisma plantago-aquatica 120
Allium ledebourianum 121
Allium lineare 121
Allium maximowiczii 121
Allium monanthum 121
Allium sacculiferum 121
Allium senescens 121
Allium strictum 121
Alnus hirsuta 83, 141
Alopecurus aequalis 128
Alopecurus amurensis 128
Ambrosia artemisiifolia 114, 134
Ampelopsis heterophylla 106, 135, 162
Amphicarpaea japonica 98, 163
Anaphalis margaritacea 114
Androsace filiformis 92
Anemone baikalensis 79
Anemone dichotoma 79
Anemonidium dichotomum 79
Anemonoides amurensis 79, 163
Anemonoides extremiorientalis 79, 163
Anemonoides udensis 79, 163
Anemonoides umbrosa 79
Angelica anomala 103
Angelica cincta 103, 163
Angelica czernaevia 103
Angelica dahurica 103
Angelica laevigata 103
Angelica maximowiczii 104
Angelica viridiflora 104
Anthriscus nemorosa 103

- Anthriscus sylvestris* 103
Aquilegia oxysepala 79, 163
Arabis hirsuta 88
Arabis pendula 88
Arabis sagittata 88
Aralia elata 103, 137
Aralia mandshurica 103
Arctium lappa 114
Arisaema amurense 132, 163
Arsenjevia glabrata 79
Artemisia desertorum 114
Artemisia gmelinii 114
Artemisia integrifolia 114
Artemisia japonica 114
Artemisia keiskeana 115
Artemisia mandshurica 115
Artemisia sacrorum 114
Artemisia saitoana 115
Artemisia selengensis 115
Artemisia stolonifera 115, 136
Artemisia sylvatica 115, 164
Artemisia umbrosa 115, 134
Artemisia vulgaris 115
Arthraxon ciliaris subsp. *langsdorffii* 128
Arthraxon langsdorffii 128
Aruncus dioicus 95, 164
Aruncus silvester 95
Aruncus asiaticus 95
Arundinella anomala 128
Asparagus schoberioides 121, 164
Asperula odorata 106
Asplenium incisum 72, 136
Asplenium scolopendrium
subsp. *japonicum* 72
Asplenium tenuicaule 72, 136
Aster incisus 117
Aster maackii 115
Aster scaber 116
Aster tataricus 115
Astilbe chinensis 93
Astragalus uliginosus 98
Asyneuma japonicum 113, 164
Athyrium acrostichoides 75
Athyrium crenatum 74
Athyrium filix-femina 74
Athyrium monomachi 74
Athyrium rubripes 74
Athyrium sinense 74, 136, 164
Athyrium spinulosum 75
Atractylis ovata 115
Atractylodes ovata 115
Atragene ochotensis 79, 135, 136
Axyris amaranthoides 86
Barbarea orthoceras 88
Batrachium eradatum 79
Beckmannia eruciformis 129
Beckmannia syzigachne 129
Berberis amurensis 77, 162
Bergenia pacifica 93, 136
Betula costata 83, 138
Betula dahurica 83, 138
Betula ermanii 83
Betula lanata 83, 138
Betula mandshurica 83
Betula ovalifolia 83
Betula platyphylla 83, 136, 138
Bidens tripartita 115
Brassica juncea 88
Bupleurum longiradiatum 104
Cacalia aconitifolia 119
Cacalia auriculata 115, 164
Cacalia hastata 115, 136, 164
Calamagrostis angustifolia 129
Calamagrostis barbata 129
Calamagrostis brachytricha 129
Calamagrostis epigeios 129
Calamagrostis langsdorffii 129
Calamagrostis neglecta 129
Calamintha chinensis 110
Calla palustris 132

- Callitriche palustris* 112
Callitriche verna 112
Caltha membranacea 79
Caltha palustris 79
Calystegia inflata 109
Calystegia rosea 109
Campanula cephalotes 113
Campanula glomerata 113
Campanula punctata 113, 164
Camptosorus sibiricus 72
Capsella bursa-pastoris 88
Cardamine leucantha 88, 136, 164
Cardamine macrophylla 89
Cardamine prorepens 89
Cardamine regeliana 89
Carex appendiculata 125
Carex arnelii 125
Carex augustinowiczii 125
Carex bostrychostigma 125
Carex callitrichos 125
Carex campylorhina 125, 164
Carex canescens 125
Carex capituliformis 125
Carex cryptocarpa 125
Carex dispalata 125, 136
Carex disperma 125
Carex drymophila 125, 136
Carex egena 125
Carex falcata 126
Carex jankowskii 126
Carex laevisissima 126, 134
Carex lanceolata 126
Carex lancibracteata 126
Carex lasiocarpa 126
Carex latisquamea 126
Carex leiorhyncha 126
Carex limosa 126
Carex loliacea 126
Carex longirostrata 126
Carex maackii 126
Carex meyeriana 126
Carex nanella 126, 164
Carex pallida 126
Carex pediformis 126
Carex pilosa 126
Carex quadriflora 126
Carex remotiuscula 126
Carex reventa 127, 164
Carex sabyensis 127
Carex schmidtii 127
Carex siderosticta 127, 164
Carex sordida 127
Carex subebracteata 127
Carex tenuiflora 127
Carex uda 127
Carex ussuriensis 127, 164
Carex vesicata 127
Carex xiphium 127
Carpesium triste 116
Caulophyllum robustum 78, 164
Celastrus flagellaris 105, 135
Cephalanthera longibracteata 123, 136, 167
Cerastium holosteoides 84
Cerastium pauciflorum 84
Cerastium pilosum var. *amurense* 84
Cerastium vulgatum 84
Cerasus maximowiczii 96
Chamaedaphne calyculata 90
Chamaenerion angustifolium 100
Chamaepericlymenum canadense 102, 164
Cheilanthes argentea 71
Chelidonium asiaticum 81, 164
Chelidonium majus 81
Chenopodium album 86, 134
Chloranthus japonicus 77
Chosenia arbutifolia 89, 136, 140, 158
Chosenia macrolepis 89
Chrysanthemum pallasianum 114
Chrysocyathus amurensis 79
Chrysosplenium flagelliferum 93

- Chrysosplenium pilosum* 93
Chrysosplenium ramosum 93, 164
Chrysosplenium sibiricum 93
Chylocalyx perfoliatus 86
Cicuta virosa 104
Cimicifuga dahurica 80
Cimicifuga simplex 80
Cinna latifolia 129
Cinna pendula 129
Circaea alpine 100, 164
Circaea lutetiana 100, 164
Circaea lutetiana subsp. quadrisulcata 100
Cirsium arvense 116
Cirsium pendulum 116
Cirsium schantarense 116, 164
Cirsium setosum 116, 134
Cirsium vlassovianum 116
Clematis brevicaudata 80
Clematis fusca 80, 135, 164
Clematis mandshurica 80, 164
Clinopodium chinense 110
Clintonia udensis 122, 164
Codonopsis lanceolata 113, 164
Comarum palustre 95
Commelina communis 128
Coniogramme fraxinea 71
Coniogramme intermedia 71, 136, 164, 167
Conringia orientalis 89
Convallaria keiskei 122, 164
Convallaria majalis 122
Conyza canadensis 116, 134
Coptidipteris wilfordii 72, 136
Cornopteris crenulatoserrulata 74
Corydalis ambigua 81
Corydalis gigantea 81
Corydalis ochotensis 81
Corydalis remota 81
Corydalis repens 81
Corydalis speciosa 81
Corylus heterophylla 83
Corylus mandshurica 84, 162
Cotyledon malacophylla 94
Cotyledon spinosa 94
Crataegus maximowiczii 96, 162
Crepis tectorum 116
Cuscuta japonica 109
Cyclophorus lingua 72
Cynanchum acuminatifolium 107
Cyperus orthostachyus 127
Cyperus truncatus 127
Cypripedium calceolus 123, 136, 164, 167
Cypripedium macranthon 123, 136, 164, 167
Cypripedium ventricosum 123, 136, 167
Delphinium maackianum 80
Dennstaedtia hirsuta 72
Desmodium podocarpum
var. *mandshuricum* 99, 164
Dianthus chinensis 84
Diarrhena manshurica 130
Dictamnus dasycarpus 101, 164
Digitaria ischaemum 129, 134
Digitaria linearis 129
Dioscorea nipponica 123, 164
Dioscorea quinqueloba 123
Diplazium sibiricum 74, 164
Disporum smilacinum 122
Disporum viridescens 122
Doellingeria scabra 116, 164
Dontostemon dentatus 89
Dontostemon hispidus 89
Draba nemorosa 89
Drosera rotundifolia 95
Dryopteris amurensis 73
Dryopteris austriaca 73
Dryopteris buschiana 72
Dryopteris coreano-montana 73
Dryopteris crassirhizoma 72, 164
Dryopteris dilatata 73
Dryopteris expansa 73
Dryopteris felix-mas 73

- Dryopteris fragrans* 73
Dryopteris goeringiana 73
Dryopteris sichotensis 73
Dryopteris thelypteris 76
Dryopteris wladivostokensis 73
Echinochloa crusgalli 129, 134
Eleocharis palustris 127
Eleutherococcus senticosus 103, 162
Eleutherococcus sessiliflorus 103, 162
Elsholzia ciliata 110
Elymus sibiricus 129
Elytrigia repens 129, 134
Enemion raddeanum 80, 164
Epilobium palustre 100
Epipactis latifolia var. *papillosa* 124
Epipactis papillosa 124, 136, 164
Equisetum arvense 70
Equisetum fluviatile 70
Equisetum hyemale 70, 165
Equisetum limosum 70
Equisetum pratense 70
Equisetum sylvaticum 70
Eragrostis pilosa 130
Eranthis stellata 80
Erigeron acris var. *manshuricus* 116
Erigeron canadensis 116
Erigeron manshuricus 116
Eriophorum komarovii 127
Eriophorum russeolum 127
Eriophorum vaginatum 128
Euonymus maackii 105
Euonymus macroptera 105
Euonymus pauciflora 105, 162
Euonymus sacrosancta 105
Eupatorium kirilowii 116
Eupatorium lindleyanum 116
Euphorbia esula 92
Euphorbia lucorum 93
Euphorbia taquetii 93
Euphrasia maximowicziana 112
Falcata japonica 98
Festuca extremiorientalis 130
Festuca rubra 130
Filipendula glaberrima 96, 165
Filipendula glabra 96
Filipendula palmata 96, 136, 165
Fimbripetalum radians 84, 165
Fragaria orientalis 96, 165
Fraxinus mandshurica 107, 136, 144
Gagea terraccianoana 120
Galearis cyclochila 124, 136, 168
Galeopsis bifida 110
Galium boreale 106, 165
Galium davuricum 106, 136, 165
Galium kamtschaticum 106
Galium odoratum 106, 165
Galium paradoxum 106, 136, 167
Galium ruthenicum 106
Galium trifidum 106
Galium verum 106
Gentiana scabra 107
Gentiana triflora 107
Gentiana zollingeri 107
Geranium dahuricum 102
Geranium eriostemon 102
Geranium maximowiczii 102
Geranium sibiricum 102
Geranium wilfordii 102, 165
Geranium wlassovianum 102
Geum aleppicum 96
Glechoma hederacea 110
Glechoma longituba 110
Glyceria leptolepis 130
Glyceria triflora 130
Gnaphalium uliginosum 117
Grossularia burejensis 94
Gymnocarpium dryopteris 74
Gymnocarpium jessoense 74, 165
Gymnocarpium robertianum 74
Gypsophila pacifica 84

- Habenaria linearifolia* 124
Hemerocallis flava 121
Hemerocallis lilio-asphodelus 121
Hemerocallis middendorffii 121, 165
Hemerocallis minor 121
Heracleum barbatum 104
Heracleum dissectum 104
Hieracium umbellatum 117
Hieracium virosum 117
Hierochloë glabra 130
Huperzia serrata 69
Hylomecon japonica 82
Hylomecon vernalis 82, 165
Hylotelephium pallescens 94
Hylotelephium triphyllum 94
Hylotelephium viviparum 94
Hypericum ascyron 87
Hypericum attenuatum 87
Hypochoeris grandiflora 120
Hystrix komarovii 130
Impatiens furcillata 102
Impatiens noli-tangere 102, 165
Inula britannica 117
Inula salicina 117
Iris ensata 123, 136
Iris kaempferi 123
Iris laevigata 123, 136, 168
Iris setosa 123
Iris uniflora 123
Ixeridium gramineum 117
Jacobaea argunensis 117
Jacobaea cannabifolia 117
Jeffersonia dubia 78
Juglans mandshurica 84, 141
Juncus bufonius 124
Juncus decipiens 124
Juncus effusus var. *decipiens* 124
Juncus papillosus 124
Kalimeris incisa 117
Kitagawia terebinthacea 104
Krascheninnikowia sylvatica 85
Kummerowia stipulacea 98
Kummerowia striata 98
Lactuca denticulata 118
Lactuca raddeana 118
Lactuca squarrosa 118
Lactuca triangulata 118
Lamium barbatum 110, 165
Larix cajanderi 76, 135
Larix dahurica 76
Larix dahurica subsp. *cajanderi* 76
Larix gmelinii 76
Lathyrus alatus 99
Lathyrus davidii 98
Lathyrus humilis 99
Lathyrus komarovii 99
Lathyrus palustris var. *pilosus* 99
Lathyrus pilosus 99
Ledum hypoleucum 91
Ledum palustre 91
Leibnitzia anandria 117
Leonurus japonicus 111
Lepisorus ussuriensis 71, 136
Leptorumohra amurensis 73, 165
Lespedeza bicolor 99, 162
Libanotis seseloides 105
Ligularia fischeri 117, 165
Ligularia speciosa 117
Ligustrina amurensis 108, 143
Lilium avenaceum 120
Lilium buschianum 129
Lilium dauricum 121
Lilium distichum 120
Lilium pensylvanicum 121, 165
Linaria vulgaris 112
Linnaea borealis 108
Liparis japonica 124, 136, 165, 167
Lobelia sessilifolia 114
Lonicera chrysantha 108, 162
Lonicera edulis 108

- Lonicera maximowiczii* 108
Lophanthus rugosus 110
Lunathyrium pycnosorum 75, 165
Lupinaster pentaphyllus 99
Luzula multiflora 124
Luzula pallescens 125
Lychnis fulgens 84
Lycopodium annotinum 70
Lycopodium obscurum 70
Lycopodium serratum 69
Lycopus lucidus 111
Lycopus maackianus 111
Lycopus uniflorus 111
Lysimachia clethroides 92
Lysimachia davurica 92, 165
Lythrum salicaria 100
Maackia amurensis 99, 141
Maianthemum bifolium 122, 165
Maianthemum dilatatum 122, 165
Malus baccata 96
Malus mandshurica 96, 144
Malus sibirica 96
Matteuccia struthiopteris 73, 165
Melampyrum roseum 112
Melampyrum setaceum 112
Melica gmelini 130
Melica nutans 130, 165
Melica turczaninowiana 130
Menispermum dauricum 77, 165
Mentha canadensis 111
Menyanthes trifoliata 107
Microlepia hirsute 72
Microlepia wilfordii 72
Milium effusum 130
Miscanthus sacchariflorus 130
Mitella nuda 93, 165
Moehringia lateriflora 84
Monotropa hypopitys 107
Monotropastrum humile 107
Mosla dianthera 111
Mulgedium sibiricum 117
Nasturtium palustre 89
Naumburgia thyrsoiflora 92, 136
Neomolinia mandshurica 130, 165
Neoussuria firma 85
Nymphaea tetragona 77
Oenothera depressa 100
Omphalothrix longipes 112
Onoclea sensibilis 74, 165
Orchis cyclochila 124
Oreorchis patens 124, 136
Orostachys malacophylla 94
Orostachys spinosa 94
Orthilia secunda 91, 165
Osmorhiza amurensis 104
Osmorhiza aristata 104, 165
Osmunda cinnamomea 71
Osmundastrum asiaticum 71, 136, 165
Ostericum maximowiczii 104
Ostericum viridiflorum 104
Oxalis acetosella 102, 165
Oxycoccus palustris 91
Padus avium 96, 144
Padus maackii 96, 143
Padus maximowiczii 96, 144, 162
Padus rasemosa 96
Paeonia albiflora 87
Paeonia lactiflora 87, 136, 167
Paeonia obovata 87, 136, 167
Panax ginseng 103, 136
Panicum crus-galli 129
Papaver amurense 82
Paraixeris denticulata 118
Parathelypteris nipponica 75
Parietaria debilis var. *micrantha* 82
Parietaria micrantha 82
Paris verticillata 123
Parnassia palustris 95
Patrinia scabiosifolia 109
Pedicularis grandiflora 112

- Pedicularis resupinata* 112
Persicaria hydropiper 86
Persicaria lapathifolia 86
Persicaria longiseta 86
Petasites palmata 118
Petasites tatewakianus 118
Peucedanum terebinthaceum 104
Phalacrolooma annuum 118
Phalaroides arundinacea 131
Phegopteris austroussuriensis 74
Phegopteris connectilis 75
Phegopteris polypodioides 75
Phellodendron amurense 101, 137
Philadelphus tenuifolius 93, 162
Phleum pratense 131, 134
Phragmites australis 131, 136
Phragmites communis 131
Phragmites japonicus 131
Phryma asiatica 110
Phryma leptostachya 110
Phtheirospermum chinense 112
Phyllitis japonica 72, 136, 167
Picea ajanensis 76, 135, 136, 139
Picea koraiensis 76, 135, 139
Picea obovata 76, 135
Picea jezoensis 76, 139
Picris japonica 118
Pilea mongolica 82
Pilea pumila 82
Pinus koraiensis 76, 135, 136, 142
Plagiorhegma dubia 78
Plantago asiatica 113
Plantago major 113
Platanthera densa 124
Platanthera extremiorientalis 124
Platanthera metabifolia 124
Plectranthus excisus 111
Plectranthus glaucocalyx 111
Pleurospermum camtschaticum 104
Pleurospermum uralense 104
Poa angustifolia 131
Poa annua 131
Poa palustris 131
Poa pratensis 131
Poa skvortzovii 131
Podocarpium mandshuricum 99
Polemonium caeruleum 109
Polemonium chinense 109
Polemonium laxiflorum 109
Polygonatum humile 122
Polygonatum involucratum 122
Polygonatum odoratum 122
Polygonatum officinale 122
Polygonum aviculare 86
Polygonum hydropiper 86
Polygonum perfoliatum 86
Polygonum posumbu 86
Polygonum sagittatum 86
Polygonum thunbergii 87
Polygonum tomentosum 86
Polypodium sibiricum 71, 165
Polypodium vulgare 71
Polystichum braunii 73
Polystichum craspedosorum 73
Populus koreana 89, 143
Populus maximowiczii 89, 143, 158
Populus tremula 90, 141
Potamogeton perfoliatus 120
Potentilla argentea 96
Potentilla centigrana 97
Potentilla fragarioides 97
Potentilla freyniana 97
Potentilla norvegica 97
Protowoodsia manchuriensis 75
Prunella vulgaris 111
Psammophiliella muralis 85
Pseudocystopteris spinulosa 75
Pseudostellaria sylvatica 85, 165
Ptarmica alpina 118
Ptarmica ptarmicoides 118

- Pteridium aquilinum* 72
Pterocypsela indica 118
Pterocypsela raddeana 118, 165
Pterocypsela triangulata 118
Pyrola japonica 91
Pyrola minor 91
Pyrola renifolia 91
Pyrola rotundifolia 91, 165
Pyrola subaphylla 91
Pyrrosia petiolosa 72, 136
Quercus mongolica 83, 136, 138
Rabdosia excisa 111, 136, 165
Rabdosia glaucocalyx 111
Ranunculus chinensis 80
Ranunculus japonicus 80
Ranunculus repens 80, 165
Rhamnus davurica 106, 139, 162
Rhizomatopteris sudetica 75
Rhodococcum vitis-idaea 91
Rhododendron dauricum
 subsp. *mucronulatum* 91
Rhododendron mucronulatum 91
Rhododendron mucronulatum
 subsp. *sichotense* 91
Rhododendron sichotense 91
Ribes latifolium 94
Ribes mandshuricum 94, 162
Ribes maximoviczianum 95, 162
Ribes palczewskii 95
Ribes pallidiflorum 95, 163
Ribes triste 95
Rorippa palustris 89
Rosa acicularis 97
Rosa amblyotis 97
Rosa davurica 97
Rubia chinensis 107
Rubia cordifolia 107, 166
Rubus crataegifolius 97, 163
Rubus matsumuranus 97
Rubus melanolasius 97
Rubus sachalinensis var. *komarovii* B97
Rubus komarovii 97
Rumex acetosa 86
Rumex crispus 86
Rumex patientia 86
Salix brachypoda 90
Salix caprea 90
Salix gracilistyla 90
Salix myrtilloides 90
Salix pierotii 90
Salix repens 90
Salix rorida 90
Salix schwerinii 90
Salix taraikensis 90
Sambucus racemosa 108, 163
Sambucus sibirica 108
Sanguisorba glandulosa 97
Sanguisorba officinalis 97
Sanguisorba parviflora 97
Sanguisorba tenuifolia 97
Sanicula rubriflora 104, 166
Saussurea amurensis 118
Saussurea manshurica 118
Saussurea neopulchella 119, 166
Saussurea neoserrata 118
Saussurea serrata 118
Saussurea ussuriensis 119
Schisandra chinensis 77, 135, 136, 163
Schizachne callosa 131
Schizopepon bryoniifolius 88, 166
Schoenoplectus nipponicus 128
Schoenoplectus tabernaemontani 128
Scirpus orientalis 128
Scirpus radicans 128
Scirpus tabernaemontani 128
Scutellaria dependens 111
Scutellaria regeliana 111
Scutellaria ussuriensis 111, 166
Sedum aizoon 94, 166
Sedum middendorffianum 94

- Sedum selskianum* 94
Sedum telephium 94
Selaginella borealis 70
Selaginella involvens 70
Selaginella rupestris 70
Selaginella tamariscina 70
Senecio argunensis 117
Senecio palmatus 117
Serratula coronata 119
Serratula manshurica 119, 166
Seseli seseloides 105
Setaria glauca 131
Setaria pumila 131, 134
Setaria viridis 131
Sigesbeckia orientalis 119
Silene firma 85
Silene foliosa 85
Silene repens 85
Siphonostegia chinensis 112
Sium cicutifolium 105
Sium suave 105
Smilacina dahurica 122
Smilacina hirta 122, 166
Solanum nigrum 112
Sonchus arvensis 119, 134
Sorbaria sorbifolia 97, 163
Sorbus amurensis 98
Sorbus pochuanensis 98, 142
Spergula arvensis 85
Spiraea betulifolia 98, 163
Spiraea media 98
Spiraea salicifolia 98
Spodiopogon sibiricus 131
Stachys aspera 111
Stachys baicalensis 111
Stellaria bungeana 85, 166
Stellaria filicaulis 85
Stellaria graminea 85
Stellaria jaluana 85
Stellaria longifolia 85, 166
Stellaria media 85
Stellaria radicans 84, 166
Stipa effusa 128
Swida alba 102, 163
Symplocarpus foetidus 132
Symplocarpus renifolius 132
Syneleisis aconitifolia 119, 166
Synurus atriplicifolius 119
Synurus deltooides 119, 166
Syringa amurensis 108
Tanacetum boreale 119
Taraxacum brassicifolium 119
Taraxacum mongolicum 119
Taraxacum officinale 119
Taxus cuspidata 77, 135, 143, 167
Tephrosia kirilowii 119
Thalictrum contortum 81, 166
Thalictrum filamentosum 81, 166
Thalictrum minus 81
Thalictrum simplex 81
Thalictrum ussuriense 81
Thelypteris thelypteroides 76
Thesium chinense 105
Tilia amurensis 92, 140
Tilia mandshurica 92, 140
Tilia taquetii 92, 140
Trapa pseudoincisa 101, 136
Triadenum japonicum 87
Tridentaria europaea 92
Trifolium hybridum 99
Trifolium lupinaster 99
Trifolium pratense 99
Trifolium repens 99, 134
Trigonotis radicans 109
Trisetum sibiricum 131
Trollius ledebourii 81
Trommsdorffia ciliata 120
Truellum sagittatum 86

- Truellum thunbergii* 87, 166
Turritis glabra 89
Typha latifolia 132
Ulmus heterophylla 82
Ulmus japonica 82, 136, 139
Ulmus laciniata 82, 139
Urtica angustifolia 82, 166
Urtica laetevirens 83, 166
Vaccinium uliginosum 91
Vaccinium vitis-idaea 91
Valeriana alternifolia 109
Valeriana fauriei 109, 166
Veratrum album var. *dauricum* 120
Veratrum dahuricum 120
Veratrum dolichopetalum 120
Veratrum maackii 120
Veratrum nigrum 120
Veratrum oxysepalum 120, 166
Veratrum ussuriense 120
Veronica daurica 112
Veronica longifolia 113
Veronica serpyllifolia 113
Veronica sibirica 113
Veronicastrum sibiricum 113, 166
Viburnum pubinerve 108
Viburnum sargentii 108, 163
Vicia amoena 99
Vicia amurensis 100, 166
Vicia cracca 100
Vicia pseudorobus 100
Vicia ramuliflora 100
Vicia unijuga 100
Vicia ussuriensis 100
Vicia venosa 100
Vincetoxicum acuminatum 107, 166
Viola acuminata 87
Viola acuminata var. *austro-ussuriensis* 87
Viola amurica 87
Viola brachysepala 87
Viola collina 87
Viola epipsiloides 87
Viola mandshurica 88
Viola patrinii 88
Viola sacchalinesis 88
Viola selkirkii 88, 166
Viola verecunda 88
Viscum coloratum 105
Vitis amurensis 106, 135, 163
Waldsteinia maximowicziana 98
Waldsteinia ternata 98, 166
Woodsia ilvensis 75
Woodsia polystichoides 75
Woodsia subcordata 75

ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ

- Absidia caerulea* 179
Absidia corymbifera 179
Absidia glauca 179
Absidia shinosa 179
Acremonium butyri 181
Acremonium charticola 181
Acremonium implicatum 181
Acremonium roseogriseum 181
Acremonium rutilum 181
Acremonium strictum 181
Acrostalagmus luteoalbus 182
Actinomucor elegans 179
Agaricus impudicus 197
Agaricus placomyces 177, 197
Agaricus porphyizon 197
Agaricus xantholepis 197
Agrocybe pediades 177, 198
Aleurodiscus disciformis 175, 207
Alternaria tenuissima 182
Amanita flavipes 197

- Amanita pantherina* 173, 197
Amanita phalloides 197
Amanita vaginata 197
Amanita virosa 173, 197
Amanita volvata 197
Anaptychia isidiata 211
Anaptychia palmulata 211
Antrodia crassa 201
Aphanocladium album 182
Arachnopeziza cornuta 188
Arctoparmelia centrifuga 211
Arthrimum phaeospermum 182
Arthrobotrys arthrobotryoides 182
Ascocoryne sarcoides 188
Aspergillus flavus 182
Aspergillus fumigatus 182
Aspergillus niger 182
Aspergillus ochraceus 182
Aspergillus versicolor 182
Aureobasidium pullulans 182
Auricularia auricula-judae 209
Auricularia nigricans 209
Baeospora myriadophylla 203
Beauveria bassiana 182
Belonidium sulphureum 191
Bisporella subpallida 188
Bisporella citrina 188
Bjerkandera adusta 201
Blakeslea trispora 180
Boletus bicolor 207
Boletus chrysenteron 207
Boletus edulis 207
Boothiella tetraspora 195
Botrytis pyramidalis 182
Byssochlamys fulva 186
Byssomerulius corium 201
Calocybe persicolor 204
Caloplaca cerina 211
Caloplaca kiewkaensis 211
Caloplaca oxneri 211
Caloplaca ussuriensis 211
Candelaria concolor 211
Cantharellus cibarius 173, 199
Cetrelia braunsiana 212
Cetrelia cetrarioides 212
Cetrelia pseudolivatorum 212
Chaetomium aureum 196
Chaetomium circinatum 196
Chaetomium elatum 196
Chaetomium globosum 196
Chaetomium murorum 196
Chaetomium spirale 196
Chaetomium subterraneum 196
Chalciporus piperatus 207
Chlorencoelia macrospora 190
Chlorencoelia torta 191
Chlorencoelia versiformis 191
Chlorociboria aeruginascens 188
Chrysonilia sitophila 182
Ciboria batschiana 174, 191
Circinella muscae 179
Cladonia furcata 212
Cladosporium cladosporioides 182
Clavidisculum karstenii 191
Clitocybe gibba 202
Clitocybe hydrogramma 202
Clitopilus prunulus 198
Clonostachys rosea f. *catenulata* 183
Clonostachys rosea f. *rosea* 183
Coltricia perennis 173, 200
Conocybe apala 198
Coprinellus disseminatus 198
Coprinus micaceus 198
Coprobria granulata 175
Craterellus cornucopioides 173, 199
Crepidotus casparyi 200
Crepidotus crocophyllus 200
Crepidotus mollis 200
Crepidotus subverrucisporus 200
Crocicreas alpinum 189

- Crocicreas melanosporum* 189
Cunninghamella echinulata 180
Cuphophyllus pratensis 198
Cylindrocarpon destructans 183
Cystodermella cinnabarina 197
Cytidia salicina 199
Daedalea quercina 201
Daedaleopsis sinensis 170, 202
Dendriscosticta wrightii 212
Dentocorticium pilatii 170, 202
Dermea cerasi 174
Descolea flavoannulata 198
Echinoderma asperum 197
Elmerina hispida 209
Emericella nidulans 187
Emericellopsis minima 196
Emericellopsis terricola 196
Entoloma byssisedum 198
Entoloma rhodopolium 198
Eupenicillium javanicum 187
Eurotium amstelodami 187
Eurotium herbariorum 187
Evernia mesomorpha 212
Fimaria cervaria 176
Flammulaster erinaceellus 200
Flavoparmelia caperata 212
Flavoscypha cantharella 193
Flavoscypha phlebophora 193
Fomitopsis pinicola 175, 201
Foveostroma drupacearum 174
Fusarium culmorum 183
Fuscopannaria leucophaea 212
Galerina vittiformis 199
Ganoderma applanatum 175, 201
Ganoderma carnosum 175, 201
Geomyces pannorum 183
Geopyxis carbonaria 176
Gibellulopsis nigrescens 183
Gliocephalotrichum simplex 183
Gliocladium virens 183
Gliomastix guttuliformis 183
Gliomastix murorum 183
Gongronella butleri 179
Graphis scripta 213
Gymnoascus reesii 187
Gymnopilus sapineus 200
Gymnopus confluens 177, 205
Gymnopus dryophilus 205
Gyroporus castaneus 208
Gyroporus punctatus 208
Helicostylum elegans 180
Helvella corium 192
Helvella crispa 172, 192
Helvella cupuliformis 193
Helvella elastica 193
Helvella ephippium 193
Helvella lacunosa 193
Hericium erinaceus 175, 205
Heterobasidium orientale 170, 205
Heterodermia diademata 213
Heterodermia speciosa 213
Holwaya mucida 192
Humaria hemisphaerica 193
Humicola grisea 183
Hyalorbilia inflatula 192
Hydnum repandum 172, 199
Hydropus floccipes 203
Hydropus marginellus 203
Hygrocybe cantharellus 177, 198
Hygrocybe conica 198
Hygrocybe flavescens 198
Hygrophorus russula 198
Hymenochaete intricata 201
Hymenoscyphus albidus 189
Hymenoscyphus caudatus 189
Hymenoscyphus epiphyllus 189
Hymenoscyphus fraxineus 173, 189
Hymenoscyphus fructigenus 174, 189
Hymenoscyphus herbarum 189
Hymenoscyphus humuli 189

- Hymenoscyphus imberbis* 189
Hymenoscyphus laetus 189
Hymenoscyphus phyllogenus 190
Hymenoscyphus phyllophilus 190
Hymenoscyphus pileatus 190
Hymenoscyphus repandus 190
Hymenoscyphus robustior 190
Hymenoscyphus salicellus 174, 190
Hymenoscyphus scutula 190
Hyphodiscus incrustatus 191
Hypholoma fasciculare 199
Hypogymnia metaphysodes 213
Hypogymnia physodes 213
Hypogymnia vittata 213
Hypsizigus ulmarius 204
Inocybe acuta 200
Inocybe asterospora 200
Inocybe geophylla 200
Inocybe griseolilacina 200
Inocybe rimosa 200
Inocybe splendens 200
Irpex lacteus 201
Laccaria amethystina 205
Laccaria laccata 204
Lachnellula subtilissima 191
Lactarius azonites 173, 205
Lactarius chrysorrheus 205
Lactarius glyciosmus 205
Lactarius grandisporus 205
Lactarius piperatus 205
Lactarius quietus 205
Lactarius trivialis 205
Lactarius vellereus 205
Lactarius vinaceorufescens 205
Lactarius violascens 206
Lactarius volemus 173, 206
Lamprospora schroeteri 176
Laurilia sulcata 205
Lecanicillium lecanii 183
Lecanora chlarotera 213
Lecanora pachycheila 213
Lecanora symmicta 213
Leccinum extremiorientale 207
Lentaria byssiseda 200
Lentinellus cochleatus 208
Lentinellus ursinus 208
Lentinus martianoffianus 208
Lenzites betulinus 170, 202
Leotia lubrica 191
Lepiota subincarnata 197
Lepiota tomentella 197
Lepra dactylina 214
Lepra multipuncta 214
Leptogium burnetiae 214
Leucoagaricus serenus 197
Leucocoprinus cygneus 197
Leucocybe candicans 202
Lobaria isidiophora 214
Lobaria orientalis 214
Lobaria pulmonaria 214
Lobaria quercizans 214
Lobaria retigera 214
Lobaria scrobiculata 214
Lobaria tuberculata 214
Lycoperdon mammiforme 197
Marasmiellus candidus 203
Marasmius capillipes 203
Marasmius insolitus 203
Marasmius macrocystidiosus 204
Marasmius scorodoni 203
Marasmius siccus 204
Marasmius wynneae 204
Marasmius minutus 203
Megacollybia marginata 204
Megacollybia platyphylla 204
Melanelixia huei 214
Melanoleuca grammopodia 203
Melanoleuca melaleuca 203
Melanospora asymmetrica 195
Menegazzia terebrata 215

- Merulius tremellosus* 201
Microascus singularis 195
Microstoma protractum 195
Mollisia cinerea 188
Mortierella alpina 181
Mortierella lignicola 181
Mortierella minutissima 181
Mortierella polycephala 181
Mortierella stylospora 181
Mucidula brunneomarginata 204
Mucidula mucida 204
Mucor circinelloides f. *circinelloides* 179
Mucor genevensis 179
Mucor hiemalis f. *hiemalis* 179
Mucor laussanensis 179
Mucor piriformis 179
Mucor plumbeus 179
Mucor racemosus f. *racemosus* 180
Mucor zonatus 180
Mycena haematopus 204
Mycena laevigata 204
Mycena niveipes 204
Mycena olivaceoalcalina 204
Mycena pelianthina 204
Myelochroa aurulenta 215
Myelochroa subaurulenta 215
Myrothecium roridum 184
Myrothecium verrucaria 184
Nectria cinnabarina 195
Neobulgaria pura 191
Neosartorya fischeri 187
Nipponoparmelia pseudolaevior 215
Normandina pulchella 214
Oidiodendron echinulatum 184
Oidiodendron flavum 184
Ompalina discorosea 203
Omphalina umbellifera 203
Orbilina delicatula 192
Orbilina epipora 192
Orbilina luteorubella 192
Otidea alutacea 193
Otidea cochleata 193
Otidea grandis 193
Pachyella babingtonii 193
Pachyella celtica 193
Paecilium lilacinum 184
Paecilomyces carneus 184
Paecilomyces marquandii 184
Panaeolina foenicisii 198
Panellus patellaris 203
Panellus stypticus 203
Parmelia saxatilis 215
Parmelia squarrosa 215
Parmotrema perlatum 215
Parmotrema tinctorum 216
Paxillus involutus 208
Peltigera hymenina 216
Penicillium aculeatum 184
Penicillium aurantiogriseum 184
Penicillium brevicompactum 184
Penicillium chrysogenum 184
Penicillium citrinum 184
Penicillium commune 184
Penicillium corylophilum 185
Penicillium decumbens 185
Penicillium diversum 185
Penicillium expansum 185
Penicillium funiculosum 185
Penicillium glabrum 185
Penicillium janczewskii 185
Penicillium lanosum 185
Penicillium palitans 185
Penicillium purpurogenum 185
Penicillium roseopurpureum 185
Penicillium sclerotiorum 185
Penicillium simplicissimum 185
Penicillium solitum 185
Penicillium spinulosum 185
Penicillium thomii 186
Penicillium vulpinum 186

- Penicillium waksmanii* 186
Pertusaria pertusa 216
Pezicula rubi 188
Peziza ampliata 193
Peziza arvernensis 193
Peziza badia 172, 193
Peziza furfuracea 176
Peziza natrophila 176
Peziza queletii 193
Peziza repanda 175
Peziza verrucosa 176
Peziza violacea 176
Pezizella vulgaris 191
Phaeohelotium epiphyllum 190
Phaeohelotium vernum 190
Phaeophyscia hirtuosa 216
Phaeophyscia hispidula 216
Phaeophyscia pusilloides 216
Phaeophyscia rubropulchra 216
Phaeophyscia squarrosa 216
Phellinus yamanoi 175, 201
Phialina separabilis 191
Pholiota aurivella 199
Pholiota flammans 199
Pholiota polychroa 199
Phoma humicola 186
Physconia detersa 216
Physconia hokkaidensis 216
Physconia kurokawae 216
Physconia subpulverulenta 216
Picipes badius 170
Picipes badius 202
Plectania melastoma 174, 195
Pleuroflammula chocoruensis 199
Pleurotus citrinopileatus 208
Pluteus cervinus 198
Pluteus leoninus 199
Pluteus umbrosus 199
Polyblastidium hypoleucum 216
Polyblastidium microphyllum 217
Polyporus melanopus 202
Porpidia cf. *albocaerulescens* 217
Preussia fleischhაკii 196
Psathyrella candolleana 198
Pseudeurotium zonatum 187
Pseudocyphellaria crocata 217
Pseudogymnoascus roseus 187
Pseudohydnum gelatinosum 209
Pulveroboletus ravenelii 207
Pulvinula cinnabarina 176
Pyrenopeziza benesuada 188
Pyronema alborosella 193
Pyronema domesticum 175
Pyronema omphalodes 176
Pyrrhoderma scaurum 201
Pyxine sorediata 217
Ramalina roesleri 217
Ramaria araiospora 173, 200
Rheubarbariboletus armeniacus 207
Rhizopus stolonifer 180
Rhodofomes cajanderi 170, 201
Rhodofomes roseus 201
Rhodotarzetta rosea 176
Rickenella fibula 203
Rinodina ascociscana 217
Rinodina chrysiidiata 217
Rinodina subalbida 217
Rinodina subminuta 218
Rinodina subpariata 217
Rinodina xanthophaea 218
Ripartites tricholoma 203
Rodwayella citrinula 191
Russula albonigra 206
Russula alutacea 206
Russula aurea 206
Russula brunneola 206
Russula cyanoxantha 206
Russula decipiens 206

- Russula emetica* 206
Russula foetens 206
Russula fragilis 206
Russula granulata 206
Russula grata 206
Russula lactea 206
Russula lilacea 206
Russula mariae 206
Russula pectinatoides 206
Russula pseudodelica 206
Russula queletii 206
Russula versicolor 207
Russula vesca 207
Russula virescens 207
Russula xerampelina 207
Sarcoscypha coccinea 195
Schismatomma pericleum 218
Schizophyllum commune 199
Scopulariopsis brumptii 186
Scutellinia crinita 194
Scutellinia heterosculpturata 194
Scutellinia parvispora 194
Scutellinia pennsylvanica 194
Scutellinia scutellata 174, 194
Scutellinia setosa 194
Scutellinia umbrorum 194
Skeletocutis nivea 202
Sordaria fimicola 195
Sparassis crispa 175
Sparassis latifolia 175, 202
Sphaerosporella hinnulea 175
Spooneromyces velenovskyi 194
Stachybotrys chartarum 186
Stereum gausapatum 207
Stereum ostrea 170, 207
Stictis radiata 188
Strobilomyces strobilaceus 207
Stropharia coronilla 199
Suillus placidus 208
Suillus spraguei 173, 208
Talaromyces flavus 187
Talaromyces luteus 187
Talaromyces stipitatus 187
Talaromyces trachyspermus 187
Tapesia culcitella 192
Tapesia lividofusca 192
Tarzetta catinus 194
Tephromela atra 218
Thelephora palmata 173, 208
Tolypocladium capitatum 195
Tolypocladium niveum 186
Trametes conchifer 202
Trametes versicolor 170, 202
Trametopsis cervina 202
Tremella fuciformis 209
Trichaptum biforme 202
Tricharina gilva 175
Trichocladium asperum 186
Trichoderma aureoviride 186
Trichoderma koningii 186
Trichoderma viride 186
Tricholoma album 203
Tricholomopsis decora 203
Tricholomopsis rutilans 203
Trichophaea hybrida 195
Trichosphaeria pilosa 196
Tylopilus rubrobrunneus 173
Tylopilus alboater 208
Tylopilus rubrobrunneus 208
Umbelopsis isabellina 180
Umbelopsis ramanniana 180
Umbelopsis vinacea 180
Varicellaria velata 218
Velutaria lignicola 191
Wynnea macrospora 195
Xerocomellus chrysenteron 208
Xeromphalina campanella 204
Zygorhynchus japonicas 180
Zygorhynchus moelleri 180

ЦИАНОБАКТЕРИИ

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Geitlerinema amphibium</i> 219 | <i>Phormidium favosum</i> 220 |
| <i>Homoeothrix janthina</i> 219 | <i>Phormidium limosum</i> 220 |
| <i>Leptolyngbya mucicola</i> 219 | <i>Phormidium retzii</i> 220 |
| <i>Phormidium autumnale</i> 220 | <i>Phormidium terebriforme</i> 220 |
| <i>Phormidium corium</i> 220 | <i>Scytonema mirabile</i> 220 |

ВОДОРΟΣЛИ

- | | |
|---|---|
| <i>Achnanthidium minutissimum</i> 220 | <i>Didymosphenia geminata</i> 221 |
| <i>Adlafia minuscula</i> 220 | <i>Dinobryon sertularia</i> 228 |
| <i>Amphora ovalis</i> 220 | <i>Diploneis smithii</i> var. <i>pumila</i> 221 |
| <i>Amphora pediculus</i> 220 | <i>Draparnaldia plumosa</i> 228 |
| <i>Audouinella chalybea</i> 229 | <i>Encyonema minutum</i> 221 |
| <i>Aulacoseira italica</i> 220 | <i>Encyonema perpusillum</i> 221 |
| <i>Brebissonia boeckii</i> 220 | <i>Encyonema silesiacum</i> 222 |
| <i>Caloneis silicula</i> 220 | <i>Encyonopsis cesatii</i> 222 |
| <i>Chaetophora elegans</i> 228 | <i>Epipyxis utriculus</i> 228 |
| <i>Closterium acerosum</i> 228 | <i>Eunotia bidens</i> 222 |
| <i>Closterium dianaе</i> 228 | <i>Eunotia bilunaris</i> 222 |
| <i>Closterium parvulum</i> 228 | <i>Eunotia diodon</i> 222 |
| <i>Closterium tumidum</i> 228 | <i>Eunotia flexuosa</i> 222 |
| <i>Cocconeis placentula</i> 220 | <i>Eunotia glacialis</i> 222 |
| <i>Cosmarium formosulum</i> 228 | <i>Eunotia incisa</i> 222 |
| <i>Cosmarium punctulatum</i> 228 | <i>Eunotia minor</i> 222 |
| <i>Cosmoastrum punctulatum</i> 228 | <i>Eunotia muscicola</i> var. <i>tridentula</i> 222 |
| <i>Craticula cuspidata</i> 220 | <i>Eunotia pectinalis</i> 222 |
| <i>Cryptomonas ovata</i> 228 | <i>Eunotia praerupta</i> 222 |
| <i>Cyclotella meneghiniana</i> 220 | <i>Fragilaria capucina</i> var. <i>capucina</i> 222 |
| <i>Cymbella cymbiformis</i> 220 | <i>Fragilaria capucina</i> var. <i>mesolepta</i> 222 |
| <i>Cymbella neocistula</i> 221 | <i>Fragilaria capucina</i> var. <i>rumpens</i> 222 |
| <i>Cymbella tumida</i> 221 | <i>Fragilaria capucina</i> var. <i>vaucheriae</i> 222 |
| <i>Cymbella tumida</i> var. <i>borealis</i> 221 | <i>Fragilaria crotonensis</i> 222 |
| <i>Cymbella turgidula</i> 221 | <i>Fragilariforma bicapitata</i> 222 |
| <i>Cymbopleura cuspidata</i> 221 | <i>Frustulia amphipleuroides</i> 222 |
| <i>Cymbopleura naviculiformis</i> 221 | <i>Frustulia rhomboides</i> 222 |
| <i>Denticula tenuis</i> 221 | <i>Frustulia vulgaris</i> 223 |
| <i>Diatoma hiemalis</i> 221 | <i>Gomphoneis olivaceum</i> 223 |
| <i>Diatoma mesodon</i> 221 | <i>Gomphoneis quadripunctatum</i> 223 |
| <i>Diatoma tenue</i> 221 | <i>Gomphonema acuminatum</i> 223 |

- Gomphonema affine* 223
Gomphonema angustatum
 var. *angustatum* 223
Gomphonema angustatum var. *linearis* 223
Gomphonema angustum 223
Gomphonema gracile 223
Gomphonema montanum var. *montanum* 223
Gomphonema montanum var. *suecicum* 223
Gomphonema parvulum 223
Gomphonema productum 223
Gomphonema truncatum 223
Gomphonema ventricosum 223
Gomphonema vibrio var. *pumilum* 224
Gyrosigma acuminatum 224
Hannaea arcus var. *amphioxys* 224
Hannaea arcus var. *arcus* 224
Hannaea arcus var. *rectus* 224
Hantzschia amphioxys 224
Hippodonta capitata 224
Hydrurus foetidus 228
Karayevia laterostrata 224
Klebsormidium rivulare 228
Koliella tatrae 228
Luticola cohnii 224
Luticola mutica 224
Melosira varians 224
Meridion circulare 224
Meridion circulare var. *constrictum* 224
Microspora pachyderma 228
Navicula avenacea 224
Navicula cryptocephala 224
Navicula gregaria 225
Navicula integra 225
Navicula menisculus 225
Navicula radiosa 225
Navicula rhynchocephala 225
Navicula slesvicensis 225
Navicula viridula 225
Neidium affine var. *affine* 225
Neidium affine var. *ceyloanicum* 225
Neidium dubium 225
Neidium iridis var. *diminutum* 225
Neidium iridis var. *iridis* 225
Nitzschia acicularis 225
Nitzschia dissipata 225
Nitzschia frustulum 225
Nitzschia linearis 225
Nitzschia palea 225
Nitzschia paleacea 226
Ophiocytium parvulum 228
Phacus caudatus 229
Pinnularia grunowii 226
Pinnularia mesogongyla 226
Pinnularia microstauron 226
Pinnularia rhombarea
 var. *biundulata* 226
Pinnularia subgibba 226
Pinnularia sudetica 226
Pinnularia viridis 226
Placoneis elginensis 226
Placoneis gastrum 226
Planothidium haynaldii 226
Planothidium lanceolatum
 f. *lanceolatum* 226
Planothidium lanceolatum
 f. *ventricosa* 226
Psammothidium bioretii 226
Reimeria sinuata 226
Rhabdomonas costata 229
Rhoicosphenia abbreviata 226
Rossithidium linearis 226
Scenedesmus acutus 229
Scenedesmus apiculatus 229
Sellaphora laevissima 226
Stauroneis anceps 227
Stauroneis phoenicenteron 227
Staurosira construens f. *construens* 227
Staurosira construens f. *venter* 227
Staurosirella leptostauron 227
Staurosirella pinnata 227

Stigeoclonium subsecundum 229
Stigeoclonium thermale 229
Surirella angusta 227
Surirella biseriata 227
Surirella brebissonii var. *kuetzingii* 227
Surirella crumena 227
Surirella minuta 227
Surirella pantocsekii 227
Surirella robusta 227
Surirella splendida 227
Surirella tenera 227
Tabellaria fenestrata 227

Tabellaria flocculosa 227
Trachelomonas intermedia 229
Tribonema aequale 228
Tribonema viride 228
Tribonema vulgare 228
Ulnaria contracta 227
Ulnaria inaequalis 227
Ulnaria ulna 227
Ulothrix tenuissima 229
Ulothrix zonata 229
Vacuolaria virescens 229

ГЕРПЕТОФАУНА

Bombina orientalis 232
Bufo gargarizans 233
Dryophytes japonicus 235
Elaphe dione 240
Elaphe schrenckii 241
Gloydus intermedius 244
Gloydus ussuriensis 243
Hebius vibakari 245
Oocatochus rufodorsatus 245

Pelophylax nigromaculatus 239
Rana amurensis 239
Rana dybowskii 237
Rhabdophis lateralis 245
Salamandrella tridactyla 230
Salamandrella keyserlingii 230
Takydromus amurensis 239
Takydromus wolteri 245

НАСЕКОМЫЕ

Agelasa nigriceps 251
Agelastica coerulea 252
Arcyptera orientalis 262
Aspidimorpha difformis 254
Atlanticus (Atlanticus) brunneri 256
Atrachya menetriesi 252
Bromius obscurus 248
Bruchidius lautus 255
Cassida amurensis 255
Cassida nebulosa 255
Cassida piperata 255
Celes skalozubovi 265
Chaetocnema concinna 253
Chaetocnema concinnicollis 253

Chizuella bonneti 257
Chorthippus caliginosus 262
Chorthippus hammarstroemi 262
Chorthippus montanus 263
Chrysochraon dispar 263
Chrysolina aurichalcea 248
Chrysolina polita adamsi 249
Chrysolina virgata 249
Chrysomela cuprea 249
Chrysomela lapponica 249
Chrysomela populi 249
Colasposoma daurica 248
Conocephalus (Amurocephalus) chinensis 258

- Conocephalus (Anisoptera) fuscus* 258
Crepidodera obscuripes 253
Crepidodera picipes 253
Cryptocephalus gussakovskii 247
Cryptocephalus koltzei 247
Cryptocephalus regalis 247
Cryptocephalus splendens 248
Cryptocephalus tetrathyrus 248
Dianemobius fascipes 259
Donacia gracilipes 247
Entomoscelis orientalis 249
Epacromius pulverulentus 265
Euchorthippus unicolor 263
Euthystira brachyptera 263
Galerucella flavescens 252
Galerucella grisescens 252
Galerucella macullicollis 252
Gampsocleis ussuriensis 257
Gastrolina peltoidea 250
Gastrolina thoracica 249
Gastrophysa atrocyanea 250
Glyptobothrus maritimus 263
Gomphocerus kudia 264
Gonioctena decemnotata 250
Gonioctena fulva 250
Gonioctena gracilicornis 250
Gonioctena sibirica 250
Gonioctena viminalis rufa 250
Gryllotalpa orientalis 260
Hemipyxis plageoderoides 253
Lochmaea capraea 252
Luperomorpha funesta 253
Mecostethus parapleurus 265
Megaulacobothrus aethalinus 264
Mongolotettix japonicus 264
Neocrepidodera obscuritarsis 254
Oecanthus longicauda 259
Oedaleus infernalis 265
Ognevia longipennis 261
Oulema pygmaea 247
Oxya maritima 261
Paratlanticus ussuriensis 257
Phaedon cochlearia 251
Phaneroptera falcata 258
Philopona vibex 254
Phratora atrovirens 251
Phratora laticollis 251
Phyllotreta kurbatovi 254
Phyllotreta undulata 254
Plagiodera versicolora 251
Plagiosterna aenea 251
Podismopsis genicularibus 264
Podismopsis ussuriensis 264, 265
Polionemobius taprobanensis 259
Prumna montana 261, 265
Prumna primnoa 261, 265
Prumna primnoides 261
Prumna ussuriensis 262, 265
Pteronemobius gorochovi 259
Pteronemobius yezoensis 260
Ruspolia dubia 258
Schmidtiacris schmidti 264
Shirakiacris shirakii 262
Sphagniana ussuriana 257
Stenoluperus nipponensis 254
Stethophyma magister 265
Syneta betula amurensis 248
Teleogryllus (Brachyteleogryllus) infernalis
 258
Tetrix japonica 260
Tettigonia ussuriana 257
Xya japonica 260
Zubovskya koeppeni 262

Научное издание

*Богачева Анна Вениаминовна
Булах Евгения Мироновна
Бутовец Галина Николаевна
Бухарова Надежда Владимировна
Галанина Ирина Александровна
Гладкова Галина Александровна
Егорова Лина Николаевна
Крониковская Надежда Дмитриевна
Манько Юрий Иванович
Маслова Ирина Владимировна
Медведева Любовь Анатольевна
Сергеев Максим Евгеньевич
Сибирина Лидия Алексеевна
Стороженко Сергей Юрьевич
Яковченко Лидия Сергеевна*

БИОТА И ПОЧВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»

Ответственный редактор
А.В. Богачева

Редактор *Н.В. Давыденко*
Компьютерная верстка *С.В. Филатов*

Подписано в печать 23.09.2020 г.
Формат 70x100/16. Усл. п. л. 29,2. Уч.-изд. л. 22.
Тираж 300 экз. Заказ 1073.

ФГУП «Издательство Дальнаука»
690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7
Тел. +7 9147067252. E-mail: dalnauka@mail.ru
<http://www.dalnauka.ru>

Отпечатано в ЗАО «ЛИТ»
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1в