

Орденская лента Мольтрехта

Catocala moltrechti O. Bang-Haas, 1927

Лента Мольтрехта в Красной книге Российской Федерации, 2001

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Эребиды – Erebidae

(Семейство Совки – Noctuidae в Красной книге Российской Федерации, 2001)



Категория и статус. **I** – находящийся под угрозой исчезновения вид (в Красной книге Российской Федерации 2001 г. – **I**, находящийся под угрозой исчезновения вид); **II** – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN B2ac(iii)); **II** приоритет природоохранных мер.

Распространение. Эндемик Дальнего Востока, область распространения охватывает юг Приморского края, Корею и Северо-Восточный Китай (Кононенко, 2016). Типовой экземпляр собран в 1915 г. близ ж.д. ст. Седанка (Мольтрехт, 1929) в современных границах г. Владивосток. В дальнейшем отмечен в 1959 и 1961 гг. в Уссурийском заповеднике (Государственный Дарвиновский Музей), в 1972 г. в Лазовском заповеднике близ с. Киевка (Чистяков, 2005), также в XX в. в заповеднике «Кедровая падь» (Свиридов, 2001), в 2006 г. в Хасанском районе, в 2010 г. близ д. Нахимовка Спасского района и без указания локалитета в Приморском крае в июле 2011 г. (материалы натуралистов), в 2014 г. близ д. Анисимовка, в 2015 г. и в 2016 г. близ д. Калиновка, в августе 2016 г. близ с. Горно-Таёжное (GBIF, 2021, сборы В.А. Головизина).

Места обитания и особенности экологии. Обитатель зоны маньчжурских континентальных широколиственных и смешанных лесов (Кононенко, 2005). Кедровой пади отмечен в долинном лесу. Лёт во второй половине июля – августе (Свиридов, 2001), чему не противоречат и современные наблюдения.

По-видимому, развивается одно поколение в год. До настоящего времени ~~не известны ни кормовые растения гусениц, ни сами гусеницы, ни особенности зимовки особей данного вида.~~

Численность. За время после занесения вида в Красную книгу Российской Федерации в 1997 г. получены достоверные сведения (возможно – заниженные) о нахождении вида в **няти** местах обитания. Нет данных об обитании вида в типовой местности после 1915 г. Некоторые другие местонахождения нуждаются в подтверждении. Основываясь на сообщениях о результатах лова бабочек этого вида на свет, следует признать, что в местах обитания он редок.

Лимитирующие факторы. К сокращению площади потенциальных местообитаний приводят **вырубки и пожары**. Небольшая площадь ареала говорит о наличии неустановленных специфических лимитирующих факторов. До тех пор, пока не доказано обратное, следует считать опасными для данного вида факторами чрезмерное рекреационное воздействие, меняющее лесную среду, а также неконтролируемое изъятие из природы бабочек. Коллекционные образцы орденской ленты Мольтрехта являются объектом незаконного коммерческого оборота (Коммерческий оборот..., 2020).

Принятые меры охраны. Занесён в Красную книгу Приморского края (Чистяков, 2005). Подпадает под действие решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающего запрет на вывоз и ввоз образцов данного вида через таможенную