

**Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том III. Coleoptera – Жесткокрылые.** – Владивосток: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 2025. – 928 с.

Третья книга 5-томной серии посвящена одному из самых больших отрядов насекомых – жесткокрылым, или жукам, который насчитывает на Дальнем Востоке России 6291 вид из 1826 родов и 114 семейств. Даются общие сведения о разнообразии на Дальнем Востоке и по отдельным регионам. Разделы по каждому из 114 семейств включают краткую характеристику и аннотированный каталог зарегистрированных родов и видов. Для каждого включенного рода даны типовой вид, синонимы и краткая биология, сведения о числе видов и общем распространении. Сведения по включенным видам содержат синонимы, сведения по биологии, а также распространение (на Дальнем Востоке и общее). Книга иллюстрирована 40 цветными таблицами фотографий представителей 114 семейств Coleoptera. Большая библиография является документальной основой для включенных в каталог таксонов. Книгу завершает указатель латинских названий жесткокрылых, что значительно облегчит пользование книгой.

Библ. 2695, илл. 482 + 4 карты-схемы.

**Annotated catalogue of the insects of Russian Far East. Volume III. Coleoptera.** – Vladivostok: FSC Biodiversity FEB RAS, 2025. – 928 p.

The third book of the 5-volume series is devoted to one of the largest orders of insects – Coleoptera, or beetles, which numbers 6291 species from 1826 genera and 114 families in the Russian Far East. Information on the diversity in the Far East and regions is given. Sections on each of the 114 families include a brief description and an annotated catalogue of registered genera and species. For each included genus, the type species, synonyms and brief biology, information on the number of species and general distribution are given. Information on the included species contains synonyms, information on biology, and distribution (in the Far East and in general). The book is illustrated with 40 color plates of photographs of representatives of 114 Coleoptera families. A large bibliography is the base for the taxa included in the catalogue. Index of Latin names of Coleoptera will be useful for the search of taxa.

Bibl. 2695 titles, ill. 482 + 4 maps.

Главный редактор  
А. С. Лелей

Составители:

М.Г. Волкович, М.Ю. Гильденков, М.Н. Данилевский, А.А. Зайцев, В.К. Зинченко,  
С.В. Казанцев, А.Г. Кирейчук, А.В. Ковалев, А.В. Куприн, С.А. Курбатов, А.А. Легалов,  
С.В. Литовкин, Г.Ю. Любарский, К.В. Макаров, М.Ю. Мандельштам, М.В. Набоженко,  
А.В. Петров, П.Н. Петров, А.А. Полилов, А.А. Прокин, А.С. Просвирнов, С.К. Рындевич,  
А.С. Сажнев, С.В. Салук, О.И. Семионенков, М.Е. Сергеев, А.В. Соколов, Ю.Н. Сундуков,  
Д. Тельнов, С.Э. Чернышёв, С.А. Шабалин, А.В. Шаврин

Редакционная коллегия книги:  
Ю.Н. Сундуков (отв. редактор), А.В. Куприн, М.Е. Сергеев, С.А. Шабалин

Рецензенты:  
С.А. Белокобыльский, Е.А. Макарченко

**Gyrinus (Gyrinus) pullatus** Zaitzev, 1908. В водоемах, чаще в озерах. Россия: Маг., Хаб., Прим., Сах.; Бур., Сиб., европейская часть (север). – Корея, СВ Китай, С Европа.

**Gyrinus (Gyrinus) sachalinensis** Kamiya, 1936 (*Gyrinus reticulatus* Brinck, 1940; *G. curtus* sensu auct., nec Motschulsky, 1866; см. Nilsson *et al.*, 2001) (*G. curtus*: Лафер, 1989). Россия: Ю Прим., Сах., Ю Кур. – Япония (Ребун, Хоккайдо, Хонсю).

#### Триба ORECTOCHILINI

**Orectochilus** Dejean, 1833. Типовой вид *Gyrinus villosus* O.F. Müller, 1776. Обитают в водотоках с быстрым течением, в отличие от представителей других родов, имаго активны преимущественно ночью, в сумерках или на затененных участках, от солнечных лучей прячутся под водой. Распространен в Афrotропической, Палеарктической и Ориентальной областях. В роде 182 вида; в Палеарктике 16. В России 2 вида.

**Orectochilus punctipennis** Sharp, 1884. Россия: Прим. – Япония (Хонсю, Сикоку, Кюсю), Ю Корея.

**Orectochilus villosus dauricus** Motschulsky, 1860. Россия: Ю Хаб.; Заб., Иркут. – Ю Корея, СВ и СЕ Китай, Монголия.

### Сем. TRACHYPACHIDAE

(Сост. Ю.Н. Сундуков)

Небольшие жуки (длина 4,0–7,0 мм), внешне напоминающие мелких Carabidae, но отличающиеся большими тазиками задних ног и некоторыми другими особенностями строения. Обычно встречаются на мхах или в опавших листьях хвойных лесов, считаясь в основном хищниками и падальщиками, активными в дневное время. Является одним из наиболее древних семейств жесткокрылых, известных с границы перми и триаса около 252 миллионов лет назад. Исследованная фауна представлена более чем 20 родами подсемейства Eodromeinae. Распространены в Голарктике и на юге Ю Америки (Чили, Аргентина). Современная фауна включает 6 видов из 2 родов. В Палеарктике 1 вид.

Литература. Лафер, 1989б; Erwin, 2007; Сундуков, 2009в; Vasilikopoulos *et al.*, 2021.

#### Подсем. TRACHYPACHINAE

**Trachypachus** Motschulsky, 1844 (*Trachypachys* Gemminger et Harold, 1868). Типовой вид *Blethisa zetterstedtii* Gyllenhal, 1827. Распространены в Голарктике. В роде 4 вида: 3 на западе С Америки и 1 на севере Евразии.

**Trachypachus zetterstedtii** (Gyllenhal, 1827) [Blethisa] (*Trachypachus transversicollis* Motschulsky, 1844; *T. laticollis* Motschulsky, 1864). Встречается в дневное время в таежных лесах на открытых или слабо затененных участках. Россия: Чук., Маг., Хаб., Амур., Прим., Сах.; Якут., Заб., Бур., Иркут., Сиб., Урал, европейская часть (север). – С Корея, СВ Китай, С Европа.

### Сем. RHYSODIDAE – РИЗОДИДЫ

(Сост. Ю.Н. Сундуков)

Небольшие жуки (длина 4,0–10,0 мм), внешне напоминающие жужелиц подсемейства Scaritinae. Личинки развиваются в мертвой древесине лиственных и хвойных пород. Большинство видов обитает в Южном полушарии. Распространены на всех континентах,