

Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том III. Coleoptera – Жесткокрылые. – Владивосток: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 2025. – 928 с.

Третья книга 5-томной серии посвящена одному из самых больших отрядов насекомых – жесткокрылым, или жукам, который насчитывает на Дальнем Востоке России 6291 вид из 1826 родов и 114 семейств. Даются общие сведения о разнообразии на Дальнем Востоке и по отдельным регионам. Разделы по каждому из 114 семейств включают краткую характеристику и аннотированный каталог зарегистрированных родов и видов. Для каждого включенного рода даны типовой вид, синонимы и краткая биология, сведения о числе видов и общем распространении. Сведения по включенным видам содержат синонимы, сведения по биологии, а также распространение (на Дальнем Востоке и общее). Книга иллюстрирована 40 цветными таблицами фотографий представителей 114 семейств Coleoptera. Большая библиография является документальной основой для включенных в каталог таксонов. Книгу завершает указатель латинских названий жесткокрылых, что значительно облегчит пользование книгой.

Библ. 2695, илл. 482 + 4 карты-схемы.

Annotated catalogue of the insects of Russian Far East. Volume III. Coleoptera. – Vladivostok: FSC Biodiversity FEB RAS, 2025. – 928 p.

The third book of the 5-volume series is devoted to one of the largest orders of insects – Coleoptera, or beetles, which numbers 6291 species from 1826 genera and 114 families in the Russian Far East. Information on the diversity in the Far East and regions is given. Sections on each of the 114 families include a brief description and an annotated catalogue of registered genera and species. For each included genus, the type species, synonyms and brief biology, information on the number of species and general distribution are given. Information on the included species contains synonyms, information on biology, and distribution (in the Far East and in general). The book is illustrated with 40 color plates of photographs of representatives of 114 Coleoptera families. A large bibliography is the base for the taxa included in the catalogue. Index of Latin names of Coleoptera will be useful for the search of taxa.

Bibl. 2695 titles, ill. 482 + 4 maps.

Главный редактор
А. С. Лелей

Составители:

М.Г. Волкович, М.Ю. Гильденков, М.Н. Данилевский, А.А. Зайцев, В.К. Зинченко, С.В. Казанцев, А.Г. Кирейчук, А.В. Ковалев, А.В. Куприн, С.А. Курбатов, А.А. Легалов, С.В. Литовкин, Г.Ю. Любарский, К.В. Макаров, М.Ю. Мандельштам, М.В. Набоженко, А.В. Петров, П.Н. Петров, А.А. Полилов, А.А. Прокин, А.С. Просвирев, С.К. Рындевич, А.С. Сажнев, С.В. Салук, О.И. Семионенков, М.Е. Сергеев, А.В. Соколов, Ю.Н. Сундуков, Д. Тельнов, С.Э. Чернышёв, С.А. Шабалин, А.В. Шаврин

Редакционная коллегия книги:
Ю.Н. Сундуков (отв. редактор), А.В. Куприн, М.Е. Сергеев, С.А. Шабалин

Рецензенты:
С.А. Белокобыльский, Е.А. Макарченко

Zeteotomus maximus (Bernhauer, 1907) [Metoponcus]. Россия: Прим., Ю Кур. (Кунашир). – Япония (везде), Китай (Ляонин, Цзилинь).

Подсем. STENINAE

(Сост. Ю.Н. Сундуков)

Литература. Poppius, 1910; Bernhauer, 1913, 1926; Rambousek, 1921; Криволуцкая, 1973; Крыжановский и др., 1973; Puthz, 1973, 1991, 2001, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013; Рывкин, 1987; Ryvkin, 1987a, 1987b, 2000, 2002a, 2002b, 2011a, 2012, 2013, 2014b, 2018; Веселова, Рывкин, 1991; Шаврин, Берлов, 1998; Ryabukhin, 1999; Naomi *et al.*, 2000, 2017, 2022; Рябухин, 2002, 2021, 2024; Cho *et al.*, 2002; Shavrin, Puthz, 2007; Шаврин, Гильденков, 2009; Kastcheev, Puthz, 2011; Лобкова, Семёнов, 2012, 2014, 2015; Shibata *et al.*, 2013; Naomi, Ito, 2014; Naomi, Nomura, 2015; Oh, Cho, 2015; Schülke, Newton, 2015; Schülke, Smetana, 2015; Лобкова и др., 2017; Рябухин, Докучаев, 2018; Сажнев, 2018b; Воинков, 2020; Newton, 2022.

Stenus Latreille, 1797. Типовой вид *Staphylinus juno* Paykull, 1789. Встречаются на почве, преимущественно во влажных биотопах: на берегах водоемов, влажных и сырьих лугах, болотах. Являются хищниками коллемболов и других мелких насекомых; некоторые виды охотятся на низких растениях. Виды *Stenus* также известны тем, что могут “скользить” по поверхности воды посредством секреции своих пигидиальных желез, действующих как поверхностно-активное вещество и быстро продвигают жука вперед; известно, что *Stenus comma* достигает скорости 0,75 м/с и преодолевает расстояние до 15 м. Распространены всесветно. Всего около 3130 видов из 6 подродов, в Палеарктике около 1150 видов из 5 подродов, в России около 230 видов из 5 подродов. – 111 видов из 5 подродов.

Stenus (Hemistenus) aureolus Fauvel, 1875 (*Stenus fluviatilis* L. Benick, 1921). Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим.; Заб., Бур., Иркут., В Сиб. – Китай (Хэйлунцзян), Монголия.

Stenus (Hemistenus) consularis Ryvkin, 2000. Россия: Ю Хаб.

Stenus (Hemistenus) coronatus coronatus L. Benick, 1928. Россия: Ю Прим. – С Корея, Китай (кроме запада и Тибета).

Stenus (Hemistenus) etsukoae Naomi, 1987. Россия: Ю Кур. (Кунашир). – Япония (Хоккайдо, Рисири).

Stenus (Hemistenus) friebi L. Benick, 1924 (*Stenus pararufescens* J.-K. Li, 1993). Россия: Хаб., Прим. – С и Ю Корея, Китай (Хэйлунцзян, Цзилинь).

Stenus (Hemistenus) gubernator Ryvkin, 1987. Россия: Прим.

Stenus (Hemistenus) noctivagus Casey, 1884 (*Stenus methodii* Ryvkin, 1988). Россия: Мар.; Якут., Тыва, З Сиб. – Япония (Хонсю), Кыргызстан, Финляндия, Швеция, Италия, С Америка.

Stenus (Hemistenus) rugipennis Sharp, 1874 (*Stenus conformis* Eppelsheim, 1886; *S. sharpianus* Cameron, 1930; *S. namazu* Hromádka, 1979). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах.; В Сиб. – Япония (везде), С Корея, Китай (СЕ, ЦЕ, Тайвань).

Stenus (Hemistenus) sharpi Bernhauer et Schubert, 1911 (*Stenus palpalis* Sharp, 1889; *S. paracicindeloides* J.-K. Li, 1993). Россия: Хаб., Прим. – Япония (Хонсю, Сикоку, Кюсю), С Корея, “Китай”.

Stenus (Hemistenus) sibiricus J. Sahlberg, 1880 (*Stenus confusus* Casey, 1884; *S. deductor* Casey, 1884; *S. montanus* Casey, 1884; *S. exasperatus* L. Benick, 1925; *S. wenzeli* Puthz, 1967). Россия: Маг., Хаб. (включая о-в Большой Шантар), Амур.; Якут., Заб., Бур.,

- Иркут., В и З Сиб., европейская часть (север). – Китай (Шаньси), Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Европа (Скандинавский п-ов), С Америка.
- Stenus (Hemistenus) veselovae** Ryvkin, 1987. Россия: Чук., Маг.; север В и З Сиб. – Китай (Синьцзян), Казахстан, Кыргызстан, Европа (Финляндия, Швеция, Италия).
- Stenus (Hemistenus) wrasei** Puthz, 2006. Россия: Прим. (Ю Сихотэ-Алинь).
- Stenus (Hypostenus) alexanderi** Puthz, 1971. Россия: Маг.; север В Сиб. – Монголия, С Америка.
- Stenus (Hypostenus) aquilonalis** Naomi et Puthz, 1997. Россия: Ю Хаб., Сах. – Япония (Хоккайдо, Хонсю).
- Stenus (Hypostenus) bohemicus** Machulka, 1947 (*Stenus palmi* L. Benick, 1950). Россия: Амур., Прим., Ю Кур. (Кунашир); Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., европейская часть (север, центр). – Япония (Хоккайдо, Хонсю), С Корея, Китай (Хэйлунцзян, Цзилинь), Монголия, Казахстан, В Европа.
- Stenus (Hypostenus) cicindeloides** (Schaller, 1783) [*Staphylinus*] (*Stenus scabrior* Stephens, 1833; *S. hydropathicus* Wollaston, 1857; *S. palmi* L. Benick, 1950; *S. polypterus* Bernhauer, 1938; *S. coomani* Cameron, 1940). Россия: Амур., Прим., Ю Кур. (Кунашир); Заб., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть. – Япония (всё), С и Ю Корея, Китай (кроме запада), Монголия, Казахстан, Турция, Закавказье, Европа, Марокко; Ориентальная область.
- Stenus (Hypostenus) decoratus** L. Benick, 1914 (*Stenus jureceki* Rambousek, 1921). Россия: Ю Прим. – С Корея, Китай (Хэйлунцзян, Хэбэй, Цзянси).
- Stenus (Hypostenus) imitator** Eppelsheim, 1893. Россия: Хаб., Амур., Прим.; Бур., Иркут. – С Корея, Китай (Хэйлунцзян), Монголия.
- Stenus (Hypostenus) kiesenwetteri** Rosenhauer, 1856. Россия: ДВ; европейская часть (центр). – Япония (Хоккайдо), Европа. Примечание. Нам не удалось найти указаний для конкретных регионов ДВ.
- Stenus (Hypostenus) mercator** Sharp, 1889 (*Stenus azureus* Krásá, 1945; *S. krasai* Puthz, 1965). Россия: Ю Прим.; европейская часть (центр). – Япония (все крупные острова), С и Ю Корея, В Китай.
- Stenus (Hypostenus) oblitus** Sharp, 1874 (*Stenus chapmani* Cameron, 1934). Россия: Прим.; В Якут. – Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю), С и Ю Корея, В Китай, Ориентальный регион.
- Stenus (Hypostenus) plicipennis** (Casey, 1884) [*Areus*] (*Areus agnatus* Casey, 1884; *Stenus repandus* Poppius, 1909; *S. torus* L. Benick, 1925). Россия: Чук., Камч.; Якут. – С Америка.
- Stenus (Hypostenus) sedatus** Sharp, 1889. Россия: Ю Кур. (Кунашир). – Япония (Хоккайдо, Хонсю), С Корея, Китай (Хэйлунцзян).
- Stenus (Hypostenus) tarsalis** Ljungh, 1810 (*Stenus clavicornis* Gravenhorst, 1802; *S. flavitarsis* Stephens, 1833; *S. nigriclavis* Stephens, 1833; *S. rufitarsis* Stephens, 1833; *S. riparius* Runde, 1835; *S. roscidus* Snellen van Vollenhoven, 1854; *S. insidiosus* Solsky, 1864; *S. wusthoffianus* Machulka, 1947). Россия: Маг., Ю Хаб.; Якут., В и З Сиб., европейская часть (север, центр). – Казахстан, Европа, С Америка.
- Stenus (Hypostenus) weisei** Bernhauer, 1912. Россия: Ю Кур. – Япония (Хоккайдо). Примечание. Приводится для Ю Кур. по данным японских авторов (Naomi et al., 2017).
- Stenus (Metatesnus) auriger** Eppelsheim, 1893. Россия: Маг., Камч. (включая Корякию), Сах.; Иркут. – С Корея, Монголия, Китай (Ляонин, Внутренняя Монголия).
- Stenus (Metatesnus) benefactor** Ryvkin, 1985 (*Stenus kanmiyai* Naomi, 1988). Россия: Амур., Прим.; Заб. – Япония (все крупные острова).

- Stenus (Metatesnus) bifoveolatus** Gyllenhal, 1827 (*Stenus nitidus* Stephens, 1833; *S. phaeopus* Stephens, 1833; *S. plancus* Erichson, 1840). Россия: Кур.; Иркут., В Сиб., европейская часть (север, центр). – Казахстан, Узбекистан, Закавказье, Европа. Примечание. Приводится для Кур. по данным японских авторов (Naomi, Nomura, 2015).
- Stenus (Metatesnus) depresso** Puthz, 1973. Россия: Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Ю Кур. (Кунашир); В Сиб. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Китай (Хэйлунцзян, Сычуань, Тайвань).
- Stenus (Metatesnus) niveus** Fauvel, 1865 (*Stenus cavifrons* Mulsant et Rey, 1870; *S. vista* Sanderson, 1946). Россия: Камч., Ю Кур. (Кунашир); Заб., Иркут., В Сиб., европейская часть (север). – С и ЦЕ Европа, С Америка.
- Stenus (Metatesnus) pubescens fraternus** (Casey, 1884) [Areus] (*Stenus sandersonianus* Puthz, 1972). Россия: Маг., Камч. (включая Корякию), Хаб., Амур.; Заб., Иркут., В Сиб. – Япония (Хоккайдо), Китай (Хэйлунцзян), Монголия, Казахстан, С Америка.
- Stenus (Metatesnus) pubescens pubescens** Stephens, 1833 (*Stenus laevior* Stephens, 1833; *S. laevis* Stephens, 1833; *S. subimpressus* Erichson, 1839). Россия: Чук., Маг.; Якут., Иркут., В Сиб., европейская часть (север, центр). – Европа, С Америка.
- Stenus (Stenus) ageus** Casey, 1884 (*Stenus rigidus* Casey, 1884; *S. dissociatus* Eppelsheim, 1893; *S. parvulus* L. Benick, 1914; *S. gerhardti* L. Benick, 1915). Россия: Маг., Камч., Хаб., Амур.; Якут., Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., европейская часть (север). – С Корея, СВ Китай, Монголия, СВ Европа, С Америка.
- Stenus (Stenus) alienus** Sharp, 1874 (*Stenus semenowi* Eppelsheim, 1889; *S. subnudus* Eppelsheim, 1893; *S. pekinensis* Csiki, 1901). Россия: Хаб., Амур., Прим., Ю Кур. (Кунашир); Заб., Бур., Иркут. – Япония (везде), С и Ю Корея, Китай (кроме запада).
- Stenus (Stenus) alopec** Ryvkin, 2012. Россия: Чук.; С Красноярского края. Примечание. Рассматривается, как непригодное название: “Электронная публикация, не соответствующая положениям статьи 8.5.3 МКЗН: регистрация в Зообанке 05.10.2012 после публикации 24.05.2012” (Schulke, Newton, 2015).
- Stenus (Stenus) amurensis** Eppelsheim, 1886. Россия: Амур., Ю Кур. (Итуруп); Заб., Иркут. – Япония (Хоккайдо, Рисири), Китай (Хэйлунцзян).
- Stenus (Stenus) aquilonius** L. Benick, 1921 (*Stenus affinelseyretus* Zhao et Zhou, 2007; *S. guandiensis* Zhao et Zhou, 2007). Россия: Хаб. – Китай (Цзилинь, Пекин, Шаньси, Ганьсу, Цинхай), Монголия, Казахстан, С Америка.
- Stenus (Stenus) assequens assequens** Rey, 1884 (*Stenus latior* Rey, 1884; *S. nanulus* Casey, 1884; *S. pusio* Casey, 1884; *S. simillimus* L. Benick, 1949). Россия: Прим.; Иркут., В и З Сиб., европейская часть (север). – Китай (Цзилинь), Казахстан, ЦЕ и Передняя Азия, Кипр, Грузия, Европа, С Африка, С Америка.
- Stenus (Stenus) baicalensis** Puthz, 1968. Россия: Прим.; Заб., Иркут., Тыва, З Сиб. – Монголия.
- Stenus (Stenus) biguttatus** (Linnaeus, 1758) [Staphylinus] (*Stenus binotatus* Stephens, 1833; *S. bimaculosus* Stephens, 1839; *S. bipustulatus* Thomson, 1857; *S. thomsoni* Jacobson, 1908; *S. azarias* Bondroit, 1912). Россия: Сах., Ю Кур. (Кунашир); Якут., В и З Сиб., Урал, европейская часть. – Япония (Хоккайдо), Казахстан, Закавказье, Европа.
- Stenus (Stenus) bilineatus** J. Sahlberg, 1871 (*Stenus corvus* Casey, 1884; *S. tacoma* Casey, 1884). Россия: Маг., Камч.; Заб., Иркут., В Сиб., европейская часть (север). – С Европа (Скандинавский п-ов), С Америка.
- Stenus (Stenus) boops boops** Ljungh, 1810 (*Stenus angustatus* Stephens, 1833; *S. foveiventris* Fairmaire et Laboulbène, 1856; *S. shepherdii* Crotch, 1867; *S. sulcatus* Mulsant et Rey, 1870). Россия: Маг., Камч., Хаб., Ю Кур. (Кунашир); Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал,

- европейская часть. – Япония (Хоккайдо), Китай (Цзилинь, Внутренняя Монголия), Монголия, Казахстан, Турция, Грузия, Европа.
- Stenus (Stenus) burjaetus** Puthz, 1980 (*Stenus nuntiator* Ryvkin, 1987). Россия: Маг., Хаб., Амур.; Якут., Бур., Иркут., В Сиб. – Ю Корея, Казахстан.
- Stenus (Stenus) canaliculatus** Gyllenhal, 1827 (*Stenus affinis* Stephens, 1833; *S. congener* Mäklin, 1853; *S. foveifrons* Rey, 1884; *S. cordaticollis* Leinberg, 1900). Россия: Маг., Камч., Хаб., Прим.; Якут., Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть. – С и Ю Корея, Китай (Шаньси), Монголия, Казахстан, Узбекистан, Иран, Турция, Европа, С Америка.
- Stenus (Stenus) canalis** Ryvkin, 2012. Россия: Маг., ЕАО, Прим.; Заб., Бур., Иркут. Примечание. Рассматривается, как непригодное название: “Электронная публикация, не соответствующая положениям статьи 8.5.3 МКЗН: регистрация в Зообанке 05.10.2012 после публикации 24.05.2012” (Schulke, Newton, 2015).
- Stenus (Stenus) cautus** Erichson, 1839 (*Stenus submarginatus* Stephens, 1833; *S. vafellus* Erichson, 1839). Россия: ДВ; Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. – Казахстан, Узбекистан, Турция, Грузия, Европа. Примечание. Нам не удалось найти указаний для конкретных регионов ДВ.
- Stenus (Stenus) clavicornis** (Scopoli, 1763) [*Staphylinus bupthalmus* Schrank, 1776; *Stenus atricornis* Stephens, 1833; *S. canaliculatus* Stephens, 1833; *S. nigricornis* Stephens, 1833; *S. punctatissimus* Stephens, 1833; *S. speculator* Lacordaire, 1835; *S. brunnipes* Grimmer, 1841; *S. kamtschaticus* Motschulsky, 1845; *S. boreellus* Poppius, 1908; *S. bourtzei* Bondroit, 1914]. Россия: Маг., Камч., Хаб., ЕАО, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. (Иткулуп, Кунашир, Полонского); Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. – Япония (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку), С Корея, СВ и СЗ Китай, Монголия, Казахстан, Турция, Закавказье, Европа, С Америка (интродуцирован).
- Stenus (Stenus) comma comma** LeConte, 1863 (*Stenus bipustulatus* Stephens, 1833; *S. bipunctatus* Erichson, 1839; *S. punctiger* Casey, 1884). Россия: Чук., Маг., Камч. (включая Корякию), Командорские о-ва, Хаб. (включая о-в Большой Шантар), Амур., Прим., Сах.; Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. – Япония (Хоккайдо), С и Ю Корея, Монголия, Казахстан, Китай (широко), Ирак, Турция, Закавказье, Европа, С Америка.
- Stenus (Stenus) distans** Sharp, 1889 (*Stenus beppuensis* Bernhauer, 1939). Россия: Хаб., Прим. – Япония (везде), С и Ю Корея, Китай (кроме запада).
- Stenus (Stenus) exploratus** Fall, 1926 (*Stenus incanoides* Puthz, 1968; *S. calculensis* Ryvkin, 1987). Россия: Маг., Камч.; Бур., Красноярский край. – С Америка.
- Stenus (Stenus) expugnator** Ryvkin, 1987. Россия: Ю Кур. (Кунашир). – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Китай (Шаньси).
- Stenus (Stenus) fasciculatus** J. Sahlberg, 1871. Россия: Чук., Маг., С Камч. (Корякия), Прим.; Якут., Заб., Бур., Иркут., В Сиб., европейская часть (север). – Китай (Внутренняя Монголия), С Европа (Скандинавский п-ов), С Америка.
- Stenus (Stenus) finalis** Ryvkin, 2011. Россия: Хаб., Прим., Сах., Ю Кур. (Шикотан, Зеленый). – Япония (Хоккайдо).
- Stenus (Stenus) finitor** Ryvkin, 2011. Россия: Амур. – Япония (Хоккайдо).
- Stenus (Stenus) frigidus** J. Sahlberg, 1880 (*Stenus tundrae* Puthz, 1972). Россия: Маг.; Якут., север В Сиб. – С Америка.
- Stenus (Stenus) gibbicollis** J. Sahlberg, 1880. Россия: Хаб., Амур., Прим.; Заб., Бур., В и З Сиб. – С Америка.
- Stenus (Stenus) hammondi** Puthz, 1970. Россия: Ю Прим. – Япония (Хоккайдо), Ю Корея, СВ Китай.

- Stenus (Stenus) illotulus** Puthz, 1972. Россия: Хаб., Амур.; Якут., Бур., Иркут., юг В Сиб. – Китай (Хэйлунцзян), С Монголия.
- Stenus (Stenus) illusor** Ryvkin, 1987. Россия: Чук., Маг., Камч., Хаб., Амур.; В Сиб. – Китай (Хэйлунцзян, Цзилинь).
- Stenus (Stenus) immodicus** Ryvkin, 2000 (*Stenus ryvkinii* Puthz, 2001). Россия: Ю Хаб., Прим.
- Stenus (Stenus) incrassatus** Erichson, 1839. Россия: ДВ; Якут., Заб., Бур., В и З Сиб., Урал, европейская часть. – Китай (Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия), Казахстан, Иран, Турция, Европа. Примечание. Нам не удалось найти указаний для конкретных регионов ДВ.
- Stenus (Stenus) indagator** Eppelsheim, 1887 (*Stenus lentus* Sharp, 1889). Россия: Хаб., Амур., Прим. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Китай (Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия).
- Stenus (Stenus) innuptus** Eppelsheim, 1893. Россия: С и Ю Кур. (Парамушир, Кунашир); Заб., Бур., Иркут.
- Stenus (Stenus) intrusus** Casey, 1884 (*Stenus simpliciventris* Poppius, 1909; *S. guranicus* Ryvkin, 1987). Россия: Амур.; Якут. – С Америка.
- Stenus (Stenus) japonicus** Sharp, 1874 (*Stenus insularis* J. Sahlberg, 1887; *S. necessarius* L. Benick, 1922; *S. niponensis* Cameron, 1930; *S. sinensis* L. Benick, 1940; *S. civicus* L. Benick, 1941). Россия: Камч., Ю Прим., С Кур. (Парамушир). – Япония (везде), С Корея, В Китай.
- Stenus (Stenus) juno** (Paykull, 1789) [*Staphylinus*] (*Staphylinus clavicornis* Fabricius, 1777; *Stenus bupthalmus* Latreille, 1804; *S. maurus* Mannerheim, 1830; *S. lineatulus* Stephens, 1833; *S. calabrus* Fiori, 1894). Россия: Чук. (включая о-в Врангеля), Маг., Камч. (включая Корякию), Командорские о-ва, Хаб., Прим., Ю Кур. (Кунашир); Якут., Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), СВ и СЕ Китай, Казахстан, Турция, Закавказье, Европа, С Америка (интродуцирован).
- Stenus (Stenus) koreanus** Puthz, 1991. Россия: Ю Прим. – С Корея, Китай (Цзилинь).
- Stenus (Stenus) kurilensis** Puthz, 2006. Россия: Ср. Кур. (Уруп).
- Stenus (Stenus) lagopodis** Ryvkin, 1987 (*Stenus miserandus* Ryvkin, 1987). Россия: Маг.; В Якут., Бур., Иркут., европейская часть (север).
- Stenus (Stenus) latipennis** J. Sahlberg, 1880. Россия: Маг., Хаб.; Якут., Иркут., север В и З Сиб., Полярный Урал. – Финляндия, С Америка.
- Stenus (Stenus) latissimus** Bernhauer, 1938 (*Stenus canis* Puthz, 1966). Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим.; Бур., Иркут. – Ю Корея, Китай (Цзянси), Монголия, Казахстан.
- Stenus (Stenus) lewisius pseudoater** Bernhauer, 1938 (*Stenus latior* Bernhauer, 1938; *S. subnitidus* Bernhauer, 1939). Россия: Ю Прим. – С Корея, В Китай. Примечание. Приводится для Прим. по данным японских авторов (Naomi *et al.*, 2017).
- Stenus (Stenus) limitaneus** Ryvkin, 1987. Россия: Хаб., ЕАО, Амур.
- Stenus (Stenus) mammops bulbicollis** L. Benick, 1921. Россия: Камч. – Китай (Хэйлунцзян).
- Stenus (Stenus) mammops mammops** Casey, 1884 (*Stenus rulomus* Blackwelder, 1943). Россия: Маг., Камч., Хаб.; Заб., Тыва. – Япония (Хоккайдо, Рисири, Цусима), С Корея, Китай (Хэйлунцзян, Цзилинь), С Америка.
- Stenus (Stenus) melanarius melanarius** Stephens, 1833 (*Stenus cinerascens* Erichson, 1839; *S. gracilentus* Fairmaire et Laboulbène, 1856; *S. nigripalpis* Thomson, 1857; *S. verecundus* Sharp, 1874; *S. notatus* Rey, 1884; *S. rugulosus* Rey, 1884; *S. orientalis* Bernhauer, 1931; *S. walkeri* Bernhauer, 1931; *S. hiroyukii* Puthz, 2001). Россия: Хаб., Прим., Ю Кур. (Кунашир); Якут., Заб., Бур., Иркут., европейская часть, Кавказ. – Япония (везде), С и Ю Корея, Китай (кроме запада), Монголия, Казахстан, Иран, Турция, Закавказье, Европа, С Америка.

- Stenus (Stenus) mikado** Hromádka, 1979 (*Stenus nomurai* Naomi, 1988). Россия: Ю Кур. (Кунашир). – Япония (везде).
- Stenus (Stenus) minus** Ryvkin, 2011. Россия: Амур.
- Stenus (Stenus) minutalis** Ryvkin, 2011 (*Stenus minor* Ryvkin, 2011). Россия: Амур.
- Stenus (Stenus) morio** Gravenhorst, 1806 (*Stenus aequalis* Mulsant et Rey, 1861; *S. inaequalis* Mulsant et Rey, 1861; *S. albipilus* Rey, 1884; *S. arcuatus* Rey, 1884; *S. luctulentus* Casey, 1884; *S. haplus* Casey, 1884; *S. dives* Casey, 1884; *S. subgriseus* Casey, 1884; *S. terricola* Casey, 1884; *S. indistinctus* Casey, 1884). Россия: Маг., Амур., Прим.; Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., Урал, европейская часть, Кавказ. – С Корея, Монголия, Казахстан, ЦЕ и Передняя Азия, Иран, Китай (СВ, СЕ, ЗП и СЗ), Грузия, Европа, С Америка.
- Stenus (Stenus) paradoxus** Bernhauer, 1916. Россия: Прим.; В Сиб. – Китай (СВ, Пекин, Шаньси, Шэньси, Внутренняя Монголия).
- Stenus (Stenus) pardulus** Ryvkin, 2011. Россия: Ю Прим.
- Stenus (Stenus) parvipennis** Bernhauer, 1913. Россия: ЕАО; В Сиб.
- Stenus (Stenus) paululus** L. Benick, 1924 (*Stenus campbelli* Puthz, 1973). Россия: Маг.; Заб., Бур. – С Америка.
- Stenus (Stenus) pluvius** Ryvkin, 2014. Россия: Амур.
- Stenus (Stenus) poppiusi** Puthz, 1972. Россия: Хаб.; Якут.
- Stenus (Stenus) puberulus** Sharp, 1874 (*Stenus sasajii* Naomi, 1988). Россия: Ю Прим. – Япония (везде), С и Ю Корея, В Китай.
- Stenus (Stenus) pudefactus** Ryvkin, 1987. Россия: Прим., Сах., Ю Кур. (Кунашир). – Япония (Хоккайдо).
- Stenus (Stenus) puetzi** Puthz, 2001. Россия: Прим. (Ю Сихотэ-Алинь).
- Stenus (Stenus) pumilio** Erichson, 1839 (*Stenus atomarius* Casey, 1884). Россия: С Амур.; Якут., европейская часть (север, центр). – Европа, С Америка. Примечание. Приведен для ДВ из Зейского зап. (Веселова, Рывкин, 1991).
- Stenus (Stenus) puthzi** Hromádka, 1977. Россия: Прим.
- Stenus (Stenus) raddei** Ryvkin, 1987. Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Китай (Хэйлунцзян).
- Stenus (Stenus) rugosulus** Fauvel, 1875. Россия: Ю Хаб.; Бур., Иркут.
- Stenus (Stenus) ruralis** Erichson, 1840 (*Stenus alpestris* Heer, 1841; *S. saxatilis* Gistel, 1857). Россия: Хаб., Прим., Ю Кур. (Кунашир); Якут., Заб., Бур., Иркут., В и З Сиб., европейская часть (север, центр). – Япония (Хоккайдо, Хонсю), С и Ю Корея, СВ и СЕ Китай, Монголия, Казахстан, Европа.
- Stenus (Stenus) sachalinus** Puthz, 2002. Россия: Сах.
- Stenus (Stenus) sauteri** Bernhauer, 1907. Россия: Камч. – Япония (везде), Ю Корея.
- Stenus (Stenus) secretus** Bernhauer, 1915 (*Stenus aureosetulus* L. Benick, 1924). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим.; Заб., Бур., Иркут. – С Корея, СВ и СЕ Китай, Монголия.
- Stenus (Stenus) strandi** L. Benick, 1937. Россия: Маг.; З Сиб., европ. часть (север). – Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия.
- Stenus (Stenus) szechuanus** Puthz, 1981. Россия: ДВ. – Китай (Цзянси, Сычуань). Примечание. Нам не удалось найти указаний для конкретных регионов ДВ.
- Stenus (Stenus) taigae** Poppius, 1909. Россия: ДВ; Якут. Примечание. Нам не удалось найти указаний для конкретных регионов ДВ.
- Stenus (Stenus) tichomirovae** Puthz, 1973. Россия: Ю Прим.
- Stenus (Stenus) ussuriensis** Ryvkin, 1987. Россия: Ю Прим. – Китай (Хэйлунцзян).
- Stenus (Stenus) vastator** Ryvkin, 1987. Россия: Прим.; Иркут.

Stenus (Stenus) vinnulus Casey, 1884 (*Stenus confusoides* Renkonen, 1935). Россия: Маг., Хаб., ЕАО, Амур., Прим.; Якут., Заб., В Сиб., европейская часть (север). – Китай (Хэйлунцзян), С Европа (Скандинавский п-ов), С Америка.

Stenus (Tesnus) formicetorum Mannerheim, 1843 (*Stenus minutus* Hochhuth, 1849; *S. littoralis* Thomson, 1857; *S. borealis* Mäklin, 1880; *S. freyi* L. Benick, 1921). Россия: Амур.; Бур., Иркут., север В Сиб., европейская часть. – Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Иран, Турция, Европа, С Америка (интродуцирован).

Stenus (Tesnus) immarginatus Mäklin, 1853 (*Stenus monticola* Casey, 1884; *S. variabilis* Puthz, 1968). Россия: Чук., Маг., Камч.; Якут., Заб., Бур., Иркут., север В и З Сиб., европейская часть (центр). – Япония (Хоккайдо), Китай (Хэбэй, Шаньси, Внутренняя Монголия). – С Америка.

Stenus (Tesnus) minutissimus Motschulsky, 1860. Россия: Амур.; Заб., Бур., Иркут. – Монголия.

Stenus (Tesnus) nubilus Ryvkin, 1987. Россия: Хаб., Амур.; Якут., Иркут., север В и З Сиб.

Stenus (Tesnus) pilosiventris Bernhauer, 1915 (*Stenus bodemeyeri* Bernhauer, 1927; *S. bodemeyerianus* Bernhauer, 1929). Россия: Хаб., ЕАО, Амур., Прим.; Заб. – Япония (Хонсю, Сикоку), С и Ю Корея, Китай (кроме запада).

Stenus (Tesnus) strobilus Ryvkin, 2002. Россия: Ю Хаб., С Прим. – Япония (Хоккайдо).

Stenus (Tesnus) subcautus Ryvkin, 2000. Россия: Амур., Прим.

Stenus (incertae sedis) falsator Puthz, 2008. Россия: Хаб., Амур., Прим.; Заб., Бур. – С Корея, СВ и СЕ Китай.

Stenus (incertae sedis) pubiformis Puthz, 2012. Россия: Ю Прим. – С Корея, СВ и СЕ Китай.

Подсем. TACHYPORINAE

(Сост. О.И. Семионенков)

Литература. Motschulsky, 1860; Heyden, 1880; Luze, 1901a; Poppius, 1904a; Bernhauer, 1907, 1938; Якобсон, 1908; Крыжановский и др., 1973; Молодова, 1973; Тихомирова, 1973; Coiffait, 1974; Ullrich, Campbell, 1974; Ullrich, 1975; Курчева, 1977; Филатова, 1982; Веселова, 1990; Veselova, 1993, 2011; Watanabe, 1993; Schülke, 1995a, 1995b, 1998a, 1999b, 2000a, 2000b, 2003a, 2003b, 2004b, 2005a, 2019a, 2019b, 2019c; Шаврин, Берлов, 1999; Ryabukhin, 1999; Herman, 2001; Majka, Klimaszewski, 2008a; Шаврин, Гильденков, 2009; Лобкова, 2010; Рябухин, 2010, 2020, 2024; Лобкова, Семёнов, 2012; Zhao, Li, 2013; Zheng *et al.*, 2014; Schülke, Smetana, 2015; Semionenkov *et al.*, 2015; Webster *et al.*, 2016; Лобкова и др., 2017; Рябухин, Докучаев, 2018; Воинков, 2020; Newton, 2021; Schülke, Hashizume, 2021; Yamamoto, 2021; Егоров, Семионенков, 2023; Семионенков, 2024; Семионенков, Гильденков, 2024.

Автор искренне благодарен Михаэлю Шульке (M. Schülke, Berlin, Germany) за неоценимую помощь в подготовке раздела по Tachyporinae.

Триба DEROPINI

Derops Sharp, 1889 (*Paraleaster* Cameron, 1930; *Rimulincola* Sanderson, 1947). Типовой вид *Derops longicornis* Sharp, 1889. Гигрофилы, встречаются по берегам рек, особенно в горах и предгорьях. Обитают во влажной подстилке или под камнями, предпочитая затененные участки. Распространены в Палеарктической, Неарктической и Ориентальной областях: от В Гималаев, С Вьетнама и Ю Китая до Японии и ДВ. Один вид, *Derops divalis* Sanderson, 1947, встречается в США (Иллинойс, Арканзас, Оклахома). В мире 21 вид, в Палеарктике 17. В России 3 вида.