

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный Научный Центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre




Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 6. Вып. 1

Vol. 6. No. 1



Ростов-на-Дону
2010

К познанию фауны сетчатокрылых (Neuroptera) Северо-Западного Кавказа

Contribution to the knowledge of the Neuroptera fauna of the North-Western Caucasus

В.Н. Макаркин¹, В.И. Щуров²
V.N. Makarkin¹, V.I. Shchurov²

¹Биологический институт Дальневосточного отделения РАН, Владивосток 690022 Россия

²Филиал ФГУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Краснодарского края», Краснодар, Россия

¹Institute of Biology and Soil Sciences, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Vladivostok 690022 Russia. E-mail: vnmakarkin@mail.ru

²«Centre of Protection of Forests of the Krasnodar Region», Branch of Federal State Department «Roslesozashchita», Krasnodar, Russia. E-mail: meotida@mail.kuban.ru

Ключевые слова: сетчатокрылые, Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика.
Key words: Neuroptera, Krasnodar Province, Republic of Adygea, Republic of Karachaevo-Cherkessia.

Резюме. Суммированы данные по фауне сетчатокрылых Северо-Западного Кавказа. Приведен материал для 30 видов; из них *Hemerobius contumax* Tjeder, 1932 и *Italochrysa italicica* (Rossi, 1790) являются новыми для России, 2 вида новые для Республики Адыгея, 2 – для Карачаево-Черкесской Республики и 14 – для Краснодарского края.

Abstract. Data on Neuroptera of the North-Western Caucasus are summarized. Thirty species are reported; two species *Hemerobius contumax* Tjeder, 1932 and *Italochrysa italicica* (Rossi, 1790) are new for Russia, two species are new for Adygea and two for Karachaevo-Cherkessia, and fourteen are new for Krasnodar Province.

Введение

Фауна сетчатокрылых (Neuroptera) Северо-Западного Кавказа, охватывающего Краснодарский край, Адыгейю, юг Ростовской области и юго-запад Карачаево-Черкесии [Канонников, 1977], изучена очень слабо. Сведения о ней в литературе фрагментарны; из первых двух регионов до настоящего времени были известны лишь 19 видов сетчатокрылых [Кожанчиков, 1951, 1958; Суздалская, 1956; Гиляров, 1962; Захаренко, 1987; Захаренко, Кривохатский, 1993; Кривохатский, Захаренко, 1994; Щуров, 2001; Щуров и др., 2004; Кривохатский, 2007а-ж]. Судя по видовому разнообразию иных отрядов насекомых на Северо-Западном Кавказе и находкам Neuroptera в других регионах Кавказа, местная фауна сетчатокрылых должна быть существенно богаче.

Данная работа представляет результаты обработки первым автором фаунистических сборов, проведенных В.И. Щуровым в 1988–2009 годах попутно с изучением чешуекрылых (Lepidoptera) этого и смежных регионов российского Кавказа [Щуров, 2005]. Поскольку рассматриваемый материал был собран, в общем, случайно, полученный набор видов условно можно принять за фоновую фауну

отряда этого региона, кроме действительно удачных находок повсеместно редких таксонов. Ниже приведен материал для 30 видов сетчатокрылых, в том числе двух новых для России, *Hemerobius contumax* Tjeder, 1932 и *Italochrysa italicica* (Rossi, 1790). Не представлены пять видов, ранее указанные для Краснодарского края: *Mantispa perla* (Pallas, 1772) [Захаренко, 1987], *Hypochnysa elegans* (Burmeister, 1839), *Chrysotropia ciliata* (Wesmael, 1841), *Deutoleon lineatus* (Fabricius, 1798) [Захаренко, Кривохатский, 1993] и *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) [Кривохатский, 2007б]. Таким образом, к настоящему времени в Краснодарском крае зарегистрированы 34 вида сетчатокрылых и 4 вида в Республике Адыгея (из них *Libelloides macaronius* (Scopoli, 1763) указан, видимо, ошибочно, см. ниже). Всего на Северном Кавказе известно еще около 50 видов сетчатокрылых [Кожанчиков, 1958; Дорохова, 1979; Захаренко, 1987, 1989; Захаренко, Кривохатский, 1993; Makarkin, 1996; Abrahám, 2000]. Большая их часть может быть найдена и на Северо-Западном Кавказе. Общее число видов сетчатокрылых в этом регионе, следовательно, может составлять до 80.

Материал и методы

Весь материал собран В.И. Щуровым преимущественно на различные искусственные источники света (редко днем), поэтому при его перечислении имя коллектора опускается. Большая часть материала хранится в Биологическом институте ДВО РАН (Владивосток), остальная – в коллекции В.И. Щурова, несколько экземпляров передано в Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург) [ЗИН]. Основные места сбора сетчатокрылых показаны на карте (рис. 1). Их номера приводятся в тексте в квадратных скобках при каждом упоминании. Регионы, впервые указываемые для видов, отмечены звездочкой. В статье принята флорогенетическая классификация степей Северо-Западного Кавказа Литвинской [1994].




Рис. 1. Места сбора Neuroptera [1–31] на Северо-Западном Кавказе.

Регионы Российской Федерации: КК – Краснодарский край; СК – Ставропольский край; РО – Ростовская область; РК – Республика Калмыкия; КЧР – Карачаево-Черкесская Республика; РА – Республика Адыгея. UA – Украина, Abh – Республика Абхазия.

Fig. 1. Collecting localities of Neuroptera [1–31] in the North-Western Caucasus.

Regions of Russian Federation: KK – Krasnodar Prov.; CK – Stavropol Prov.; PO – Rostov Region; PK – Rep. of Kalmykia; KЧР – Rep. of Karachaevo-Cherkessia; PA – Rep. of Adygea. UA – Ukraine; Abh – Rep. of Abkhazia.

Семейство Osmylidae

Osmylus elegantissimus Kozhanchikov, 1951

Материал. Краснодарский кр.: Северский р-н, верх. р. Убин, хр. Папай, 600 м н.у.м., под пологом дубово-грабового леса, 10.07.1997, на свет ДРВ, 1♀ [12]; Апшеронский р-н, хр. Черногорье, Агуловая Балка, 1400 м н.у.м., высокотравный луг в пойме, на свет ДРВ, 28.05.1998, 2♀ [20]; Сочи, дол. р. Псую, пос. Айга 3, 900 м н.у.м., 26.07.2000, на свет ДРВ, 1♀ [26]; Мостовской р-н, Кавказский гос. природн. биосфер. запов. [КГПБЗ], дол. р. Малая Лаба, устье р. Безымянка, 1470 м н.у.м., сосновый лес, на свет «Петромах», 12.07.2008, 1♀ [28]. Карабаево-Черкесия: Кавказский запов., дол. р. Имеретинка, 1750 м н.у.м., высокотравный луг в пойме, на свет «Петромах», 8.07.2005, 1♀ [31].

В России известен из большинства регионов Северного Кавказа: Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня (Харанхой), Ингушетия (Торгим, Ольгети, Фуртоуг), Краснодарский край (Кунская поляна, Сочи (долина реки Мzymта), хребет Азиш-Тау, хребет Черногорье), Карачаево-

Черкесия (Архыз, Теберда) [Кожанчиков, 1951, 1958; Макаркин, 1985б; Кривохатский, 1995, 2007e; Abrahám, 2000]. За пределами России встречается в Грузии, Азербайджане, Армении, Турции и Южном Казахстане (Кызылординская область: долина реки Сыр-Дарья, село Байгакум). Нынешнее существование изолированной популяции в Казахстане требует подтверждения, поскольку единственный экземпляр был собран в 1907 году [Кожанчиков, 1951]. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [Кривохатский, 2007e].

Семейство Dilaridae

Dilar turcicus Hagen, 1858

Материал. Краснодарской кр.: Геленджик, юж. скл. хр. Маркотх, 300 м н.у.м., грабинниково-пушистодубовый шипняк, средиземноморская степь, на свет ДРВ, 28.06.2000, 1♂ [9]; Северский р-н, верховья р. Убин, юж. скл. хр. Папай, 750 м н.у.м., степные ассоциации в можжевеловом

редколесье, на свет ДРВ, 8.07.2000, 1♂ [12].

В Краснодарском крае личинки предположительно этого вида были собраны в почве на склонах хребта Маркотх между Новороссийском и Геленджиком, а также в Челбасском лесничестве [Гиляров, 1962]. Имаго были найдены в Дагестане (Дербент) [Захаренко, 1988] и Ставропольском крае (без указания конкретного места) [Кривохатский, 2007ж]. Изучение гениталий самца, собранного в популяции, обитающей на хребте Маркотх, подтвердило его принадлежность к *Dilar turcicus*. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [Кривохатский, 2007ж].

Семейство Mantispidae

Mantispa aphavexelte U. Aspöck et H. Aspöck, 1994

Материал. *Краснодарский кр.: Северский р-н, окр. ст. Убинская, г. Собер-Оаш, 700 м н.у.м., средиземноморская разнотравно-злаковая степь, на опушке дубово-грабинникового леса, на свет ДРВ, 25.07.2008, 1♀ [14].

Систематика многих палеарктических видов рода *Mantispa* Illiger, 1798 крайне запутана из-за большой изменчивости окраски тела. По этой причине до проведения ревизии рода этот вид трактуется как в работе [U. Aspöck, H. Aspöck, 1994a], в которой *M. aphavexelte*, *M. adelungi* Navás, 1912, описанный из Армении, и *M. lobata* Navás, 1912, описанный из Забайкалья, рассматриваются как самостоятельные виды. Изученный экземпляр имеет типичную для *M. aphavexelte* окраску. В России *M. aphavexelte* указывался для Волгоградской области и Калмыкии [Рохлецов, Кривохатский, 2006]. Указание *Mantispa icterica* Pictet, 1865 для равнинной Чечни (станица Старогладковская) [Abrahám, 2000], относится к *M. aphavexelte*, судя по ссылке на работу [Abrahám, Papp, 1994], в которой даны рисунки *M. icterica*, не отличающиеся от *M. aphavexelte*. Указания *M. lobata* в работе Захаренко [1987] для юга европейской части России и Северного (низкогорного) Кавказа, Казахстана и Туркменистана относятся, видимо, к *M. aphavexelte*, тогда как указания *M. lobata* для Закавказья требуют подтверждения, поскольку автор рассматривал *M. adelungi* как его синоним.

Mantispa styriaca (Poda, 1761)

Материал. *Краснодарский кр.: Анапский р-н, п-ов Абрау, г. Лысая, 300 м н.у.м., выше с. Варваровка, средиземноморская степь на опушке грабинниково-палиурсового шиляка, на свет ДРВ, 22.06.1999, 1♂ [6]; Анапский р-н, окр. пос. Чембурука, степь с лохом узколистным на окраине тростниковых плавней оз. Чембурукского, 27.05.2004, 1♂ [5]; Абинский р-н, хр. Грузинка, юж. скл. г. Шизе, 520 м н.у.м., средиземноморская степь на опушке скальнодубового леса, на свет ДРВ, 22.06.2004, 1♀ [10]; Новороссийск, окр. пос. Верхнебаканский, водораздел Главного Кавказского хр. (ГКХ), 490 м н.у.м., средиземноморская степь на опушке дубово-ясеневого леса, на свет ДРВ, 27.06.2004, 1♂; там же, 25.06.2009, 2♂, 2♀ [8].

На Кавказе ранее был известен только из равнинной Чечни (Воскресенское) [Abrahám, 2000]. Ареал вида включает почти всю южную Палеарктику, от Южной Швеции и Марокко до Южного Приморья.

Семейство Chrysopidae

Italochrysa italica (Rossi, 1790)

Материал. *Краснодарский кр.: Геленджик, окр. х. Бетта, 80 м н.у.м., пущистодубово-грабинниковый лес с участием сосновы обыкновенной, на свет ДРВ, 19.07.1996, 4♀ [13].

Новый для России вид, который ранее указывался для «Кавказа» [Дорохова, 1979, 1987; Захаренко, 1986]. Распространен в Южной и частично Центральной Европе (на севере до Швейцарии и Польши), Египте, Турции, Закавказье, на Ближнем Востоке, в Ираке, Туркменистане и Таджикистане. Ближайшие известные находки на Кавказе и в Закавказье: Бакуриани (Грузия) [Navás, 1914] и три района Азербайджана (Закаталы, Варташен и Ашхерон) [Курбанов, 1972]. В отличие от личинок других златоглазок, питающихся в основном тлями, личинки этого вида связаны с муравьями. В Италии они живут только в гнездах *Crematogaster scutellaris* (Olivier, 1792) на деревьях и питаются их личинками [Principi, 1946]; предпочитают теплые сухие местообитания с кустарниковой растительностью и деревьями дуба и гикори на высотах не выше 1000 м н.у.м. [Nicolai Aldini, 1998]. В Испании *I. italica* чаще всего встречается в дубовых лесах на *Quercus rotundifolia* и *Ceratonia siliqua* [Monserrat, Marin, 1994]; там же муравьи *C. scutellaris* также предпочитают деревья дуба [Casevitz-Weulersse, 1972], так что поимка этих златоглазок в дубовом низкогорном приморском лесу не случайна. В дубовых лесах Словении, однако, вид не был найден [Devetak, 2002].

Предлагалось включить *I. italica* в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в следующее издание Красной книги СССР, которое не состоялось по известных причинам [Захаренко, 1990]. В Красной книге Краснодарского края [2007] эта златоглазка отнесена к таксонам, требующим особого внимания к их состоянию в природной среде края как малоизвестный и редкий в регионе вид. За годы поисков этого вида в подобных биотопах, минувшие с первой находки вида, он больше не был встречен, хотя в данном месте не казался редким, поскольку за 2 часа лова на свет было привлечено около 20 особей. Не исключено, что массовый лёт этой златоглазки наблюдался непосредственно после появления имаго, поскольку изученные экземпляры являются еще сравнительно бледноокрашенными.

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)

Материал. Краснодарский кр.: Горячий Ключ, окр. ст. Саратовская, дубовый лес, 20.06.1996, 1♀ [17].

Широко распространенный палеарктический вид. На Северном Кавказе ранее отмечался в Краснодарском и Ставропольском краях (без указания местонахождений) [Захаренко, Кривохатский, 1993] и в равнинной и горной Ингушетии (станица Троицкая, Торгим, Фуртоуг, перевал Школьный) и Чечне (Харанхой, Итум-Кале, Кериго, Воскресенское) [Abrahám, 2000].

Chrysopa formosa Brauer, 1851

Материал. *Краснодарский кр.: Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С. ст. Кисляковская, степь, на свет ДРВ, 3.10.2009, 1♀ [18].

Широко распространенный транспалеарктический вид. На Северном Кавказе был отмечен (без указания местонахождений) в Ставропольском крае и Дагестане [Захаренко, Кривохатский, 1993], Ингушетии (Фуртоуг, станица Троицкая) и Чечне (станица Старогладковская, Воскресенское, Итум-Кале) [Abrahám, 2000].

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836), s.l.

Материал. Краснодарский кр.: Анапский р-н, п-ов Абрау, г. Лысая, 150 м н.у.м., окр. пос. Су-Псех, средиземноморская степь, на свет ДРВ, 20.09.2006, 1♀ [6]; Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С ст. Кисляковская, степь, на свет ДРВ, 3.10.2009, 1♂, 2♀ [18].

Из четырех европейских близкородственных видов, образующих группу *Chrysoperla carnea* и различающихся главным образом по характерной «песне» (низкочастотной вибрации брюшка при контакте с субстратом) и очень плохо морфологически, в России пока найден только один, *Chrysoperla carnea*, s. str. [Макаркин, Ручин, 2010]. Он, по-видимому, широко распространен в Палеарктике, на востоке доходит до берегов Тихого океана, но не проникает на острова Дальнего Востока (в том числе японские). Однако на Северном Кавказе вполне возможно обитание и двух других видов, *Chrysoperla pallida* Henry et al., 2002 (=*Ch. carnea* sensu Canard et Thierry, 2005 (nec Stephens, 1836)) и *Chrysoperla lucasina* (Lacroix, 1912). Эти виды отмечены в Венгрии и Румынии, но пока не известны восточнее этих стран [Thierry et al., 1996; Henry et al., 2002]. Имеющийся у нас материал недостаточен для более точного определения вида.

В Краснодарском крае, как и в других регионах страны, *Chrysoperla carnea* (s.l.) обычен в агроценозах; вид, например, встречается на пшеничных полях Славянского района [Буров и др., 1974].

Dichochrysa sp.

Материал. Краснодарский кр.: Геленджик, юж. отрог ГКХ, г. Шахан, 690 м н.у.м., на свет ДРВ и вечерний лёт, 12.09.2009, 1♀ [11]; Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С ст. Кисляковская, степь, на свет ДРВ, 3.10.2009, 1♀ [18].

Обе самки очень похожи по окраске тела и крыльев на *Dichochrysa prasina* (Burmeister, 1839), но у них отсутствует пятно между усиками, характерное для вида. Необходимо изучение самцов, имеющих эти признаки, для более надежного определения вида. *D. prasina* отмечен в Краснодарском крае (без указания местонахождений) как *Chrysopa ventralis prasina* [Суздалская, 1956] и *Mallada prasinus* [Захаренко, Кривохатский, 1993].

Семейство Hemerobiidae

Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758

Материал. *Краснодарский кр.: Анапский р-н, п-ов Абрау, г. Лысая, 300 м н.у.м., выше с. Варваровка, степь, на свет ДРВ, 14.04.2000, 1♀ [6]; Мостовской р-н, Кавказский запов., дол. р. Уруштен, устье р. Аспидная, 1470 м н.у.м., оステненный луг на опушке буково-пихтового леса, на свет на свет «Petromax», 14.07.2004, 1♀ [25]; Новороссийск, окр. пос. Верхнебаканский, ГКХ, 490 м н.у.м., гемитермная степь, на свет ДРВ, 25.06.2009, 1♂ [8].

Широкораспространенный голарктический вид. На Северном Кавказе известен также из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Дагестана (без указания местонахождений), Чечни (Харанхой, Итум-Кале, Кериго, Кезеной-Ам) и Ингушетии (Торгим, Ольгети, Фуртоуг, Фортанга, станица Троицкая) [Захаренко, Кривохатский, 1993; Abrahám, 2000].

Hemerobius lutescens Fabricius, 1793

Материал. *Краснодарский кр.: Туапсинский р-н, верх. р. Псекупс,

ГКХ, юж. скл. г. Лысая, 900 м н.у.м., оステненный луг в дубово-буковом лесу, на свет ДРВ, 5.06.1999, 1♂ [19].

Вид распространен в Европе, Закавказье (Армения), Турции. Указывался для Монголии [Steinmann, 1965], но изучение материала показало, что все экземпляры относятся к *Hemerobius poppii* Esben-Petersen, 1921 (D. Sziráki, личное сообщение). На Северном Кавказе известен также из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Дагестана (без указания местонахождений), горной Чечни (Харанхой) и горной Ингушетии (Торгим, Ольгети, Фуртоуг, перевал Школьный) [Захаренко, Кривохатский, 1993; Abrahám, 2000].

Hemerobius contumax Tjeder, 1932

Материал. *Краснодарский кр.: Мостовской р-н, Кавказский запов., дол. р. Уруштен, устье р. Аспидная, 1470 м н.у.м., оステненный луг на опушке буково-пихтового леса, на свет «Petromax», 14.07.2004, 1♂ [25].

Новый для России вид, достаточно широко распространенный в Европе и известный из Турции (Анатолия). Самое восточное известное местонахождение вида в Европе – Ивано-Франковской области Украины [Dobosz, 1991]. Его кавказская популяция является, видимо, изолированной.

Hemerobius handschini Tjeder, 1957

Материал. *Краснодарский кр.: Анапский р-н, п-ов Абрау, г. Лысая, 150 м н.у.м., окр. пос. Су-Псех, средиземноморская степь на опушке грабинникового шибляка, на свет ДРВ, 20.09.2006, 3♀ [6].

Распространен в Южной и Центральной Европе, Турции и Корее [Aspöck et al., 1980; Monserrat, 2000]. В России был известен только из горной Ингушетии (Торгим) [Abrahám, 2000].

Wesmaelius malladai (Navás, 1925)

Материал. *Краснодарский кр.: Мостовской р-н, Кавказский запов., верх. р. Цахвоа, ур. Балка Воровская, сев. скл. пер. Крутой, слабозадерненная осыпь, днем на цветущей манжетке (*Alchemilla* sp.), 2490 м н.у.м., 19.07.2007, 1♀ [29]. *Карачаево-Черкесия: Кавказский запов., дол. р. Имеретинка, 2050 м н.у.м., скальные полки в субальпийской зоне, злаково-разнотравные луга на полках в поясе бересклетового криволесья, на свет «Petromax», 12.07.2005, 1♀; там же, 15.08.2009, 2♂ [31].

На западе Палеарктике этот вид имеет арктоальпийское распространение. Он встречается в Северной Европе (в том числе в России – в Мурманской области и Республике Коми), в горах Центральной и Южной Европы, на северо-востоке Турции, в Армении (гора Яглудара), на юго-западе Алтая (Восточно-Казахстанская область Казахстана: Урунхайка) и в Бурятии [Дубатолов, 1998; Aspöck et al., 1980; Поров, 1986; Makarkin, 1996]. На Кавказе ранее был известен из Северной Осетии [Makarkin, 1996], горной Ингушетии (Фуртоунг, Торгим, Ольгети) и Чечни (Кезеной-Ам) [Abrahám, 2000]. Приведенный материал показывает, что *W. malladai*, по-видимому, достаточно обычен в альпийско-субальпийской зоне Кавказского заповедника. В Бурятии единственный известный экземпляр был собран на железнодорожной насыпи, покрытой полынным разнотравьем среди низинного смешанного леса, в нескольких километрах от восточного берега озера Байкал [Макаркин, 1987].

Wesmaelius nervosus (Fabricius, 1793)

Материал. *Краснодарский кр.: Апшеронский р-н, хр. Азиш-Тай, 1400 м н.у.м., на свет ДРВ, смешанный лес, 11.08.2006, 1♀ [23]; Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С ст. Кисляковская, степь, на свет ДРВ, 6.06.2009, 1♀ [18]. *Адыгея: плато Лагонаки, южнее пер. Азишский, 1700 м н.у.м., субальпийский луг в поясе березового криволесья с сосновой крючковатой, на свет ДРВ, 23.05.2004, 1♀ [23].

Широко распространенный бореальный голарктический вид. На Северном Кавказе был известен из Ставропольского края, Чечни и Дагестана (без указания местонахождений) и горной Ингушетии (Торгим, Ольгети, Фуртоуг, перевал Школьный) [Захаренко, Кривохатский, 1993; Makarkin, 1996; Abrahám, 2000]. Все изученные экземпляры отличаются очень темной окраской (черный рисунок на крыльях и теле) в сравнении с более северными и восточными.

Megalomus tortricoides Rambur, 1842

Материал. *Карачаево-Черкесия: Кавказский запов., дол. р. Имеретинка, 2050 м н.у.м., злаково-разнотравный луг на скальных полках в поясе березового криволесья, на свет «Petromax», 15.08.2009, 1♂ [31].

Распространен в Южной и Центральной Европе, Закавказье и Турции. В России известен только на Северном Кавказе, в горный районах: в Северной Осетии (Верхний Садон), Ингушетии (Торгим, Фуртоуг, перевал Школьный), Чечне (Харанхой, Итум-Кале, Кериго) и Дагестане (Гуниб) [Макаркин, 1986; Abrahám, 2000]. В горах Южной Европы доходит до высоты 2000 м н.у.м. [Aspöck et al., 1980].

Micromus variegatus (Fabricius, 1793)

Материал. Краснодарский кр.: Геленджик, юж. отрог ГКХ, г. Шахан, 690 м н.у.м., на свет ДРВ и вечерний лёт, 12.09.2009, 1♀ [11].

Палеарктический вид, но на территории большей части Сибири (в том числе южной) отсутствует. На Северном Кавказе широко распространен, отмечен в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии (без указания местонахождений), Карачаево-Черкесии (станица Красногорская), Ингушетии (Фуртоунг, Итум-Кале) и Чечне (станица Старогладковская) и Дагестане (Гуниб, Дербент) [Макаркин, 1985а; Захаренко, Кривохатский, 1993; Abrahám, 2000].

Micromus paganus (Linnaeus, 1767)

Материал. *Краснодарский кр.: Сочи, окр. пос. Красная Поляна, дол. р. Мзымта, юж. скл. хр. Аибга, 1800 м н.у.м., пихтово-буковый лес, на свет ДРВ, 18.08.1996, 1♀ [27]; Мостовской р-н, Кавказский запов., дол. р. Малая Лаба, хр. Снеговалка, ур. Вал, 1840 м н.у.м., субальпийский разнотравно-злаковый луг, на свет «Petromax», 7.07.2008, 1♀ [30]. *Адыгея: Кавказский запов., дол. р. Кшиша, ур. Сенная Поляна, 1300 м н.у.м., на свет «Petromax», 12.07.2004, 1♀ [24].

Транспалеарктический бореальный вид. На Северном Кавказе известен из Ставропольского края и Чечни (без указания местонахождений), горной Ингушетии (Торгим, Ольгети, Фуртоуг, перевал Школьный) и Дагестана (Гуниб) [Макаркин, 1985а; Захаренко, Кривохатский, 1993; Abrahám, 2000].

Micromus angulatus (Stephens, 1836)

Материал. *Краснодарский кр.: Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С ст. Кисляковская, степь, на свет ДРВ, 3.10.2009, 1♀ [18].

Широко распространенный бореальный голарктический вид, обитающий главным образом в травяной ярусе. На Северном Кавказе известен из Ставропольского края и Дагестана (без указания местонахождений), горной Ингушетии (Ольгети, Фуртоуг, Фортанга) и равнинной Чечни (станица Старогладковская) [Захаренко, Кривохатский, 1993; Abrahám, 2000].

Семейство Myrmeleontidae*Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767

Материал. Краснодарский кр.: Мостовской р-н, Кавказский запов., дол. р. Уруштен ниже устья р. Аспидная, 1470 м н.у.м., о stepennyyi aag в поясе пихтово-букового леса, на свет «Petromax», 14.07.2004, 1♀ [25]; Кавказский запов., дол. р. Малая Лаба, устье р. Безымянка, 1470 м н.у.м., сосновый лес, на свет «Petromax», 12.07.2008, 1♀ [28]; Новороссийск, окр. пос. Верхнебаканский, водораздел ГКХ, 490 м н.у.м., гемитермная степь, на свет ДРВ, 25.06.2009, 2♀ [8].

Широко распространенный палеарктический вид. На Северном Кавказе был указан без конкретных местонахождений из Краснодарского и Ставропольского краев и Кабардино-Балкарии [Захаренко, Кривохатский, 1993].

Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842

Материал. *Краснодарский кр.: Краснодар, х. Ленина, плодовый сад, на свет ДРВ, 14.07.1996, 1♀ [16]; Темрюкский р-н, 12 км С Тёмрюк, Темрюкского залива Азовского моря, коса Вербянная, личинки собраны 06.2008, имаго вышли до 15.07.2008, 1♂, 2♀; там же, личинки 2.08.2008, имаго около 5.07.2009, 1♂, 1♀ [3].

Ареал вида включает Марокко, Южную и Центральную Европу и Южную Азию на восток до Узбекистана. В России распространен в южных регионах европейской части [Захаренко, Кривохатский, 1993; Рохлецова, Кривохатский, 2006]. На Северо-Западном Кавказе раньше не был известен; указывался только для равнинной Чечни (Воскресенское) [Abrahám, 2000].

Личинки встречаются в воронках на песчано-ракушечных буграх косы Вербянная (см. материал), поросших полынью приморской и лохом восточным.

Myrmeaelurus trigrammus (Pallas, 1771)

Материал. Краснодарский кр.: Темрюкский р-н, Таманский п-ов, высокий бер. Темрюкского залива Азовского моря, окр. пос. Ильич, степь, всплеснуты днем в полынно-злаковых ассоциациях, 26.07.2009, 8♀ [1]; Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С ст. Кисляковская, степь на надпойменной террасе, вечерний лёт, 5.08.2009, 1♀ [18]. Калмыкия: окр. пос. Яшкуль, полынная степь, на свет ДРА, 22.06.1988, 1 экз.

Вид распространен в Южной (редко в Центральной) Европе и Южной Азии, от Франции на западе до Киргизстана на востоке. В России встречается в южных регионах европейской части (до Оренбургской области на востоке) и на Северном Кавказе, где отмечен в Ставропольском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Дагестане (без указания местонахождений) [Захаренко, Кривохатский, 1993; Рохлецова, Кривохатский, 2006].

В Краснодарском крае местами обычен. Живые особи в период лёта имеют специфический слабый мускусный запах, хорошо различимый в момент поимки.

Synclisis baetica (Rambur, 1842)

Материал. Краснодарский кр.: Таманский п-ов, г. Лысая, бер.

лимана Цокур, pontийская разнотравно-злаковая степь на окраине галофитных ассоциаций, на свет ДРВ, 21.08.1999, 5♀ [2].

Средиземноморский вид, распространенный на восток до Ирана. В России известен только из Краснодарского края, где был отмечен в прибрежных биотопах лиманов Таманского полуострова у подножий сопок Лысая и Макотра [Щуров, 2001; Щуров и др., 2004; Кривохатский, 2007в]. Включен в Красную книгу Краснодарского края. Несмотря на неоднократные попытки собрать этот вид (2002, 2003, 2006 годы) в этом и других сходных биотопах Краснодарского края, он больше не был встречен.

Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Материал. Краснодарский кр.: Краснодар, микрорайон Гидростроителей, в паутине в подъезде дома, 9.07.2009, 1♀ [15]; Геленджик, юж. отрог ГКХ, г. Шахан, 690 м н.у.м., на свет ДРВ, вечерний лёт, 12.09.2009, 2♀ [11].

Вид распространен в Европе, Марокко, Турции и Закавказье. В России встречается преимущественно в равнинных и среднегорных районах на юге европейской части и Северном Кавказе. Отмечен в Краснодарском крае (Геленджик, станица Чамлыкская), Ставропольском крае (Кисловодск, Пятигорск, станица Новомарьевская), Кабардино-Балкарии (Эгочкал, Старый Аарс) и Дагестане (Карабудах-Кенд, Гуниб, Унцукуль) [Кривохатский, Захаренко, 1994].

12 сентября 2009 (см. материал) львы не летели на лампу, а были собраны поздним вечером в горной степи в свете фонаря. Имаго сидели на почве под нависающими пластами мергеля (поблизости от личиночных воронок) и на ветвях терновника.

Megistopodus flavicornis (Rossi, 1790)

Материал. *Краснодарский кр.: Краснодар, пойма в ур. Старая Кубань, 14.06.1990, днем на остеиненном лугу, 1 экз. [15]; Северский р-н, дол. р. Убин, 240 м н.у.м., пионерский лагерь «Дубрава», на свет ДРЛ, 9.06.1996, 1♀ [14]; Анапский р-н, п-ов Абрау, окр. пос. Малый Утриш, биостанция МГУ, на свет в помещении, 17.06.2008, 1♀ [7]; Новороссийск, пос. Верхнебаканский, контора лесничества, на окне в паутине, 8.10.2009, 1 поврежденный экз. [8].

Вид распространен в Южной и Центральной Европе, Марокко, Южной Азии на восток до Туркменистана. В России отмечен в некоторых регионах юга европейской части [Рохлецова, Кривохатский, 2006] и на Северном Кавказе, на равнинах и низкогорьях. Был известен из Дагестана (без указания местонахождений) и равнинной Чечни (станица Старогладковская, Воскресенское) [Захаренко, Кривохатский, 1993; Abrahám, 2000].

Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)

Материал. *Краснодарский кр.: Северский р-н, верховья р. Убин, хр. Папай, 800 м н.у.м., средиземноморская степь, днем, 13.08.1990, 1 экз. [12]; Сочи, окр. пос. Лоо, 350 м н.у.м., скально-дубовый лес, на свет ДРВ, 11.08.1996, 1♀; там же, 31.07.1997, 1♀ [22]; Анапа, п-ов Абрау, г. Лысая, 150 м н.у.м., окр. пос. Су-Псех, средиземноморская степь, на свет ДРВ, 7.07.1999, 1♀; там же, на свет ДРВ, 20.06.2007, 1♀ [6]; Кущевский р-н, дол. р. Ея, 2 км С ст. Кисляковская, степь на надпойменной террасе, вечерний лёт, 5–6.08.2009, 3♂, 5♀ [18].

Вид распространен в Европе (на север до Польши), Марокко, в Азии от Турции и Израиля до западного Казахстана. В России встречается в южных регионах европейской части на восток до Оренбургской области. На Северном Кавказе известен из Дагестана

[Захаренко, Кривохатский, 1993] и равнинной Чечни (станица Старогладковская) [Abrahám, 2000].

В Краснодарском крае местами обычен. Одна из самок была собрана руками ночью 5 августа 2009 (см. материал) в процессе воздушной охоты на совку *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775), привлеченную запахом пищевой приманки для Lepidoptera. В момент поимки она держала бабочку в лапках и усердно пережевывала. Живые особи имеют специфический мускусный запах, хорошо различимый в сачке после поимки.

Creoleon plumbeus (Olivier, 1811)

Материал. *Краснодарский кр.: Анапский р-н, окр. пос. Витязево, коса Благовещенская, песчаные дюны с зарослями полыни, колосняка и лоха восточного, на свет ДРВ, 31.08.2007, 1♂, 3♀ [4]; Темрюкский р-н, 12 км С Темрюка, бер. Темрюкского залива Азовского моря, коса Вербяная, псаммофитная колосняко-полынная степь с зарослями лоха восточного, на свет ДРВ, 25.07.2009, 4♂, 2♀ [3].

Южный западно-палеарктический вид, распространенный на север до Польши и на восток до Таджикистана и Афганистана. В России встречается на юге европейской части (от Калмыкии до Оренбургской области) и на Северном Кавказе в Дагестане (без указания местонахождений) [Захаренко, Кривохатский, 1993].

25 июля 2009 (см. материал) наблюдался массовый лёт этого вида поздним вечером (с 20.30 до 21.30 часов) над куртинами полыни приморской. Самцы зависали в воздухе с опущенным вниз брюшком на высоте 1–1.5 м над растительностью. Живые особи в момент лёта приятно пахнут мускусом.

Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787)

Материал. Краснодарский кр.: Сочи, окр. пос. Лоо (Верхняя Хобза), в паутине на окне дачного домика, 17.08.1990, 1 экз. [22].

Дачный поселок граничит с участком старого дубового леса, изобилующего дуплистыми деревьями, в дуплах которых развиваются личинки этого вида.

Распространен в неморальной зоне Центральной Европы, на Черноморском побережье, в Азербайджане [Кривохатский, 2007а]. В России пока известен только из Краснодарского края (Бетта, Красная Поляна, Аше, Лоо, Сочи) [Щуров, 2001; Кривохатский, 2007а] и Дагестана (поселок Белиджи). Включен в Красную книгу Краснодарского края [Кривохатский, 2007а]. Редкий, спорадически встречающийся в регионе вид.

Семейство Ascalaphidae

Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)

Материал. Краснодарский кр.: Темрюкский р-н, Таманский п-ов, высокий бер. Темрюкского залива Азовского моря между пос. Ильич и Приазовский, 13.06.2009, 1♀ [1].

13 июня 2009 днем наблюдался массовый лёт в степных балках с зарослями боярышника.

Вид распространен в Южной и Центральной Европе, Южной Азии до западного Китая. В России встречается на юге европейской части до Челябинской области на востоке, на Алтае и на Северном Кавказе, где отмечен в Краснодарском крае, Адыгее (скорее всего, ошибочно), Ставропольском крае, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане [Щуров и др., 2004; Кривохатский, 2007г;

Abrahám, 2000]. Включен в Красную книгу Республики Адыгея [Черпаков, 2000а] и Краснодарского края [Кривохатский, 2007г], где известен только с останцев целинных степей Таманского полуострова (сопки Лысая, Поливадина, Макотра, урочище Яхно, берега лиманов Кизилташский, Цокур, Бугазский). Распространение вида в Кавказском заповеднике [Акатов и др., 1990] и в Адыгее вообще требует подтверждения; скорее всего, за этот вид был ошибочно принят *L. hispanicus ustulatus* (Eversmann, 1850), относительно обычный в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, занятых Кавказским заповедником.

Libelloides hispanicus ustulatus (Eversmann, 1850)

Материал. Краснодарский кр.: Апшеронский р-н, юж. скл. плато Черногорье, 1300 м н.у.м., дорога в буково-пихтовом лесу между истоком р. Серебрячка и дол. р. Пшеха, 9.05.1996, 2♀ [21]; Геленджик, водораздел хр. Маркотх, средиземноморская степь, 450 м н.у.м., день, 23.05.2001, 1♀; там же, 28.05.2008, 3♂, 2♀ [9]; Абинский р-н, хр. Грузинка, г. Шизе, 500 м н.у.м., 29.05.2005, 2♀ [10]; Карабаево-Черкесия: Кавказский запов., дол. р. Имеретинка, скальные полки отрогов ЮВ экспозиции в поясе субальпийских лугов и березового криволесья, 2000–2100 м н.у.м., 15.08.2009, 1♀ [31].

Вид имеет дизъюнктивный ареал: он распространен на Иберийском полуострове (*L. hispanicus hispanicus* (Rambur, 1842)) и на Кавказе, в Закавказье и Турции (*L. hispanicus ustulatus*) [Aistleitner, 1980; U.Aspöck, H.Aspöck, 1994b; Кривохатский, 2007д]. Однако в других работах *L. ustulatus* рассматривается как самостоятельный вид [Шуров, 2001; Sziráki, 1998; Canbulat, 2007].

На Северном Кавказе *L. hispanicus ustulatus* встречается в Краснодарском крае, Адыгее, Карабаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане [Кожанчиков, 1958; Акатов и др., 1990; Шуров, 2001; Кривохатский, 2007д]. Ареал вида в Краснодарском крае включает горные зоны Абинского, Северского, Горячеключевского, Апшеронского, Туапсинского районов, земли городов Новороссийск и Геленджик [Кривохатский, 2007д]. Включен в Красную книгу Краснодарского края [Кривохатский, 2007д] и Республики Адыгея [Черпаков, 2000б].

Благодарности

Мы выражаем искреннюю признательность Х. Ашпёк и У. Ашпёк (H. Aspöck, U. Aspöck; Вена, Австрия), Д. Сираки (G. Sziráki; Будапешт, Венгрия) и А. Летарди (A. Letardi; Рим, Италия) за ценную информацию и литературу.

Литература

- Акатов В.В., Голгофская К.Ю., Горчарук А.Г., Дуров В.В., Кипиани В.В., Кудактин В.В., Немцев А.С., Придня М.В., Тильба П.А., Топилина В.Г. 1990. Кавказский заповедник // Заповедники СССР. Заповедники Кавказа. М.: Мысль: 69–100.
- Буров В.Н., Заева И.П., Титова Э.В. 1974. Выявление трофических связей хищных членистоногих с вредной черепашкой с помощью серологического и радиоизотопного методов // Чтения памяти Н.А. Холодковского. Доклады на 26 чтениях памяти Н.А. Холодковского 6 апреля 1973 г. Л.: Наука: 69–81.
- Гиляров М.С. 1962. Личинка *Dilar turcicus* Hag. и положение семейства Dilaridae в отряде сетчатокрылых (Planiprenia) // Энтомол. обозр. 41(2): 402–416.
- Дорохова Г.И. 1979. Златоглазки сем. Chrysopidae (Neuroptera) фауны СССР // Энтомол. обозр. 58(1): 105–111.
- Дорохова Г.И. 1987. Отряд Neuroptera – сетчатокрылые // Определитель насекомых европейской части СССР. Л.: Наука. Т. 4. Ч. 6: 36–73.
- Дубатолов В.В. 1998. Обзор сетчатокрылообразных (Insecta, Neuropteroidea: Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) Западной Сибири // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Материалы Всероссийской конференции, Курган, 14–16 апреля 1988 года. Курган: изд-во Курганского ун-та: 113–123.
- Захаренко А.В. 1986. К фауне сетчатокрылых (Neuroptera) Кавказа // 1-я Закавказская конференция по энтомологии, Ереван, 17–19 ноября 1986 г. Тезисы докладов. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР: 85–86.
- Захаренко А.В. 1987. Сетчатокрылые (Neuroptera) фауны СССР. I. Сем. Mantispidae // Энтомол. обозр. 66(3): 621–626.
- Захаренко А.В. 1988. Сетчатокрылые (Neuroptera) фауны СССР. II. Сем. Dilaridae, Berothidae и Sisyridae // Энтомол. обозр. 67(4): 763–768.
- Захаренко А.В. 1989. Новые для фауны СССР виды сетчатокрылых (Neuroptera) семейств Coniopterygidae и Hemerobiidae // Вестн. зоол. 2: 87.
- Захаренко А.В. 1990. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды сетчатокрылых (Insecta, Neuroptera) фауны СССР // Вестн. зоол. 4: 70–72.
- Захаренко А.В., Кривохатский В.А. 1993. Сетчатокрылые (Neuroptera) европейской части бывшего СССР // Изв. Харьковского энтомол. общества. 1(2): 34–83.
- Канонников А.М. 1977. Природа Кубани и Причерноморья. Краснодар: Кн. изд-во, 112 с.
- Кожанчиков И.В. 1951. Новые азиатские виды Osmylidae (Neuroptera) // Энтомол. обозр. 31(3–4): 523–528.
- Кожанчиков И.В. 1958. Сетчатокрылые – Neuroptera // Животный мир СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. 5: 378–384.
- Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр развития ПТР Краснодарского края. 2007. 480 с.
- Кривохатский В.А. 1995. Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института РАН. Насекомые сетчатокрылые (Neuroptera). СПб: Зоол. ин-т. 18 с.
- Кривохатский В.А. 2007а. 38. Древесный лев пантеровидный. *Dendroleon pantherinus* (Fabricius, 1787) // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 109–110.
- Кривохатский В.А. 2007б. 39. Кривошпор западный. *Acanthalcis occitanica* (Villers, 1789) // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 110–111.
- Кривохатский В.А. 2007в. 40. Шпорник бэтийский. *Synclisis baetica* (Rambur, 1842) // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 111–112.
- Кривохатский В.А. 2007г. 41. Бабочник золотоволосый (аскалаф пестрый). *Libelloides macaronius* Scopoli, 1763 // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 112–113.
- Кривохатский В.А. 2007д. 42. Бабочник опаленный. *Libelloides hispanicus* (Rambur, 1842) // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 113–114.
- Кривохатский В.А. 2007е. 43. Пахучник элегантный. *Osmylus elegantissimus* Kozhanchikov, 1951 // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 114–116.
- Кривохатский В.А. 2007ж. 44. Диляр (диляр) турецкий. *Dilar turcicus* Hagen, 1858 // Красная книга Краснодарского края. Животные. Изд. 2-е. Краснодар: Центр разв. ПТР Краснодар. кр.: 116.
- Кривохатский В.А., Захаренко А.В. 1994. Муравьиные львы родов *Euroleon* Esben-Petersen, 1918 и *Kirghizoleon* gen. n. (Neuroptera, Mymeleontidae) Палеарктики // Энтомол. обозр. 73(3): 690–699.
- Курбанов Г.Г. 1972. К изучению златоглазок Большого Кавказа в пределах Азербайджана // Изв. АН Азер. ССР. Серия биол. наук. 3: 93–98.
- Литвинская С.А. 1994. Геоботаническая характеристика степей Северо-Западного Кавказа // Актуальные вопросы экологии и охраны природы степных экосистем и сопредельных территорий. Международная научно-практическая конференция, Краснодар, 1994. Краснодар: КубГУ: 50–55.
- Макаркин В.Н. 1985а. Обзор сетчатокрылых сем. Hemerobiidae (Neuroptera) фауны СССР. I. Роды *Hemerobius* L., *Micromus* Ramb. и *Paramicromus* Nakah. // Энтомол. обозр. 64(1): 158–170.
- Макаркин В.Н. 1985б. Обзор семейства Osmylidae (Neuroptera) фауны СССР // Таксономия и экология членистоногих Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР: 35–47.
- Макаркин В.Н. 1986. Обзор сетчатокрылых сем. Hemerobiidae (Neuroptera) фауны СССР. 2. Роды *Wesmaelius* Krüger, *Symplochoides* Banks, *Psectra* Hagen, *Megalomus* Ramb., *Neuronema* McL. и *Drepanopteryx* Leach // Энтомол. обозр. 65(3): 604–617.

- Макаркин В.Н. 1987. Сетчатокрылые (Neuroptera) Забайкалья // Таксономия насекомых Сибири и Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР: 72–77.
- Макаркин В.Н., Ручин А.Б. 2010. Материалы по фауне златоглазок (Neuroptera, Chrysopidae) Мордовии // Вестник Мордовского университета. (В печати).
- Рохлецова А.Б., Кривохатский В.А. 2006. К познанию фауны Волго-Уральских сетчатокрылых (Neuroptera) // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Вып. 5. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та: 23–31.
- Суздалевская М.В. 1956. О связях личинок златоглазки (*Chrysopa ventralis* Curt., spp. *prasinata* Burm.) с грибами белой мускардины // Зоол. журн. 35(10): 1585–1586.
- Чернаков В.В. 2000а. Аскалаф пестрый // Красная книга Республики Адыгея. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира. Майкоп: Минприроды Респ. Адыгея: 181.
- Чернаков В.В. 2000б. Аскалаф опаленный // Красная книга Республики Адыгея. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира. Майкоп: Минприроды Респ. Адыгея: 182.
- Щуров В.И. 2001. Дополнения к списку видов насекомых в Красной книге Краснодарского края // Человек и ноосфера. Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 2001. Ч. 1. Краснодар: КГУ-Универсис: 31–36.
- Щуров В.И. 2005. Характеристика населения чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) Северо-Западного Кавказа. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Краснодар: КубГАУ. 24 с.
- Щуров В.И., Замотайлов А.С., Кустов С.Ю. 2004. О некоторых редких видах насекомых (Insecta) Таманской степи и проблемы их охраны // Экологические проблемы Таманского полуострова. Краснодар: КубГУ: 193–208.
- Abrahám L. 2000. The lacewings fauna of the Checheno-Ingushetia in the Caucasian region (Neuroptera) // Som. Múz. Közl. 14: 285–296.
- Abrahám L., Papp Z. 1994. Mantispids species in the Hungarian fauna with some taxonomical remarks (Neuroptera: Mantispidae) // Fol. Hist.-Natur. Mus. Matraensis. 19: 69–75.
- Aistleitner E. 1980. Die Arten des Genus *Libelloides* Tjeder, 1972, der Iberischen Halbinsel (Neuroptera, Planipennia, Ascalaphidae). Taxonomie, Arealkunde, Phaenologie, Habitatwahl // Entomofauna. 1(4): 234–297.
- Aspöck H., Aspöck U., Höglzel H. 1980. Die Neuropteren Europas. Krefeld: Goecke und Evers. Vol. 1, 495 p. Vol. 2, 355 p.
- Aspöck U., Aspöck H. 1994a. Zur Nomenklatur der Mantispiden Europas (Insecta: Neuroptera: Mantispidae) // Ann. Naturhist. Mus. Wien. 96B: 99–114.
- Aspöck U., Aspöck H. 1994b. Paradoxe Verbreitungsbilder von Neuropteroidea (Insecta: Raphidioptera, Neuroptera) // Zeit. Arbeitsgem. Österr. Entomol. 46: 30–44.
- Casevitz-Weulersse J. 1972. Habitats et comportement nidificateur de *Crematogaster scutellaris* Olivier // Bull. Soc. Entomol. France. 77: 12–19.
- Canbulat S. 2007. A checklist of Turkish Neuroptera with annotating on provincial distributions. Zootaxa. 1552: 35–52.
- Devetak D. 2002. Neuroptera in oak forests in the submediterranean district of Slovenia // Neuropterology 2000. Proc. 7th Intern. Symp. Neuropterology (6–9 Aug. 2000, Budapest, Hungary). Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 48 (Suppl. 2): 67–73.
- Dobosz R. 1991. Neuropteroidea in the collection of the Institute of Animal Systematics and Evolution Pas in Cracow // Ann. Upper Sil. Mus. Bytom (Entomol.). 2: 221–233.
- Henry C.S., Brooks S.J., Duelli P., Johnson J.B. 2002. Discovering the true *Chrysoperla carnea* (Insecta: Neuroptera: Chrysopidae) using song analysis, morphology, and ecology // Ann. Entomol. Soc. Am. 95: 172–191.
- Makarkin V.N. 1996. Notes on Palearctic Hemerobiidae (Neuroptera). Introduction and genus *Wesmaelius* Krüger, 1922. Part 2(2). Subgenus *Kimmisia* Killington, 1937 // Far East. Entomologist. 32: 17–34.
- Monserrat V.J. 2000. New data on the brown lacewings from Asia (Neuroptera: Hemerobiidae) // J. Neuropterology. 3 [2001]: 61–97.
- Monserrat V.J., Marín F. 1994. Plant substrate specificity of Iberian Chrysopidae (Insecta: Neuroptera) // Acta Oecol. 15: 119–131.
- Navás L. 1914. Quelques Névroptères recueillis par le Dr. Malcolm Burr en Transcaucasie // Русское Энтомол. Обзор. 14(2–3): 211–216.
- Nicoli Aldini R. 1998. Distribution in Italy and ecology of the myrmecophilous lacewing *Italochrysa italica* (Rossi) (Neuroptera, Chrysopidae) // Insect Social Life. 2: 165–170.
- Popov A. 1986. Hemerobiiden aus Bulgarien (Neuroptera) // Mitt. Zool. Mus. Berlin. 62: 323–331.
- Principi M.M. 1946. Contributi allo studio dei "Neuroteri" Italiani. IV. *Nothochrysa italica* Rossi // Boll. Inst. Ent. Univ. Bologna. 15: 85–102.
- Steinmann H. 1965. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Neuroptera). 60. Chrysopidae, Hemerobiidae // Reichenbachia. 7(20): 179–190.
- Sziráki G. 1998. An annotated checklist of the Ascalaphidae species known from Asia and from the Pacific Islands. Fol. Entomol. Hung. 59: 57–72.
- Thierry D., Cloupeau R., Jarry M. 1996. Distribution of the sibling species of the common green lacewing *Chrysoperla carnea* (Stephens) in Europe (Insecta: Neuroptera: Chrysopidae) // Pure and Applied Research in Neuropterology. Proc. 5th Intern. Symp. Neuropterology (2–6 May 1994, Cairo, Egypt). Toulouse: 233–240.